




HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED ~ BY ~ CHARLES - SPRAGUE - SARGENT
1892

CATALOGUE

DES VÉGÉTAUX DE TOUS GENRES,

CULTIVÉS DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES

Du Sieur AUDIBERT, Aîné,

MARCHAND GRAINETIER ET PÉPINIÉRISTE;

A TONELLE,

PRÈS TARASCON (*Département des Bouches-du-Rhône.*)



A TARASCON,

DE L'IMPRIMERIE D'ÉLISÉE AUBANEL, *RUE MADAME.*

1817.

EXPOSITION DE L'ORDRE OBSERVÉ DANS CE CATALOGUE.



Arbres fruitiers.
Arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre.
Plantes d'orangerie et de serre.
Plantes vivaces pour l'ornement des jardins.
Plantes bulbeuses et oignons à fleurs.

Graines de plantes d'ornement.
Graines de plantes économiques.

1.° Céreales.

2.° Plantes potagères:
- Racines nourrissantes.
- Herbages légumiers.
- Fleurs légumières.
- Fruits légumiers.
- Semences légumieres.

3.° Plantes aromatiques.
4.° Plantes oleifères.
5.° Plantes textilles.
6.° Plantes teintoriales.
7.° Plantes à fourrage.
8.° Plantes propres à divers Arts et usages.

EXPLICATION DES SIGNES ET ABBRÉVIATIONS.

† *Indique* les Arbres et Arbustes toujours verts ou à feuilles persistantes.

» — Arbres ou Arbrisseaux propres à former des haies ou clotures.

§ — Espèces sarmenteuses propres à garnir les pavillons et tonnelles.

* — Les différents végétaux qui ne peuvent être cultivés en pleine terre que dans le midi de la France.

♉ *et* ♈ — Les divers végétaux d'orangerie que l'on peut, au moyen d'abris, livrer à la pleine terre dans le midi de la France.

‡ — Plantes d'agrement que l'on peut employer pour bordures.

? — Un doute sur le nom de l'espèce.

G. — Arbres et arbustes dont on peut fournir des graines et des jeunes plants de semis.

Au °/o — Les quantités de graines que l'on peut fournir au quintal ou au cent.

A. — Arbres.

B. — Arbrisseaux.

C. — Arbustes.

(pl. t.) pleine terre; (*or.*) d'orangerie; (*s.*) de serre; (*s. ch.*) de serre chaude; (*Espag.*) en Espagne; (*Ital.*) en Italie; (*Lang.*) en Languedoc; (Prov.) en Provence; (*Mat.*) Maturité = Mûrit; (*nov. sp.*) Nova species; (*vulg.*) Vulgairement.

OBSERVATIONS.

Les variétés sont indiquées par les lettres *a, b, c, d, etc.* Pour ne pas répéter le nom générique des espèces, j'ai employé un — et je me suis servi du = pour désigner les synonimes et les rapprocher les uns des autres; dans les Arbres fruitiers les noms français sont en romain; les noms latins et ceux des auteurs sont en italique; c'est tout le contraire dans les autres parties du catalogue.

AVERTISSEMENT.

Le Catalogue que je publie aujourd'hui contient la nomenclature exacte des Arbres, Plantes ou Graines, tant exotiques qu'indigènes, que les Propriétaires et les Amateurs peuvent se procurer à mon Établissement : je l'ai distribué de manière à ce que chacun puisse facilement y choisir les objets qui seront à sa convenance.

Pour éviter des erreurs ou des doubles emplois dans les demandes, j'ai ajouté aux noms adoptés, les différens synonymes qui y correspondent d'après divers Auteurs et d'après les cultivateurs Français ; je pense que ce travail ne sera pas sans utilité.

Mon Établissement, le seul un peu étendu qu'il y ait en ce genre dans le midi de la France, réunit plusieurs avantages marqués. Placé entre les 22.e degrés, 19 m. de longitude, et 43.e, 48 m. de latitude; il jouit d'une température telle que beaucoup de végétaux des pays chauds, préservés des vents du Nord, y prospèrent en pleine terre, tandis que ceux des pays froids, garantis des ardeurs du soleil par des abris contraires, n'y offrent pas une moins belle végétation. On peut donc regarder mon Établissement comme un point d'acclimatation pour les plantes du Nord et pour celles du Midi ; sa proximité des Ports de Marseille et de Cette, facilite les expéditions par mer pour l'Italie, l'Espagne, la côte d'Afrique, les deux Indes, *etc.*, *etc.* Sa position topographique entre les routes de Nîmes et d'Avignon, offre les mêmes facilités par terre pour tous les points de la France, et des expéditions faites à Hambourg, Leipsick et autres Villes du Nord, où elles sont arrivées à bien, garantissent la possibilité de faire supporter aux arbres et aux plantes, des voyages d'un plus long cours.

Une école fruitière (collection des différentes variétés d'arbres fruitiers, indiquées au présent Catalogue), réunit un individu de chacune de ces variétés, dans un espace de terrein que j'ai consacré à cet usage. C'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté, puis distribuées sur les différens sujets de la Pépinière, et ensuite soigneusement enregistrées. Cette école devient chaque jour plus intéressante pour les Amateurs; elle est, je crois, la plus complète de toutes celles qui existent.

Pour donner aux Propriétaires une idée du port ou des avantages de chaque qualité d'arbres, arbrisseaux ou arbustes que l'on cultive en France en pleine terre, je les ai (depuis 8 ans) réunis dans un même quarré et distribués par classes d'après Linné. Ce dépôt, que je considère comme une école forestière, et qui, à ce titre, intéresse le botaniste et l'agriculteur, m'offre aussi divers moyens pour multiplier les différens végétaux qu'il renferme.

Plusieurs personnes ont paru désirer que je joignisse au Catalogue des végétaux que je cultive, le prix de chaque article; mais elles n'en ont pas senti l'inconvénient. Telle plante, d'abord fort rare et fort chère, baisse considérablement de valeur par la facilité que l'on a à la multiplier, et telle autre, très-abondante et de peu de valeur, enchérit tout-à-coup par l'intemperie des saisons. Il faudroit donc un nouveau Catalogue chaque année pour suivre toutes ces variations, et celui que je présente, n'est pas de nature à pouvoir être réimprimé à des époques si rapprochées; je me borne à publier, tous les ans, un supplément des espèces nouvellement acquises. Cependant, pour satisfaire, en quelque sorte et autant qu'il est en moi, les désirs de mes

correspondans ; j'ai fixé, mais seulement d'une manière aproximative, la valeur de chaque objet, c'est-à-dire, le plus bas et le plus haut prix auquel on pourra les obtenir.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention, persuadé que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire, que le prix d'un plant qui trompe son attente et qu'il est obligé de remplacer ; cependant comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, une espèce peut être épuisée, je demande, pour éviter et nouveaux ports de lettres et retards dans l'expédition, d'être autorisé à remplacer par des espèces de fruits analogues et de même saison, les qualités dont les sujets ne seraient pas d'assez belle venue : tout cela sans abus et me conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien m'accorder leur confiance ; les autres espèces d'arbres et plantes ne seront point remplacées sans des ordres exprès.

Je ne saurois assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes, moyennes, basses tiges ou en quenouilles, les uns ne pouvant servir au même usage que les autres, et de faire connoître si on veut les arbres greffés sur francs ou autrement ; la nature du terrein exigeant impérieusement cette distinction.

J'offre aux propriétaires qui croiroient ne pas avoir assez de connoissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits, de leur en faire moi-même le choix, d'après les vues et les goûts qu'ils m'indiqueront.

J'offre enfin à ceux qui auroient des jardins à créer et qui ne seroient pas éloignés de plus de 25 lieues de mon Établissement, de leur fournir les plants nécessaires, des desseins analogues aux différens sites, et de les leur faire planter à des prix modérés et convenus en bloc.

Un port de lettre est peu de chose, mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup ; l'on est, en conséquence, prié d'affranchir celles que l'on me fera l'honneur de m'adresser, et quant au montant des envois que je fais, j'ai l'habitude de me prévaloir par des traites à fur et mesure des expéditions. Les personnes à qui ce mode ne conviendroit point, sont priées de m'en aviser et je suivrai pour les encaissemens telle autre voie qu'elles croiront préférable.

BOTANOPHILIS.



Summâ indulgentiâ mihi opus est pro tempore brevi in hoc catalogo posito et librorum botanicorum inopiâ. Auctorum judicio stare mihi necesse fuit ergà nonnulla synonyma allata ; ideo dolui quod mihi copia non esset exempla cum archetypo componendi ; è plurimis vero operibus, fidem libris eruditione perfectâ solum modo habui, et mediocribus abstinui.

Botanicos gallicos externosque rogo et oro, quos seminum et plantarum permutationes juvarent, ut desiderata ad me mittant ; petita exsequi mihi jucundissimum erit ; quos etiam Botanices studium ad Provinciæ campos invisendos inducet, ad collectanea mea invito ; ut herbarium eorum augeam sive plantis indigenis aut exoticis meis, usque eò felicem me futurum esse spero.

Herbarium meum amplificandi facultatem ademerunt occupationes quibus implicatus sum ; sed magna mihi spes est in fratre sedulo et actuoso, quo adjuvante, faciam ut septentrionales botanici australium plantarum indagationis, in hâc regione, juxtà meam potestatem, participes fiant.



CATALOGUE
DES VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,
CULTIVÉS DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES
Du Sieur AUDIBERT, Aîné,
MARCHAND GRAINETIER ET PÉPINIÉRISTE;
A TONELLE,
Près TARASCON (*Département des Bouches-du-Rhône*)

ARBRES FRUITIERS.

ABRICOTIERS.



Abricotier d'Alexandrie. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Mi-Juin.)
— d'Alexandrie, petit tardif. (*Mat.* Juillet.)
— Albergier. *Duh. ed. nov.* = Alberge. = A. Alberge *Duh.* = *Armeniaca dulcis*. H. P. (*Mat.* Mi-Juillet.)
— Albergier de Tours. F. B.
— Blanc musqué, de Provence. (*Mat.* Mi-Juillet.)
— De Briançon. = Prunier de Briançon. *Duh. ed. nov.* = *Armeniaca brigantiaca*. Pers. = *Prunus brigantiaca*. Vill.
— Commun. *Duh.* = *Armeniaca vulgaris*. Lam. = *Prunus armeniaca*. Lin. (*Mat.* Juillet.)
— C. à feuilles panachées. = *A. V. variegata*. (*Mat.* Juillet.)
— Gros précoce. A. de la S.t Jean. = A. gros d'Alexandrie. *Prov.* = A. de la S.t Jean rouge. *Lang.* (*Mat.* Juin.)
— Hâtif. *Duh. ed. nov.* = A. précoce. = A. hâtif musqué. *Duh.* = Abricotin. *Vulg. armeniaca precox*. (*Mat.* Juin.)
— De Hollande. = A. Amande-Aveline. *Duh. ed. nov.* = A. de Breda. F. B. (*Mat.* Fin-Juin.)
— Noir. *Duh ed. nov.* = A. de Bruxelles. *Dum. Cours.* = A. du Pape. = A. Violet. = *Armeniaca dasycarpa*. Pers. = *Prunus dasycarpa*. Ehrh. = *Armeniaca atro-purpurea*. Duh. ed. nov. = A. *nigra*. *H. P.* (*Mat.* Juillet.)
— A feuilles de pêcher. = *Armenia atro-purpurea persicæfolia*. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Fin-Juillet.)
— Pêche, *Duh. ed. nov.* = A. de Piémont. = A. de Nancy, *Duh.* = A. de Nuremberg *ou* de Wurtemberg. = *Armeniaca persicoïdes*. Pers. *A. macrocarpa*. H. P.
— Var. à très-gros fruit. (*Mat.* Juillet) . . . . 1 f. 25 c.

Abricotier de Portugal. *Duh.* = *Roz.* = *Armeniaca lusitanica*. Dum. Cours. (*Mat.* Juillet.)
— De Provence. *Duh.* (*Mat.* Fin-Juin.)
— Rouge. = A. Angoumois, *Duh.* = *Roz.* (*Mat.* Fin-Juin.)

Abricotiers, *hautes tiges*. . . . . 1 fr.
— *Mi-tiges*. . . . . 75 c.
— *Basses-tiges*. . . . . 60.

AMANDIERS.



Amandier commun. = Am. cultivé. = *Amygdalus communis*. Lin.
— A fruit doux. = *A. dulcis*.

Variétés.
- Aberame douce naturelle.
- Boutière.
- Farisienne.
- à flots douce.
- Grosse verte.
- Petite verte.
- De la race.
- Materonne.
- Ronde mi-fine.
- Ronde dure.
- Balotte.
- Grosse à confire douce.

— A fruits amers. = *A. Amara*.
— A petits fruits amers.
— A gros fruits amers.
— Très-grosses amères à confire.
— Amande aberame, demi-amère.
— A coque tendre. = *A. fragilis*.

Amandier sultane.
— Amande princesse. = A. des dames. = Abiélam. *Prov.*
— Amande pistache.
— A noyau tendre amer.
— De Corse. = Grosse à coque tendre.
Amandier pêche. = *Amygdalus hybrida.* Pers. . . de 75 c. à 1 f.
— Argenté. = A. d'Orient. = *A. orientalis.* L.
= *A. argentea.* Lam. de 75 c. à 1 f.
— Nain. = A. de Perse. = *A. Nana. Pall.* de 75 c. 1 f. 25c.

AMANDIER, Commun. . . . . de 40 à 60 f. le c°
— A gros fruits. . . . . de 50 à 75 f. *id.*
— à coque tendre. . . . . de 50 à 80 f. *id.*

AZÉROLIERS.

Azérolier à gros fruit rouge. = Neflier azérole. = Azérole. = Epine d'Espagne. = *Cratægus azarolus.* Lin. = *Mespilus azarolus.* Lam. = *Pyrus azarolus.* Scop. . . de 60 à 75 c.
— à fruit blanc. = A. à fruit jaune. = A. à fruit d'un blanc jaunâtre. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* 7.bre.) . . de 75 c. à 1 f.
— de Montpellier. = A. sauvage. = (Poumettes de duos closses. *Lang.*) = *Mespilus aronia.* . . . . 75 c.
— du Canada à fruit rouge. = *Cratægus punctata.* Ait. *Mespilus cuneifolia.* Ehrh. (*Mat.* 7.bre.) . . de 75 à 1 f. 50 c.
Var. à fruit jaune. . . . . de 1 f. à 1 f. 50 c.

CERISIERS.

Cérisier vulgaire. = Griottier. = *Cerasus vulgaris.* Mill. = *C. caproniana.* D. C. = *Prunus cerasus.* Lin = *C. sativa.* Tourn.
— belle de Choisy. = C. doucette. *Duh. ed. nov.* = Griottier de Palembre. (*Mat.* Juillet.)
— blanche de Bourges. *Prov.* (*Mat.* mi-juin)
— à bouquet. *Duh.* = *Cerasus polygyna.* (*Mat.* mi Juin.)
— brune de Bruxelles. *F. B.* (*Mat:* Juillet.)
— à courte queue. = Gobet. *Le Berr.* (*Mat.* c. Juillet.)
— double natte. *Christ.* (*Mat.* c. Juin.)
— à fruit ambré. = Guindoux blanc. *Duh. ed. nov.* (*M.* Juillet.)
— Griotte d'Allemagne. = Griotte de chaux. *Duh.* = Cérise de M. le Comte de S.t Maur. *F. B.* (*Mat.* c. Juillet.)
— Griotte d'Espagne. *Mayer.* = *Le Berr.* (*Mat.* Mi-Juin.)
— Griotte du Portugal. *Duh.* = G. de Sicile. *Prov.* (Mi-Juin.)
— Griotte à ratafiat. = Cérisier à petit fruit noir. *Duh.* (Juillet.)
— Griotte royale. *Duh. ed. nov.* = Cherry-duke *Duh.* = *Cerasus suavissima.* H. P. (*Mat.* c. Juillet.)
— Griotte royale, hâtive. = May-Duke. = Cerise d'Angleterre. hâtive. *Mayer.* (*Mat.* Fin-Mai.)
— gros gobet. = Gobet à courte queue. = Cerise de Kent. *Duh. ed. nov.* = Montmorency. à gros fruit. *Duh.* = Cerisier conlard. *Vulg.* (*Mat.* Fin-Juin.
— de Hollande. *Duh. ed. nov.* = C. Coulard. *Duh.* (*Mat.* Mi-Juin.)
Var. à feuille de balsamine.
— marasquin. *Duh. ed. nov.* = Griottier marasquin. (*Mat.* Juillet.)
— de Montmorency, *Duh.* = *Cerasus ruberrima.* H. P. (*Mat.* c. Juillet.)
— nain à fruit rond. *Duh.* = *Cerasus nana.* H. P. (Mi-Mai.)
— nouvelle d'Angleterre. *F. B.* = Grosse cerise rouge pâle. *Duh.* (*Mat.* Fin-Juin.)
— à noyau tendre. *Duh.* (*Mat.* Fin-Juin.)
— d'Ostheim. *Christ.* - *F. B* (*Mat.* Mi-Juillet.)
— rouge tardive. *Prov.* (*Mat.* Août.)
— de Soissons. *F. B.* (*Mat.* Juillet.)
— à trochet. *Duh.* = C. très-fertile. (*Mat.* Fin-Juin.)
— turkine. *Christ.* (*Mat.* Juillet.)
— Cerisier merisier à gros fruit noir. = Grosse merise noire. *Duh.* = *Prunus avium.* Lin. = *Cerasus silvestris.* J. B. = *C. nigra.* Mill. = *C. avium.* D. C.
— M. — à fruit blanc. *Duh. ed. nov.*
— M. — à fruit jaune. *Duh. ed. nov.*

Cerisier bigarreautier. = *Cerasus Bigarella.* = *C. Duracina.* D. C.
— Petit Bigarreau blanc hâtif. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Mi-Juin.)
— Gros bigarreau blanc. *Duh. ed. nov.* = Bigarreautier à gros fruit blanc. *Duh.* (*Mat.* c. Juillet.)
— Bigarreau cœur de pigeon. = Gros bigarreau hâtif. *Duh. ed.* (*Mat.* Mi-Juin.)
— Bigarreau couleur de chair. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Juillet.)
— Bigarreau commun. = Belle de Rocmont. = Cœur de pigeon. *Duh.* (*Mat.* Juillet.)
— Bigarreau hâtif de Bâle. = Richemer. *F. B.* (*Mat.* Mai.)
— Bigarreau de May. *F. B.* (*Mat.* Mai.)
— Bigarreau noir. = C. de Norwège. *Duh. ed. nov.* (c. Juillet.)
— Bigarreau noir tardif *ou* de Lory. *F. B.* (*Mat.* Août.)
— Bigarreau rouge (gros.) *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Juillet-Aout.)
— Petit bigarreau rouge. *Duh. ed. nov.* = Cœuret. = B. à fruit rouge, hâtif. *Duh.* (*Mat.* Mi-Juin.)
— Bigarreau tardif. d'Hildesheim. *F. B.* (*Mat.* Août.)
— Guigner. = Gruffion. *Vulg. Prov.* = *Cerasus juliana.* D. C. = *Prunus Cerasus juliana.* Lin.
— Guigne blanche. *Duh. ed. nov.* = Guigner à gros fruit blanc. *Duh.* = C. cayette. *Prov.* (*Mat.* Juin.)
— Guigne Jaune. *Christ.* (*Mat.* Juin.)
— Guigne écarlatte. *F. B.* (*Mat.* Juin.)
— Guigne de Montfrin. = Cerise de Montfrin. *Lang.* (C. Juin.)
— Guigne noire. *Duh.* (*Mat.* c. de Juin.)
— Guigne noire luisante. *Duh. ed. nov.* = G. à gros fruit luisant. *Duh.*
— Guigne petite noire. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* C. Juin.)
— Guigne Olive. = Cerise de Besson. *Lang.* (*Mat.* Mi-Juin.)
— Guigne piquante. = G. à piquet. *Duh. ed. nov.* = C. pointue. *Lang.*
— Guigne précoce = G. de la Pentecôte. *Duh. ed. nov.* = Cerisier de Barbentane. *Vulg.* (*Mat.* Fin-Mai.)
— Guigner de quatre à la livre. = Guigner à feuilles de tabac. *Duh. ed. nov.* = Bigarreau tardif. = *Cerasus decumana.* De Launay. = *C. nicotianæfolia.* Pall. (*Mat.* Juillet.) de 1 f. 50 c. à 3 f.
— Guigne rouge tardive. *Duh.* = G. de fer. = G. de S.t Gilles. (*Mat.* 7.bre.)
— Guigner à rameaux pendants. . . . . . . de 1 f. à 2 f.
— Cerisier à feuilles luisantes. *Duh. ed. nov.* = C. de Siberie. = *Cerasus chamæcerasus.* Jacq. *Prunus cerasus pumilla.* Lin. (*Mat.* 7.bre.) . . . . de 1 f. à 2 f.
— C. — de la Toussaint. = *Ceraseus semperfloreus.* (*Mat.* 7.bre. . . . . de 1 f. à 1 f. 50 c.

CERISIERS, haute tige en tête. . . . . 1 f. 25
— — ordinaire. 75
— mi-tige. 50
— basse tige. 40

COIGNASSIERS.

Cognassier commun. = *Cydonia vulgaris.* = *Pyrus cydonia.* Lin.
— à fruit en pomme. = Coing pomme. = *Cydonia maliformis.*
— à fruit en poire. = Coin poire. = *C. ablonga.*
— à petit fruit. 50 c.
— de Portugal. = *Cydonia lusitanica.* 75 c.
— de la Chine. = *Cydonia sinensis.* de 1 f. 50 à 3 f.

CHATAIGNERS.

Chataigner. = *Fagus castanea.* = *Castanea vesca.* Lam.
— ordinaire.
— du Dauphiné. 1 à 2 f. 50 c.
— Marron de Lyon. = d'Ambrai. = d'Agen. = du Luc. 3 f.
— d'Amérique. = Chincapin. = *Fagus pumilla.* Lin. = *Castanea pumila.* Lam. de 5 à 8 f.

FIGUIERS.

Figuier commun. = *Ficus carica.* L. 50 c.
— caprifiguier. = F. sauvage. = *Ficus c. sylvestris.*
— cultivé. = *Ficus c. sativa.*

— aubique

Figue aubique noire. = F. grosse violette longue. *Duh. ed. nov.* = Roz. = F. longane. *de Suff.*
— blanche (grosse.) *Duh. ed. nov.* = F. blanche commune. *Prov.*
— bourgeassote blanche. *Lang.*
— bourgeassote grise. = F. de Bellegarde.
— bourgeassote noire. = *F.* barnissote. = *F. bourjassoto.* Prov.
— clémentine. *de Suff.*
— coucourelle brune. *Duh. ed. nov.*
— coucourelle gavote. *de Suff.*
— datte. *Lang.*
— franque paillarde. *Lang.*
— de Jérusalem. *Lang.*
— de Lipari. = F. petite blanche ronde. *Roq.* = *F. blanquette.* = *F. esquillarelle.* Prov.
— de Marseille. *Duh. ed. nov.* = *F. marseilleso.* Prov.
— napolitaine *de Suff.* = F. aubique blanche. *Lang.*
— negrotte. *Lang.* = F. negroue. *Duh. ed. nov.*
— Œil de perdrix. *Prov.*
— peau dure. = F. verte brune. *Roq.* = *Troumpe-cassaïre.* Prov.
— pied de bœuf. *Labrousse.*
— pistache. *Lang.*
— poulette. *Labr.* (La meilleure de toutes.)
— recousse noire. *de Suff.*
— rose. = F. peyrouno. *de Suff.* = F. rose-blanche. *Duh. ed. nov.* = F. rousse. *Roq.*
— rougette. *Labrouss.*
— servantine. = cordélière. *Duh. ed. nov.* = F. grise. = F. de la St. Jean. *Lang.*
— vernissenque. = F. petite bourgeassote. = F. martinenque. *Lang.* = F. sarreigno. = F. verdale. *Prov.*
— de Versailles. = Figue royale. *Duh. ed. nov.* = Figue d'or. *Prov.-Lang.*
— grosse verte. = grosse verdale. *Lab.*
— petite verte. = petite verdale. *Lang.*
— violette *Duh.* = F. mouissoune. = F. perruquine. *Lang.*

PRIX DES FIGUIERS, de 50 c. à 1 f. 25 c.

FRAMBOISIERS.

Framboisier commun. = *Rubus idæus.* de 3 à 5. f. %
— des Alpes. = F. de tous les mois. = *Rubus J. serotinus.* de 4 à 6 f. %
— à fruit blanc. = à fruit jaune. 50 c. pièce.
— couleur de chair. 75 c. pièce.

GRENADIERS.

Grenadier commun. = *Punica granatum.*
— à fruit doux. de 40 à 50 c.
— à fruit aigre. 40
— à fruit mi-aigre. = Grenadier murce. *Vulg.* 40
— de Malte à gros grains. = *punica melitensis.* 75
— à fleurs blanches. = G. à fleur d'un blanc jaunâtre. = *Punica alba.* = *P. flava.* de 2 f. 3 f.
— nain des Antilles. = *Punica nana.* = *P. semperflorens.* = *P. americana.* de 2 f. à 4 f.
Le 100 replants de 2 ans de Grenadier commun, de 8 à 15 f.

GROSEILLERS.

Groseiller à grappes rouges. = *Ribes rubrum.* L. = *R. officinarum.* Dum. Cours.
— à grappes blanches ou jaunes. = G. perlé. = *Ribes album.* H. P. de 25 à 50 c.

Groseiller à grappes roses? de 40 à 75 c.
— de Hollande à grandes grappes rouges? de 50 à 75 c.
— de Hollande à grandes grappes blanches. de 50 à 75
— épineux. = G. à maquerau. = Epine d'Angleterre. = *Ribes uva crispa.* L. = *R. grossularia.* L.
à fruit jaune. 20 c.
à fruit violet. 40
— 40 variétés de groseillers d'Angleterre, à fruits verts, jaunes, blancs et violets assortis. à 60 c. pièce.
— à fruit noir. = Cassis. = Poivrier. = *Ribes nigrum.* Lin à 2 f. 40 c. la douzaine.
— des Alpes à fruit doux. = *Ribes alpinum.* L. (mâle et femelle) 3 f. la douzaine.

JUJUBIERS.

Jujubier cultivé. = J. commun. = Chinchourlier. = *Ziziphus vulgaris.* Pers. = *Z. sativa.* Desf. = *Rhamnus ziziphus.* Lin. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— de la Chine. = *Z. sinensis.* L. de 1 à 2 f.

MURIERS.

Mûrier blanc. = *Morus alba.* de 1 à 2 f. 75 c.
Var. { à fruit gris. / à fruit blanc. / Romain. = feuille romaine. / à grandes feuilles. = Grosse reine. = Feuille d'Espagne. / à feuille longue. = Langue de bœuf. *Lang.* }
— d'Italie. = M. feuilles roses. = *Morus italica.* = *M. rosea.*
— à fruit rouge. = *Morus rubra.* L. de 1 f. 50. à 2 f.
Var. du Canada à larges feuilles. = *M. Canadensis.* 2 f.
— noir. = Mûrier de présent = Mûrier des dames. = *Morus nigra.* (Mâle et femelle.) de 2 à 6 f.
— noir à feuille de figuier ?
— de la Chine femelle. = *Broussonetia papyrifera.* L'Herit. = *Morus papyrifera.* Lin. de 1 50 c. à 3 f.

NEFFLIERS.

Nefflier d'Allemagne. = *Mespilus germanica.*
— à gros fruit. = Nefflier de Hollande. *Mespilus g. maxima.* de 50 à 75 c.
— sans pepin. = *Mespilus abortiva.* 75
— à petit fruit. = *Mespilus g. minor.* 50

NOISETIERS.

— à petits fruits. = Noisetier des bois. = *Coryllus silvestris.* 1 f. 50 c. la douz.
— à gros fruit. = *C. maxima.* 5 f. la douz.
— fruit rond. = N. de Piémont. = *C. alba.* 3 f. la douz.
— tubulé. = *C. tubulosa.* 75 c. pièce.
— à fruit rouge. = *Coryllus rubra.* de 1 à 1 f. 50 c.
— de Bizance. = Noisetier de Constantinople. = *C. Colurna.* = *C. bizantina.* de 1 f. 50 à 2 f.
— d'Amérique. = *C. rostrata.* 2 f.

NOYERS.

Noyer Commun. == *Juglans regia*. Lin. . . . *de* 75 c. à 2 f.

Var. { à fruits ronds. / à fruits allongés. / à fruits anguleux. == *Juglans angulosa*. / à coque tendre. == noix Mésange == *J. fragilis*. 5 f.

— à gros fruit. == noix de jauge. == noix à gands. == *Juglans maxima*. == *J. macrocarpa*. == *J. caballina*. *de* 3 à 5 f.

— Tardif. == N. de la Saint Jean. == N. des Miracles. == *Juglans serotina*. H. P. *de* 1 f. 25 c. à 2 f.

OLIVIERS.

Olivier d'Europe. == *Olea europæa*. Lin. (suivant la force. *de* 1 à 4 f.

— d'Europe sauvage. == Aulivastre. == Aulivier de fer. *Prov.* == *Olea silvestris*. Duh. ed. nov.

— Amygdalin. *Duh. ed. nov.* == Amenlaudo. == Raymet-Bécu. *Prov.* == *Olea sativa major angulosa*. Garid. 5.

— Blanquet. == Blacau. == O. à fruit blanc. *Duh. ed. nov.* == *O. latiore folio fructu albo*. Garid. 10.

— O. Bouquetier *Lang.* == Boutellian. == Rouget. == Rapugnier. == Caïon à grappes. == Boutignan. *Olea racemosa*. Gouan, *Olea minor rotunda racemosa*. Garid. 9

— O. Burruguet. *Prov.* == *Prouvensaleto*. Lang.

— De chien. == O. à bec. *Duh. ed. nov.* == O. bécu. *Prov.* == O. à fruit doux? *Duh. ed. nov.*

— O. Cournau. == O. pleureur. *Duh. ed. nov.* == O. de grasse *Bernard*. == *Tagliasca*. Gênes. == *O. Carniomorpha*. Gouan. == *O. media oblonga fructu cornis*. Garid. 6.

— O. Long-poil. *Prov.* == *Lang*.

— O. Moureau. *Lang.* == O. hâtif. *Duh. ed. nov.* == *O. Precox*. Gouan. == *O. media rotunda precox*. Garid. 8.

— O. Petite noire. == *Négréto*. Prov.

— O. à petit. fruit panaché *Duh. ed. nov.* == O. pigale. == pigau == *Olea variegata*. Gouan.

— O. à fruit arrondi. *Duh. ed. nov.* == gros redounau. *Prov.* == *ampoulau*. Lang. == *Olea sphærica*. Gouan.

— O. à petit fruit rond. == aglandaü. == Caïone. == petit redounau. *Prov.*

— Picholino. == O. à petit fruit oblong. *Duh ed. nov.* == Couyasso == Couyas. *Lang.* == Pignola. *Gênes.* == *Olea oblonga*. Gouan. == *O. fructu oblonga*. Garid. 1. == *Orchites*? columnelle.

— De salon. == Plant de salon. *Duh. ed. nov.* == Salounen. *Prov.*

— Vermillau.

ORANGERS.

(prix. *de* 1 f. 50 à 100. fr.

Citronier orange == *Citrus aurantium*.

— O. du Portugal. == *Citrus aurantium lusitanicum*. *Duh. ed. nov.*

— O. à fruit rouge. == Orange de Malte. == O. de grenade. == == *Citrus aurantium hierocunthicum*. Duh. ed. nov. == *auratium cruentum*. == *aranzo sanguigno* Ital. == *aur. philippinum* Ferr. Hesp.

— O. riche depouille. == *C. aurantium multiflorum*. Duh. ed. nov.

— O. Turc. == O. à feuille panachée. == Culotte de suisse == *Citrus aurantium fructu variegata*. Duh. ed. nov.

— Citronier bigaradier == *Citrus bigaradia*.

— Bigarradier à fruit coniculé. == Hermaphrodite. *C. B. corniculata*. == *aurantium hermaphroditum, sive corniculatum*. Ferr. Hesp. == *Aranzo cornuto, è hermaphrodito*. volc. hesp.

— C. Bigarradier bouquetier. == *Citrus bigaradia crispa* Duh ed. nov.

— C. Bigarradier à fleurs doubles. == *Citrus bigaradia flore duplici*. Duh. ed. nov.

Citronier Bigaradier petit chinois. == C. *Bigaradia sinensis Duh. ed. nov.* == *Aurantium sinense*. == *chinotti*. Ital.

— C. Big. à feuille de mirthe. == Chinois nain. == *C. B. myrtifolia*. Duh. ed. nov.

— C. Limonier. == *citrus limonium*. Duh. ed. nov. == *Citrus medica*. Lin == Limonier.

— C. Limonier ordinaire. == *citrus limonium vulgare*. Duh. ed. nov.

— C. Limonier à fruit aigre. == *Citrus limonium acre*. Duh. ed. nov.

— C. Poncire. == *Citrus limonium ponzinum*. Duh. ed. nov.

— C. Bergamotte-perette == *C. Berg. peretta*. Duh. ed. nov.

— C. Cédratier à gros fruit *Duh. ed. nov.* == Cédrat. == *Cedrone*. Ital. == *Citrus medica*. L.

— C. Limettier. == *Citrus limetta*. Duh. ed. nov.

— C. Limonier à fruit doux. == *Lima dulcis*.

— C. Limetier-bergamotte. == *Citrus limetta bergamia*. D. ed. n.

— C. Mela-rosa. == *Citrus limetta mela-rosa*. Duh. ed. nov.

— C. Pampelmous. == chaddock. == schaddeck: == *Citrus de cumana*. Lin.

— C. Herisson. == *Citrus histrix*. D. C. *de* 20. à 100. f.

PÊCHERS.

— Pêcher commun. == *Persica vulgaris - Mill.* == *amygdalus persica*. Lin.

— Admirable == belle de vitry. *Duh. ed. nov.* == Belle Bausse. (*Mat.* Août.)

— Admirable tardive. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Septembre.)

— Alberge jaune précoce. == admirable-jaune. == pavie jaune (*Mat.* Juillet.)

— Alberge jaune tardive. == Pavie de cavaillon. == perseque. == melocoton jaune. == grand myrecoton jaune. (*M.* Sept.)

— Alberge blanche tardive. (*Mat.* c. Octobre.)

— Avant-pêche jaune. == Saint Laurent jaune. (*Mat.* Juillet.)

— Avant-pêche blanche. (Juin.)

— *Id. Id.* pavie (Juin.)

— Avant-pêche rouge. == Saint Laurent rouge. (*Mat.* Juin.)

— Avant-précoce, pavie. *Prov.* (*Mat.* Juin.)

— Belle chevreuse. (*Mat.* Août.)

— Belle de Beaucaire. (Juillet.)

— Belle-garde *ou* Galante. == Galande. (Août.)

— Belle de tillemont. (Septembre.)

— Blanche tardive à confire (Septembre.)

— Brugnon jaune. (Août.)

— Brugnon violet musqué. *Mayer.* (Août.)

— Bourdine. == Boudine. == Narbonne. *Duh.* (*Mat.* Août.)

— Cardinale de Fustemberg. (*Fin.* Août.)

— Chancheliére. *Duh.* (Août.)

— Chevreuse hâtive. *Duh.* (Août.)

— Chevreuse hâtive d'Italie. (Août.)

— Chevreuse tardive. *Duh.* == Fausse mignone. == mal-nommée.

— Double de troyes. == petite mignone. (*Mat.* Août)

— De Favier. *Prov.* (*Mat.* Août.)

— à fleurs doubles. (prix 50 c. à 1 fr.)

— Grosse mignone. == veloutée de Merlet. == mignone veloutée.

— Hâtive des Tours, *Prov.* (Juin.)

— d'Ispahan. *Thouin.* (Type primitif.) (*Mat.* Septembre.)

— Jaune. == Alberge jaune. *Duh.* == petite roussane. == Saint Laurent jaune.

— Jaune lisse. == roussane tardive. *Duh.* (Septembre.)

— Incomparable en beauté. *F. B.* (Août.)

— Magdelaine blanche. == montagne blanche. *Duh.* (Août.)

— Magdelaine de Bollwiller. *F. B.* (*Mat.* Août.)

— Magdelaine rouge. == Magd. de Curson. == Paysanne. *Duh.*

— Magdelaine rouge tardive. == Magd. à petites fleurs. (fin Août.)

— De Malte. == Belle pêche de Paris. (*Mat.* Août.)

— Monstrueuse. == Pavie rouge de Pompone. == pav. camus. == grand persèque rouge. == grand melocoton. (Septembre et Octobre.)

— Montagne précoce. (la grosse) *F. B.* (Août.)

— Montfrin. *F. B.* (Septembre.)

— Nain d'Orléans. == *Persica pumilla*. prix. de 75 c. à 1 f. 20 c. (*Mat.* Septembre.)

Pêchers. Nivette hâtive. *Prov.* (*Mat.* Juillet.)
— Nivette. == veloutée tardive. (*Mat.* Septembre.)
— Pavie de Jalaguier. == pavie à tétons. (*Mat.* Septembre.)
— Pavie de la Magdelaine *première saison.* (Juillet.)
Id. *Id.* *deuxième saison.* (mi-Août.)
Id. à gros fruit dont le noyeau se partage. (*Mi*-Août.)
— Pavie de Newington. *F. B.* (Octobre.)
— Persique. == gros persèque. *Duh.* (Octobre.)
— Pourprée hâtive à grandes fleurs. *Duh.* (Juillet.)
— Pourprée vineuse. *Duh.* (Août.)
— Ronde de Vallabregues. *Lang.* (*Mat.* Août.)
— Ronde (*grosse.*) d'Août. *Prov.*
— Pourprée tardive (Septembre.)
— Rossane. (*Mat.* Septembre.)
— Sanguinole *ou* Betterave. == Druselle. *Duh.* (Septembre.)
— *Id.* à chair adhérente (*Mat.* Octobre et Novembre.)
— Teint doux. *Duh.* (Septembre.)
— Téton de Vénus. (Août et Septembre.)
— Transparente ronde. (*Mat.* Septembre.)
— Violette hâtive. (La petite.) (Août.)
— Violette hâtive. (La grosse.) (Août.)

PÊCHERS, hautes tiges, greffés sur francs ou sur amandiers. 60 c.
— Mi-tiges *Id.* *Id.* 50 c.
— Basses-tiges. *Id.* *Id.* 40 c.
— Hautes et basses tiges, greffé sur prunier 75 c. à 1 fr.

POIRIERS.

POIRIERS Ah ! mon Dieu ! == P. d'ah ! mon Dieu. *Duh.* (fin Août.)
— Ambrette d'été.
— d'hiver. *Duh.* (Novembre et Fevrier.)
— Amiré Joannet. == Poire de St. Jean. *Duh.* == Trompe valet. == Beurré de Saint Jean. *Prov.*
— Angélique de Bordeaux. *Duh.* == Saint Marcel == gros franréal. (*Mat.* Décembre.)
— Angélique des Chartreux. *H. P.*
— Angélique de Rome. *Duh.* (Décembre et Février.)
— Angleterre d'hiver. == P. d'Angleterre. *Duh.* (Avril.)
— Aurate *Duh.* == Poire dorée. == P. Saint Jean doré. *Prov.* (*Mat.* Juin.)
— Belle et bonne. *Christ.* (Septembre.)
— Belle de Bruxelles. *Calv.* (Octobre.)
— Belle d'été. *Duh. ed. nov.* == Bellissime d'été. *H. P.*
— Bellisime d'automne. == Vermillon. *Duh.* == Petit Certeau. (*Mat.* Septembre et Octobre.)
— Bellissime d'été suprême. *Duh.* (Juillet.)
— d'été. == Cremesine rousse. *Prov.* (Juin.)
— Bonne d'hiver. *Duh.* == Téton de vénus. == Catillac. (Décem.)
— Bequesne. *Duh.* (Octobre et Janvier.)
— Bergamotte d'Angleterre. == B. de Hamden. *Calv.* (Septem. et Octobre.)
— d'automne. *Duh.* (Octobre.)
— de Bussy. *F. B.* (Janvier et Mars.)
— Cadette. == Poire de Cadet. *Duh.* (Octobre.)
— Crassanne. *Duh.* (Octobre.)
— C. panachée. *Duh. ed. nov.*
— d'été. == Milan blanc. == Milan de la Beuvrière. *Duh.* (Juillet.)
— de Hollande. == Amoselle. == Bergamotte d'Alençon. *Duh.* (Février et Mai.)
— de Nice ? *F. B.*
— Non pareille. *Christ.* (Novembre.)
— de Paques. == Bergamotte d'hiver. *Duh.* (Avril et Juin.)
— Rouge. *Duh.* Crassanne d'été ? (Octobre.)
— Rayée. == B. Suisse. *Duh.* (Octobre.)
— De soulers. == bonne de soulers. *Duh.* (Février et Mars.)
— Sylvange. == Poire Sylvange. *Duh. ed. nov.* (Octobre.)
— Bergler. *F. B.* (Octobre.)
— Bezi de caissoy. == Roussette d'Anjou. *Duh.* (Novembre.)

Poiriers Bezi de Chaumontel. == Beurré d'hiver. *Duh. ed. nov.* (Décembre et Mars.)
— d'Héry. *Duh.* (Octobre et Décembre.)
— de Montigny. *Duh.* (Septembre et Octobre.)
— de la Motte. *Duh.* (Octobre et Novembre.)
— Beurré d'Angleterre. == Angleterre. *Duh.* (Septembre.)
— de Bollwiller. *F. B.* (Avril et Mai.)
— Capiomont. *Van-mons.*
— Colmart de printems. *Van-mons*
— C. d'automne. *Van-mons.*
— blanc. == Doyenné. == Saint Michel. == bonne - ente. *Duh.* == Poire signore. == de monsieur. == de neige. == à courte queue. == Citron de Septembre. == *Pyrus liquescens. H. P.*
— Diel. *Van-mons.*
— Fourcroy. *Van-mons.*
— Gris. *Duh.* (Septembre.)
— Ardempont. *Duh. ed. nov.*
— Ardempont de Printems. *Van-mons.*
— Romain. *Christ.* (fin Septembre.)
— Rouge.
— Thouin. *Van-mons.*
— Blanquette à longue queue. *Duh.* (Juillet.)
— Grosse blanquette. *Duh.* (Juillet.)
— Petite blanquette. == Poire à la perle == Petit roi louis. *Duh.*
— Blanquette à bouquet. == B. de la St. Jean. *Prov.* (Juin.)
— Grosse blanquette ronde. *Duh.* (Juillet.)
— Bonchrétien d'Auch. *Duh. ed. nov.* == *Pyrus pompeiana. H. P.*
— Bonchrétien d'Automne. *Prov.* (Octobre et Novembre)
— d'Espagne. *Duh.* (Novembre et Décembre.)
— d'été == Gratioli. *Duh.* == Duchesse. (Juillet et Août)
— d'été musqué. (Juillet.)
— d'hiver. *Duh.* == Poire d'Angoisse. (Février et Mars.)
— Turc. == Poire Turque. *Duh. ed. nov.*
— Bourdon musqué. *Duh.* (Juillet.)
— Brunnen - Birne. *F. B.* (Octobre.)
— Calebasse - Bosc. *Van-mons.*
— Cassolette. == Friolet. == Muscat vert. == Lechefrion. *Duh.* (Août et Septembre.)
— Cassolette jaune. *F. B.* (Août.)
— Catillac. *Duh.* == Rateau gris. (Décembre.)
— Catilina rosa. *H. P.*
— Cheminette. *F. B.* (Décembre-Janvier.)
— Chair à dame. == Chère adame. *Duh.* (Mi-Août.)
— Chât-brûlé. == Poire de Saintonge. == Petit Tarquin. *Duh. ed. nov.* (Octobre et Novembre.)
— Citron de sierens. *Christ.* (Juillet.)
— Grosse Crémesine. *Duh. ed. nov.* (Juillet.)
— Petite Crémesine. *Duh. ed. nov.* (Juillet.)
— Crémesine d'Août. *Prov.* (Août.)
— Cuisse madame. *Duh.* (fin Juillet.)
— Colmart reul. *Van-mons.*
— d'Ardempont. *Van-mons.*
— Souverain. *Vans-mons.*
— Deux fois l'an. *Christ.* (Juillet et Octobre)
— Double Calice. == Poire à deux têtes. *Pom. Austri.* (A. et S.)
— Double fleur. *Duh.* == Armenie. == *Pyrus communis flore pleno.* Lin. (Février et Avril.)
— Double fleur panachée. *Duh.*
— Doyenné gris. *Duh.* (Septembre et Octobre.)
— Echassery. == Bezi d'Echassary. (Novembre et Janvier.)
— Epargne. == Beau présent. == Saint Samson. == grosse cuisse madame. *Duh.* == Poire des tables des Princes. *Christ.* (Juil.)
— Épargne de Tonelle. (Juillet.)
— Petite épine d'été. *Duh. ed. nov.* == Epine d'été. == Fondante musquée. *Duh.* == Satin vert. (C. Août.)
— Épine d'été de Toulouse. *Duh. ed. nov.* (C. Août.)
— Épine rose. == Poire de rose. == Poire de Malte. == Poire tulipée. == Caillot rosat. == Poire d'eau rose. (Juillet.)
— Épine d'hiver. *Duh.* (Novembre et Fevrier.)
— Etrangle. == Poire de fusée. (à cuire.) *manger.* (Sep. et Oct.)
— Faux bonchrétien. *Manger.* (Décembre et Mai.)
— Fin-or d'été. *Duh.* (Mi-Août.)
— Fin-or de Septembre.

Poirier Franc-farau.
— Franc-réal. *Duh.* (Octobre et Novembre.)
— Franchipane. *Duh.* (Septembre.)
— Gros muscat d'hiver. == Muscat d'hiver. *Christ.* (Décembre.)
— Gros rateau. (Janvier.)
— Hativeau. *Duh.* (Mi-Juillet.)
— Gros hativeau de la forêt. *Duh.* (Mi-Août.)
— Hennen-birne. *F. B.* (Octobre et Novembre)
— Jmmen-birne. *F. B.* (Septembre et Octobre.)
— Impériale à feuilles de chêne. *Duh.* (Mars et Avril.)
— Inconnue chenau. == Fondante, cassante de Brest. *D.* (fin. A.)
— Julienne de Carpentras. (Août.)
— Jalousie. *Duh. ed. nov.* (fin Septembre)
— Jaune de merveillon. *Prov.* (Juin.)
— Kron-Birne. *Christ.* (Mars et Mai.)
— Louise bonne. *Duh.* (Novembre et Décembre.)
— Mansuette. == Solitaire. *Duh.* (Août.)
— Marquise. *Duh.* (Novembre et Décembre.)
— Martin sec. *Duh.* (Novembre et Décembre.)
— Martin sire. == Ronville. (Novembre et Décembre.)
— Merveille d'hiver. == Petit-oin. *Duh.* (Décembre.)
— Messire Jean doré. *Duh.* == Chaulis. (Octobre et Novem).
— Muscadelle à calice caduque. *Duh. ed. nov.* (Juin et Juillet.)
— Grosse muscadelle. *Duh. ed. nov.* (Juillet.)
— Petit muscat. == Sept en gueule. *Duh.* (Juin.)
— Muscat lalleman. *Duh.* (Fevrier et Mars.)
— Muscat fleuri. *Duh.* (fin-Juillet.)
— Muscat robert. == P. d'ambre. == P. à la Reine. *Duh.* (fin-Juil.)
— Muscat Royal. *Duh.* (C. Septembre.)
— Ognonet. == Archiduc d'été. == Amiré roux. *Duh.* (C. Août.)
— Ognonet de Provence. (*Duh. ed. nov.* (Juillet.)
— Orange d'hiver. *Duh.* (Février et Avril.)
— Orange musquée. *Duh.* (Août.)
— Orange rouge d'été. *Duh.* (Mi-Août.)
— Orange tulipée. == Poire aux mouches. *Duh.* == Grosse orange d'automne. (Septembre.)
— Orange tulipée de Tonelle. (Août.)
— Orange tulipée. *Dupy.*
— Parfum d'Août. *Duh.* (Août.)
— Passe colmart vineux. *Van-mons.*
— Passa-tutti. *F. B.*
— Pastorale. == Mansuette d'automne. *Duh.* (Novem. et Décem.)
— Payency. == Poire de Périgor. *Calv.* (Octobre.)
— Poire d'amiral. *Duh. ed. nov.* (fin-Septembre.)
— D'amour. == Trésor. == Amour. *Duh.*
— au lard. *Manger.* (Août et Septembre.)
— D'ange. *Duh.* (Août.)
— D'ange d'hiver. *F. B.* (Décembre.)
— Belle Audibert. *Duh. ed. nov.* (Novembre et Décembre.)
— A bouquet.
— Brutte bonne. == Grise bonne. == Malconnaître. == Trompe chasseur. (Août.)
— Des Chartreux. (fin-Août.)
— Poire des champs des Chartreux. *H. P.*
— Champ riche d'Italie. *Duh.* (Décembre et Janvier.)
— Chaptal. *Duh. ed. nov.* (Février.)
— De Colmart. == Poire manne. *Duh.* (Janvier et Mars.)
— Cramoisi. *Calv.* (Octobre.)
— A deux têtes. *Duh.* (fin-Juillet.)
— A deux yeux. *Duh. ed. nov.*
— Douce des basses Alpes. *H. P.* == bergamotte crassanne?
— De fer. (à cuire.) *Manger.* (Décembre et Février.)
— Figue. *Duh.* (Septembre.)
— De la forêt. == Grise bonne. *Duh.* (Août.)
— A gobert. *Duh. ed. nov.* (Décembre et Juin.)
— Jalvé. *F. B.* (Mars et Avril.)
— De jardin. *Duh.*
— De kienzheim. *F. B.* (Septembre.)
— De lansac. == Dauphine. == Satin. *Duh.* (Oct. et Janv.)
— De livre. *Duh.* == Gros râteau gris. (Décembre et Fevrier.)
— De Magdelaine. == Citron des carmes. *Duh.* (fin-Juillet.)
— De Malte. == Caillot rosat d'hiver. *F. B.* (Déc. et Janv.)
— De Marcenay. *F. B.*
— De Naples. *Duh.* (Novembre.)
— D'œuf. == Colmar d'été. *Duh.* (Août.)

Poire d'Oignon. == Epine rose d'été. *Duh.* (Août.)
— D'or. *Prov.* (Août.)
— Passans ou du Portugal. *Calv.* (Octobre.)
— De Prêtre. *Duh.* (Février.)
— De quarante onces. *Duh. ed. nov.* (Novembre et Décem.)
— De saint François. *Duh. ed. nov.* (Novembre et Décembre.)
— De Saint Pierre. *T. Obstg.* (mi-Juillet.)
— De Saint Pierre. *Langlois.* (Juillet.)
— Sans peau. == Fleurs de guignes. *Duh.* (C. Août.)
— De Septembre, la grosse. *Christ.* (Septembre.)
— Tonneau. *Duh.* (Octobre et Novembre.)
— Vierge. *Manger.*
— De vigne. == Poire de demoiselles. *Duh.* (Octobre.)
— De vitrer. *Duh.* (Novembre et Décembre.)
— Présent Royal de Naples. *Christ.* (Mars et Avril.)
— Reine d'hiver. *Christ.* (Novembre et Mars.)
— Robine. == Royale d'été. *Duh.* (Août.)
— De Provence. *Duh. ed. nov.* (Juillet et Août.)
— Royale d'hiver == *Duh.* == Spina di christi. *Des Italiens.*
— Rousselet hâtif. == Poire de chypre. == Perdreau. *Duh.* == *Pyrus ruffescens.* H. P. (fin-Juillet.)
— Rousselet, le gros. == Rois d'été. *Duh.* (fin-Août.)
— Rousselet d'hiver. *Duh.* (Février et Mars.)
— Rousselet de Rheims. *Duh.* (C. Septembre.)
— Rousselet de Stouttgard. *Christ.* (mi-Août.)
— Rousseline. *Duh.* (Septembre.)
— Saint Augustin. *Duh.* (Décembre et Janvier.)
— Saint Gal. == Poire au vin. *F. B.* (Décembre et Mars.)
— Saint Germain == Inconnue la fare. *Duh.* (Nov. et Avril.)
— Saint Germain d'été. *Duh. ed. nov.* == Jargonelle. *Prov.* (Août.)
— Saint Germain jaune. *Manger.* (Novembre et Avril.)
— Saint Germain panaché. *F. B.* (Novembre et Avril.)
— Saint Lezin. == Saint Lezain. *Duh. ed. nov.* (C. Octobre.)
— Saint père. == Saint Pair. *Duh.* (Mars.)
— Salviati *Duh.* (fin-Août.)
— Sanguine. == Poire d'Italie. *Duh. ed. nov.* (Août.)
— Sanguinole. *Duh.* (mi-Août.)
— Sarrazin. == Poire Sarrazin. *C. de char.* (*Mat.* D. an à l'autre.)
— Sarrazin de Duhamel. (d'un an à l'autre.)
— Schœubler-birne. *F. B.* (Octobre.)
— Seile-birne. *F. B.* (Octobre.)
— Stadel-birne. *F. B.* (Octobre.)
— Stümpfler-birne *T. Obstg.* (fin-Août.)
— Stümpfling. *F. B.* (fin-Juillet.)
— Sucré vert. *Duh.* (Octobre.)
— Sucré d'hoyesrwerda. *Christ.* (Août.)
— Sucré de zuric. *F. B.* (fin-Août.)
— Suprême. == Suprême de Merlé. *Duh.*
— Tarquin. *Duh.* (Avril et Mai.)
— Truite. *Christ.* Novembre et Décembre.)
— Vallée d'été. (Août.)
— Vallée. (Septembre.)
— Verte longue d'automne. == Mouille bouche. *Duh.* (Septem.)
— Verte longue panachée. == Culotte suisse. *Duh.* (Septembre.)
— Verte d'hiver. *Henne* - *F. B.* (Décembre et Avril.)
— Virgouleuse. *Duh.* == Poire glace. (Décembre et Janvier.)

Poiriers haute tige sur cognassier	de 50 à 80 c.
— mi-tige *id.*	50 à 60 c.
— basse-tige *id.*	30 à 50 c.
— haute-tige sur franc.	80 à 1 f. 25. c.
— basse-tige *id.*	de 50 à 75 c.

POMMIERS.

Pommier commun. == *Malus communis.* D. C. == *Pyrus malus.* Lin. == *Sorbus malus.* Crantz.
— Aagtje rouge. *F. B.* — *Christ.* (*Mat.* Fevrier-Mars.)
— blanc. == *Saete enkhuisser aagtje.* F. B. == *Christ.* (*Mat* Fevrier-Mars.)
— Api le petit. == Api long-bois. == Pomme Dieu. == *Malus apiosa.* H. P. (*Mat.* Décembre-Avril.)

Pommier

Pommier api panaché. (*Mat.* Décembre-Janvier.) 1 f. 25 c.
— noir. *Duh.* = Pomme noire. (*Mat.* Oct.-Déc.)
— d'Été, gros. *Duh. ed. nov.* = P. magdeleine ? *Calv.* (*Mat.* Juillet.)
— Baidane. *H. P.*
— Belle fleur. *F. B.* = *Manger.*
— Belle d'Hervey. *H. P.*
— Benzler. *F. B.* (*Mat.* Décembre-Fevrier.)
— Bohnapfel grand. *F. B.*
— Borsdorfer. = Reinette de Misnie. = R. bâtarde. *F. B.* - *T. Obst.* (*Mat.* Décembre-Avril.)
— le grand Bohémien. *F. B.* || *Christ.* (*Mat.* idem.)
— Ognoniforme. *F. B.* || *Christ.* (*Mat.* id.)
— Rouge. *F. B.* || *Christ.* (*Mat.* Décembre.)
— Bouquet-preuve. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Janv. Avril.)
— Bredine. *H. P.*
— Breitner. *F. B.* (*Mat.* 9.bre. Mars.)
— Calville d'Angleterre. *Christ.* (*Mat.* Mai.)
— Blanche d'été. *Christ.* = Passe-pomme. = Grosse pomme magdeleine. = *Malus calvillea.* H. P. (*Mat.* Mi-Juillet.)
— d'hiver. *Duh. ed. nov.* = Bonnet carré. = P. glace. (*Mat.* Décembre avril.)
— Rouge d'Automne. *Duh.* = Pomme violette. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Décembre.)
— d'été. *Duh.* (*Mat.* Juillet.)
— d'hiver. *Duh.* (*Mat.* Décembre et Mars.)
— de Normandie. = Cœur de bœuf.
— Cardinal rouge. *Christ.*
— Chemise de soie blanche. *Christ.* (*Mat.* 9.bre et Décembre.)
— Rouge. *T. Obst.* (*Mat.* Décembre et Fevrier.)
— Citron. *F. B.* (*Mat.* Décembre et Fevrier.)
— Couchine, petite, d'hiver. *Duh. ed. nov.* = Petit paradis. = Pomme de St. Michel. *Prov.* (*Mat.* Janv.-avril.)
— d'hiver grosse. *Duh. ed. nov.* = gros Paradis. *Prov.*
— d'été. *Duh. ed. nov.* = Paradis d'Août. *Prov.* = Pomme de Duplessis. *Lang.* (*Mat.* Août.)
— de Deymier. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Janvier et Avril.)
— Rouge. *Duh. ed. nov.* = Paradis rouge. *Prov.* (*Mat.* Octobre et Janvier.)
— Cœur de pigeon. = Jérusalem. *Duh.* (*Mat.* Novembre et Décembre.)
— Courtpendu blanc. *F. B.* (*Mat.* Décembre et Avril.)
— Gris le gros. = Pomme de Berlin. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— Plat. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— Rouge. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— Demi-lilen. *Jacq. B.*
— Doucin. *Duh.* (*Mat.* Juin.)
— Fenouillet gris. = Pomme d'anis. *Duh.* (*Mat.* Déc.-Fevrier.)
— Rouge. *Duh. ed. nov.* = Bardin. = Azérolly. = Court-pendu de la Quintinye. (Novembre-Mars.)
— Jaune. = Drap d'or. *Duh.* = Pomme de caractères. (*Mat.* Septembre et Octobre.)
— Fleiner d'été. *F. B.*
— Francatu.
— Cranch la douce. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Mars.)
— Aigre. *F. B.* (*Mat.* idem.)
— Gros api d'hiver. = Pomme de rose. = Passe rose. *Duh.* (*Mat.* Novembre - Fevrier.)
— Gros bon. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— Gros-faros. *Duh.* (*Mat.* Décembre - Fevrier.)
— Herrn apfel. *F. B.* = Pomme de Monsieur.
— Ignonette. *Jacq. B.* (*Mat.* Décembre - Mars.)
— Juncker apfel. *F. B.* = Pomme de cadet.
— Lookriecher. *F. B.*
— Maderée d'été acide. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Juin - Juillet.)
— d'Août. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Août.)
— d'hiver. *Prov.* (*Mat.* Octobre - Janvier.)
— de Tounelle. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Septembre.)
— Malzer noble. *F. B.*
— Marguerite. *Manger.* (*Mat.* Juillet.)
— Matapfel à fleurs tardives. *Christ.* (*Mat.* Nov. et Décembre.)
— Mäucher rouge. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Fevrier.)
— Menagère. *F. B.* (*Mat.* Novembre et Fevrier.)

Pommier Merveille de Portland. *F. B.*
— Museau de lièvre. *Duh. ed. nov.* = Petit pigeonet ? (*Mat.* Septembre - Novembre.)
— Nègre doré. *Christ.* (*Mat.* Décembre - avril.)
— Paradis. *Duh.* (*Mat.* Juillet.)
— Passe pomme rouge d'automne. *Duh.* (*Mat.* Octobre.)
— Passe pomme rouge d'été. *Duh.* = Calville rouge d'été. = Pomme de Chateau-Renard. *Prov.* (*Mat.* Juillet - Aout.)
— Pater noster. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Fevrier.)
— Pepin argenté d'Angleterre. *F. B.*
— d'été. *Christ.*
— Franche. *Manger.* (*Mat.* Décembre - Fevrier.)
— Noble. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— d'or *ou* pomme d'or. *Duh.* = Reinette d'Angleterre. = R. de Cantorbery. = Gold pippin. (*Mat.* Déc.-Mars.)
— Parmain Loan's. *Christ.* (*Mat.* Septembre.)
— Royal. *Christ.* (*Mat.* Novembre - Décembre.)
— Petit bon. = Courtpendu sanguin. *F. B.* (*Mat.* 9.bre - Mars.)
— Pigeonnet rouge. *F. B.* (*Mat.* Novembre - Mars.)
— Pomme d'Adam. *F. B.* (de 2 à 3 années.)
— Ananas. *H. P.* (*Mat.* Janvier - Mars.)
— d'Andène. *H. P.*
— d'Astems. = Strifling d'hiver. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— d'Astracant. = P. transparente. (*Mat.* Août.)
— d'Avent ? *F. B.* (*Mat.* d'un an à l'autre.)
— de Bâle. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— de Barberin. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Janvier - Avril.)
— de Canada grise.
— Chataigne *du Léman.* F. B. (*Mat.* Décembre - Juin.)
— Chaudron. *Jacq. B.*
— de Cierge d'hiver. *H. P.* = Wachs - apfel ? *F. B.* (*Mat.* Décembre-Avril.)
— de la Chine à fleurs doubles. = *Pyrus spectabilis.* Willd.
— Concombre. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Nov. et Déc.)
— Concombre des chartreux. *H. P.*
— Dioïque. = Sans fleurs et sans pepins. *Prov.* = *Malus dioïca.* Duh. ed. nov. = *Pyrus dioïca.* = *Malus non florens.* Bauh. (*Mat.* Juillet.)
— double rouge de paradis. *Christ.* (*Mat* Fev. - Mars.)
— Douce de Bollwiller. *F. B.* (*Mat.* Nov. - Mai.)
— de Doyen. = Prost-apfel. *F. B.* (*Mat.* 9.bre - Mai.)
— de drap d'or. = Vrai drap d'or. *Duh.* (8.bre - Déc.)
— de Durand. *Lang.* (*Mat.* Juillet.)
— Figue. *Duh.* (*Mat.* Novembre - Décembre.)
— Franche.
— Gélée d'été. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Août.)
— Gelée d'hiver. *Prov. Lang.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— de glace. = Transparente. *Duh.* (*Mat.* Août.)
— Grœfenstein. *Christ.*
— Hâtive avant toutes. *Christ.* (*Mat.* Juillet.)
— Hâtive de Pézenas. = Caremille. *Duh. ed. nov.* (Juill.)
— de haute bonté. *Duh.* (*Mat.* Décembre - Juin.)
— de Malecarle. *Duh. ed. nov.* = Pomme de Charles.
— Noire d'Amérique. *Calv.*
— Non pareille. *Duh.* (*Mat.* Janvier - Mars.)
— Panachée. *F. B.*
— Poire. *Calv.* (Déc. - Mars.)
— Poire la grosse. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Fevrier.)
— Quarrée.
— de St. Jacques. *F. B.* (*Mat.* Mi-Août.)
— de St. Jean. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Juin.)
— de St. Jean gros. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Juin.)
— de St. Louis. *F. B.* (*Mat.* Août.)
— de St. Michel. *H. P.*
— de S.t Nicolas. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— Romarin blanche. *Christ.* (*Mat.* Novembre - Fevrier.)
— R. rouge. *Christ.* (*Mat.* Août.)
— de Sibérie. = *Malus baccata.* Pers. (*Mat.* Août - Sept.)
— de Stettin la jaune. *Christ.*
— Transparente de Zuric. *F. B.* (*Mat.* Fin-Août.)
— *id.* de Moscovie ? *F. B.*
— Postophe d'été. *Duh.* (*Mat.* Fin-Octobre.)
— d'hiver. *Duh.* = Moyeuve. *F. B.*
— Présent royal. *Manger.*

Pomme Princesse de Diel. *F. B.* (*Mat.* Novembre - Mars.)
— Pupecher. *F. B.*
— Quince apfel. *Manger.*
— Rambourg d'hiver. *Duh.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— Franc. *Duh.* == Rambourg d'été. *Duh. ed. nov.* (*Mat.* Août-Septembre.)
— Reinette d'Aizerma. == R. Breda. == R. Nelguin. *Christ.*
— Allemande. *Christ.* (*Mat.* Janvier - Avril.)
— d'Angleterre, la grosse. == R. de Trianon. == R. de Canada. *Duh.* (*Mat.* Novembre - Février.)
— Blanche. *Duh.* == Pomme de S.t Julien (*en Normandie.*)
— de Brétagne. *Duh.* (*Mat.* Octobre - Novembre.)
— Brodée *ou* filée. *Christ.*
— Carpentin. *Christ.*
— Dorée *ou* jaune tardive. *Duh.* (*Mat.* Décembre - Mars.)
— Dorée. *Christ.*
— Franche. *Duh:* (*Mat.* Janvier - Mai.)
— Grise. *Duh.*
— Grise d'Angleterre. == Pomme de chat. *Comtat.* (Fév.)
— Grise de Champagne. *Duh.* (*Mat.* Février - Mars.)
— Grise d'hiver de Metz. *F. B.* (*Mat.* d'un an à l'autre.)
— Grise d'hiver la petite. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— Grise dorée. *F. B.* (*Mat.* Nov. - Avril.)
— Jaune hâtive. *Duh.* (*Mat.* Septembre - Octobre.)
— Marbrée. == R. Grise d'automne. *F. B.* (*Mat.* Nov.)
— Monthron. *Christ.* (*Mat.* Janvier - Février.)
— Musqué. *Christ.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— Naine. *Duh.* == Pommier nain de Reinette. (*Mat.* Décembre - Mars.)
— Non pareille. == Soete Son-apfel. *F. B.* (Déc. - Avril.)
— Du nord. *F. B.*
— Panachée. *Jacq. B.*
— Piquée. *F. B.*
— Poire. *F. B.* (*Mat.* Octobre - Janvier.)
— Princesse. *Duh.* == R. de Newyorck. == R. de Casel. *F. B.* == Princesse noble. (*Mat.* Novembre-Janvier.)
— De rochelle. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Janvier.
— Rayée rouge hâtive.
— Rayée de rouge. *Duh. ed. nov.* == Royale d'Angleterre.
— Rouge. *Duh.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— Rouge de Sickler. *T. Obstg.* (*Mat.* Décembre - Avril.)
— Rousse. *H. P.* (*Mat.* Janvier - Mars.)
— Royale. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Mars.)
— Saffran. *F. B.* (*Mat.* Décembre - Mars.)
— Sorgvliet. *T. Obstg.*
— Truite. *T. Obstg.* (*Mat.* Mai.)
— Verte. *Duh. ed. nov.* (Janvier - Fevrier.)
— Verte de Christ. *F. B.* (Janvier - Avril.)
— Du Vigan. *Lang.* (*Mat.* Octobre - Juin.)
— Revalischer birnen-apfel. *Christ.*
— Rhein-apfel. == Parmain rayé d'hiver. *T. Obst.* (*Mat.* Décembre - Mai.)
— Rhin douce. *F. B.*
— Rhimlicher - Krieslicher. *F. B.* (*Mat.* Novembre - Mai.)
— Roi très-noble. *Christ.*
— Rosenhoger. *Christ.* (*Mat.* Octobre - Novembre.)
— Rostocher. == Stetting rouge. *T. Obstg.* (Déc. - Avril.)
— Royale d'Angleterre. == Reinette de Windsor; monstrueuse. *Christ.* (*Mat.* Novembre - Janvier.)
— Siebens klæfer. *F. B.*
— Silberling. *F. B.* == Pomme argentée.
— Soete-Holart. *Chist.* (*Mat.* Septembre - Avril.)
— Spanché - Guilderling; Frambose. *Manger.* (*Mat.* Fevrier-Mars.)
— Streiling. == Stràumerling. *T. Obstg.* (*Mat.* Nov. Fév.)
— Valreas le gros. *Lang.* (*Mat.* Octobre - Avril.)
— le petit. *Lang.* (*Mat.* Octobre - Avril.)
— Vasserlinger. *F. B.* (Septembre - Avril.)

POMMIERS hautes tiges		sur franc	50 c.
— id. de premier choix		id.	70
— Mi-tiges.		id.	50
— Basses tiges.		id.	40
— Nains greffés sur paradis.		id.	50
Sauvageons de pommiers; plants de 1 à 3 ans.		de 2 à 5 f. le °/o	
Pommiers paradis, *pour nains*, les 100 replants		de 3 à 6 f. le °/o	

PRUNIERS.

Prune domestique == P. commune. == *Prunus domestica. L.* == *P. Sativa. Fuchs.*
— Belle de Riom. *H. P.*
— Bricette. *Duh.* (Septembre.)
— Damas ambré == *Prunus damascena. H. P.* (Août.)
— Ballon (Août.)
— Blanc le gros *Duh.* (mi-Août.)
— Blanc petit *Duh.* (fin-Août.)
— Dronet. *Duh.* (Août.)
— d'Espagne. *Duh. ed. nov.* (fin-Août.)
— d'Italie. *Duh.* (fin-Août.)
— De Maugeron. *Duh.* (mi-Août.)
— Le gros.
— Musqué. == P. de Malthe. == P. de Chypre *Duh.* (mi-A.)
— Rouge. *Duh.* (mi-Août.)
— Rouge tardif. *Duh. ed. nov.* (mi-Septembre.)
— De Septembre. == Prune de vacances. *Duh.* (Septem.)
— De Tours. *Duh.* (mi-Juillet.)
— De tours le gros. *Duh:*
— Violet. *Duh.* (fin-Juillet.)
Prune Damasquinée.
— Dame Aubert jaune. == Grosse luisante. *Duh.* (fin-Août.)
— Rouge.
— Violette.
— Diaprée rouge. == Robe de sergent. == Roche-Corbon. *Duh.* == *Prunus diaprea* (mi-Août.)
— Violette *Duh.* (C. Août.)
— Grosse noire hâtive == Precoce de tours. == Noire de Montreuil. *Duh.* (mi-Juillet.)
— Ileverte. *Duh.* (fin-Août.)
— Impératrice violette. *Duh.* (Septembre.)
— blanche? *Duh.* (fin-Août.)
— Impériale Otomanne. *F. B.* (Juillet et Août.)
— violette == Prune d'œuf. == *Prunus Imperialis.* *id.* à feuilles panachées. (Août.)
— Jacinthe. *Duh.* (Août.)
— Jaune hâtive. == P. de Catalogne *Duh.* == P. de Saint Bernabé.
Mirabelle grosse. == Drap. d'or. == Mirabelle double. *Duh.* *Prunus cereola.* H. P. (Août.)
— Petite. == M. perlée. (mi-Août.)
— Rouge. *Prov.* (C. Août.)
Mirobolan. == *Prunus cerasifera.* Willd. (Juillet.) 1 f.
Moyeu de Bourgogne. *Calv.* (mi-Septembre.)
Perdigon blanc. *Duh.* == Prune rognon. == *Prunus amygdalina* H. P.
— Hâtif. *Duh. ed. nov.* (mi-Juillet.)
— Normand. *Duh.* (fin-Août.)
— Rouge. *Duh.* (Septembre.)
— De Saint Michel. *Prov.* == P. tardive. *Lang.* (Sept.)
— Violet. *Prov.* (fin-Juillet.)
— Panaché (Juillet.)
— Prune abricot (fin-Août.)
— Abricotée blanche. *Duh. ed. nov.* == *Prunus maliformis.* (mi-Août.)
— Rouge. *Duh. ed. nov.* (mi-Août.)
— Cerisette. == Prunier ceriset. *Duh.*
— Datte. *Duh.* (fin-Août.)
— A fleurs doubles. 1 f.
— A fleurs semi doubles (Août.)
— De Jérusalem. *Duh. ed. nov.* (fin-Juillet.)
— De monsieur. *Duh.* (fin-Juillet.)
— *Id.* hâtif. *Duh.* (C. Juillet.)
— Pêche *Calv.* (Août.)
— Précoce de tours. *Duh.*
— Qui fructifie deux fois l'an. == Prunier de deux saisons. *Duh.* == *Prunus bifera.* (Août et Septem.) 1 f.
— Sans noyeau. *Duh. ed. nov.* == *Prunus enucleata.* 1 f.
— De Saint Martin rouge *Duh.* (Octobre et Novembre.)
— Suisse. *H. P.* == P. de monsieur tardive *Duh. ed. nov.*
— Virginal à fruit blanc *Duh. ed. nov.* (fin-Août.)
— Rouge. *Id.* (C. Août.)

Prune Reine claude. == Dauphine. == Abricot vert. == Verte bonne. == Sucrin vert. == Damas vert. *Duh.* == *Prunus Claudiana.* H. P.
— Petite. *Duh.*
— *Id.* nouvelle espèce.
— Semi double. *Duh.*
— Tardive nouvelle espèce.
— Violette. *Duh. ed. nov.*
— Royale. *Duh.*
— Ordinaire.
— De Tours. *Duh.* == Prune Roi. == *P. regia.* (fin-Juillet.)
— Saint Julien. *Duh.* (Août.)
— Panaché. (Août)
— Sainte Cathérine. *Duh.* == *Prunus cerea.* H. P. (Septem.)
— Violette. *Prov.* (Novembre et Décembre.)
— Tardive de Chalon. *Dh.* (Octobre.)
— Zwetschen. == Prune d'Allemagne. == Cuetche. == Quetche. *Duh. ed. nov.*
— De brême F. B. (Août et Octobre.)
— La grosse. *F. B.* (Août. et Octobre.)
— d'Italie. *nouv. esp. F. B.* (Août et Octobre.)

Prunier haute tige de 50 à 75 c.
— *Id.* greffé en tête. de 90 c. à 1 f. 25 c.
— mi-tige de 40 à 60 c.
— basse tige 40 c.

SORBIERS.

Sorbier Commun == Sorbier cultivé. == Cormier. == *Sorbus domestica. L.* de 75. c. à 1 fr.

Var. { à gros fruits. *nouvelle espèce* de 2 à 3 fr.
à fruit tardif. *idem.* de 2 à 2 f. 50 c. }

VIGNES.

Variétés à Grains ronds noirs.

Raisin Aramon noir. *Gard.*
Bourboulenque noire. == Negrette. == Noiret. *Gard.*
Calitor noir. == Saure, *à St. Gilles.* == Quenoise, *à Avignon.* == Moustardié, *à Tarascon.*
Var. à grappes serrées.
à grappes lâches.
Doucinelle noire.
Espar. == Mourvés noir. *Gard.* == Benadu, *à Tarascon.* == Bérardi, *à Avignon.*
Grenache. *Gard.* == Teinturier. *Roq.* == Teinteau. == Gros noir. Mouré. == Noir d'Espagne. == Portugal. == Alicante. == Plan de Manosque. == Romé noir. == *Bretoneria.* St. Rox. Clem. == *Vitis acino nigro.* etc. Garid. 28.
Iraguan noir. *Gard.*
Maroc. == Raisin d'Afrique. == R. d'Espagne. == Materot.
Marroquin. *Gard.* == Espagnin. *Prov.* == *Vitis duracina.* Garid. 27.
Morillon hâtif. == Raisin de la Magdeleine. == Raisin de la St Jean. == Maurico. == Pineau en Bourgogne. == *Vitis precox.* Garid. 10.
Moulan. *Gard.*
Muscat noir. == M. rouge. == moscatel menudo violet. == *Vitis moschata.* S. Rox. Clem. == *Vitis apiana Nigro-acino.* Garid. 40.
Panpegat. == Le Provençal. *Lang.*
Peyran noir. == Spiran. == Pyran. == Aspiran. *Lang.*
Picardan noir.
Piquepoule noir.
Terré moureau noir. *Lang.*
— De Barri noir. *Lang.*
Ugne noir. == Uni négre. *Prov-Lang.* == *V tis. etc.* Garid. 33.

Variétés à grains noirs allongés.

Raisin Augibert noir. *Lang.*
Grand Guillaume. == Crête de coq. == Rognon de coq. == *Vitis uva maxima.* etc. Garid. 34.
Muscat violet. *Duh.* == M. long violet. *Liger.* == Moscatel apiana obovata. *Sim. Rox. Cl.* Garid. 5.
Olivette noir. == Cornichon noir. == *Vitis acino-obl.* etc. Garid. 38.
Ulliade. *Prov.*
Verjus. == Grey. == Grégeoir. == Bourdelas.

Variétés à grains blancs ronds.

Augibert blanc. *Lang.* == Plan de la Barre. == Raisin de madame.
Assadoule bouvier. *Lang.* || *Prov.*
Chasselas doré. == Bar-sur-Aube. *Duh.* == Raisin de Champagne.
id. musqué. *Duh.*
Ciotat. == Raisin d'Autriche. *Duh.* == Malvoisie. *Prov.* == *Vitis laciniata.* Lin.
Clairette ronde.
Corinthe blanc. == Raisin de S.t Roch. == R. sans pepin. == *Vitis corinthiaca.* Garid. 2. *Vitis apyrena.*
Doucinelle blanche. *Prov.* == Douceagne. == Doucet blanc précoce. *Gard.* == Roussane. *Comtat.* == *Vitis precox.* Garid. 11.
Granache blanc. *Lang.*
Muscat blanc. == M. de Frontignan. == *Moscatel menudo blanco.* Esp. == *V. generosa.* S. Rox. Clem. == *Vitis acinis albidis.* etc. Garid. 5.
Ugne blanche. *Prov.* == Matinié. == Sauvagnien blanc. == *Vitis acino rotundo albido.* Garid. 16.

Variétés à grains blancs allongés.

Calitor blanc.
Clarette longue. *Prov.* == Sauvignon. *Chap.* == Sucrin. == Marrillon blanc. == Fié.
Columbau. *Gard.*
Cornichon blanc. *Duh.* == Crochu. == Doigt de Donzelle, à Maroc. *Ebn.-Elbeithar.* == Teta de vaca. *Espag.* == Santa Paula de Grenade. == *Bumasti longissima.* S. Rox. Clem. == *Vitis ablongo acino.* etc. Garid. 36.
Galet blanc. *Gard.*
Jouanen blanc. == magdelenen. == *Vitis precox. etc.* Garid. 8.
Muscat d'Alexandrie. == M. d'Espagne. == M. de Rome. == Panse longue musquée. == Moscatel gordo blanco. *Espag.* *Uva isidori.* S. Rox. Clem. == *Vitis pergulana. etc.* Garid.
Olivette blanche. == Crête de coq blanche. *Prov.* == Teta de vaca blanca. *Espag.* == *Bumasti gracilis.* S. Rox. Clem. == *Vitis acinis albidis acuminatis. etc.* Garid. 22.
Penduleau. == Ria de panse. == Panse musquée. *Prov.* (Passes.) == Passa larga. *Esp.* == Almunecar. == *Bumasti longa.* S. Rox. Clem. == *Vitis pergulana. etc.* Garid. 17.
Picardan blanc. *Prov.* == Pineau blanc. == Melé. == Guache blanc == Menu. == Feuille ronde. *Chap.*

Variétés à grains rouges, roses ou grisâtres.

Clairette rose. *Prov.*
Grec. *Prov.* == Royal. *Espagn.* == Gré rouge. == Perruno noir. == Rosierii ? *S. Rox. Clem.* == *Vitis acino rubro.* Garid. 35.
Martinen. == Raisin de la S.t Martin.

Raisin Muscat gris. *F.B.*
Pineau gris. == Auvergnat gris. == Pique poule bourre == Le griset blanc. *Chap.* == Rin gris. *Prov.* == *Vitis acinis griseis. etc.* Garid.
Très-dur. == Raisin de poche. == Teta de vaca leonada. == *Bumasti. Sulcata.* S. Rox. Cl.

VIGNES de 50 à 75 c.

VINETTIERS.

— Commun. == Epine-vinette. == *Berberis vulgaris.* L. 25 c.
— Sans pepins. == *B. abortiva.* 1 f. 50
— Du Canada. == *Canadensis.* 50
Les 100 replants de 2 ans de vinetier commun, 10 f.
(Voyez pour les autres espèces la section suivante.)

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

ABIES alba. *Mich.* == A. picea. *Duh.* == Pinus alba. *Ait.* == P. Canadensis. *Wangenh.* == *Epicea blanc.* == *Sapinette blanche.* G A † 1 à 3 f.
— *b.* orientalis. *Poir.* == Pinus orientalis. *L.* == *Sapin blanc.* A † de 2 à 4 f.
— Balsamea *Mill.* == A. balsamifera. *Mich.* == Pinus balsamea. *L.* == *Sapin baumier.* == *Sapin argenté.* == *Baumier de Gilead.* G A † de 1 à 4. f.
— Canadensis. *Mich.* == Pinus canadensis. *L.* == *Sapin du Canada.* Duh. ed. nov. == *Hemelok sprusse.* == *Périsse.* G A † de 1 à 4 f. 50 c.
— Cedrus. *Poir.* == Pinus cedrus. *L.* == Larix cedrus. *Mill.* == *Cèdre du Liban.* == *Sapin cèdre.* G A † de 2 à 8 f.
— Excelsa. *Poir.* == A. rubra. *Trag.* == A picea. *Mill.* == Pinus abies. *L.* == P. excelsus. *Lam.* == *Sapin élevé.* G A † de 1 à 3 f.
— Larix. *Lam.* == Larix decidua. *Mill.* == L. europea. *D. C.* == Pinus larix. *L.* == *Mélèze.* == *Sapin mélèze.* G A. de 1 à 3 *f.*
— Microcarpa. *Duh. ed. nov.* == A. americana. *Poir.* == Larix microcarpa. == L. nigra. *Marsch.* == L. americana. *Mich.* == Pinus microcarpa. *Will.* == P. laricina. *Du Roi.* == *Mélèze d'Amérique.* == *Sapin à petits fruits.* A. de 2 à 4 f.
— Nigra. *Poir.* A. denticulata. *Mich.* == Pinus nigra. *Ait.* == *Sapin noir.* == *S. double.* == *Epinette noire.* == *Epinette à la bière.* A † de 2 à 4 f.
— Pectinata. *D C* == A. vulgaris. *Poir.* == A. alba. *Mill.* == A. Candida. *Trag.* == Pinus picea. *L.* == P. pectinatus. *Lam.* == *Sapin en peigne.* == *Sapin Argenté.* == *Sapin Commun.* G A † 1 à 3 fr.
ACER campestre. *L.* == *Erable des champs.* B » G. 6 à 30 fr. le °/o
b. Villosa. == *à semence velue.* 1 à 2 f.
— Creticum. *L.* == A. trilobatum. *Lam.* == *Erable de Crète.* B 2 à 4 f.
— Dasycarpum. *Ehrh.* == A. rubrum mas. *L.* == A. Pallidum. *Ait.* == A. glaucum. *Marsch.* == A. Eriocarpum. *Mich.* == A. Tomentosum. == *Erable tomenteux.* == *E. cotonneux.* A 2 à 4 f.
— Heterophyllum ? *Willid.* == A. Sempervirens. *L.* == *Erable toujours vert.* 1 à 3 f.
— Hybridum Bosc. == *Erable hybride.* 2 à 4 f.
— Monspessulanum. L. == A. Trilobatum. *Lam.* == A. trifolium. *Bauh.* == *Erable à 3 lobes.* == *E. de Montpellier.* == *Agas. Lang.* G A. » 75 c. à 2 f.
— Negundo. L. == *Erable à feuilles de frêne.* == *E. faux à sucre.* G A 1 à 2 f.
— Opalus == A. rotundifolium. *Lam.* == A. Italum. *Lauth.* == *Erable Opale.* == *Duret.* G A. 1 à 2 f.
— *b.* opulifolium. *Vill.* == *E. à feuilles d'Aubier.* A 2 à 3 f.
— Pensylvanicum. *H. K.* == A. Striatum. *Lam.* == A. canadense. *Duh.* == *Erable jaspé.* == *E. de Pensylvanie.* B. de 2 à 3 f.
— Platanoïdes. *L.* == A. latescens. == *Erable plane.* == *E. à larges feuilles.* G A de 1 à 2 f. 50 c.
— Laciniatum. == *E. à pattes d'oie.* == *E. à main crochue.* A. 1 à 3 f.
— Pseudoplatanus. *L.* == *Erable sycomore.* G A de 1 à 2 f.
b. Foliis argenteo maculatis. == *Sycomore panaché.* A: 1 à 3 f.
— Rubrum. *L.* == A. coccineum. *Ait.* == *Erable rouge.* == *E. de Virginie.* A de 2 à 3 f.
Acer Saccharinum. *L.* == *Erable à sucre.* A de 2 à 5 f.
— Spicatum. *Lam.* == A. pensylvanicum. *Wangenh.* == A. montanum. *Ait.* == A. parviflorum. *Ehrh.* == *Erable de montagne.* == *E. à épis.* == *E. de Pensylvanie.* B de 1 à 3 f.
— Tartaricum. *L.* == *E. de Tartarie.* == *E. à feuilles de Mûrier.* G B de 1 à 2 f.
Adelia acitodon. == *Adélie épineuse.* * C de 1 50 à 2 f.
Æsculus coccinea. *D C* == Æ. carnea. *F. B.* == Æ. pavia rosea? *Hort. Angl.* == *Marronier à fleurs écarlates.* Nouvelle espèce. A de 3 à 8 f.
— Flava. *Ait.* == Æ lutea. G B de 1 à 4 f.
— Hybrida. *Bosc.* == Æ pallida ? *Mich.* == *Marronnier hybride.* B de 3 à 6 f.
— Hippocastanum. *L.* == Hippocastanum vulgare. *Gært.* == *Marronnier d'Inde.* == *Chataignier bâtard.* de 1 à 2 f. 50 c.
b. Foliis variegatis. == *Marronier panaché.* B. de 2 à 3 f.
— Macrostachia. *Mich.* == Æ. parviflora. *Walt.* == Æ. spicata *Hortul.* == Pavia alba. *Duh. ed. nov.* == P. dulcis. == *Marronnier nain.* == *Pavia nain à longs épis.* G. C. de 2 à 3 f.
— Pavia. == Pavia rubra. == *Pavia à fleurs rouges.* G. B. de 2 à 5 f.
b. Villosa. == *Pavia rouge velu.* G. B. de 3 à 5 f.
Agave americana: *L.* == *Agavé d'Amérique.* C. † * de 50 c. à 3 f.
b. Picta. == A. variegata. == *Agavé panaché.* C. † * de 75 c. à 4 f.
Ailanthus glandulosa. *Desf.* == A. sinensis == Rhus cacodendrum. *Ehrh.* == R. sinense. *Ellis.* == R. succedaneum ? *L.* == *Ailanthe.* == *Vernis de la Chine.* == *Vernis du Japon.* A. de 1 à 2 f. 25 c.
Alnus glutinosa. *Gært.* A. vulgaris. *Pers.* == Betula alnus. *L.* == *Aune commun.* == *A. visqueux.* == *Verne.* Prov. G. A. de 75 c. à 2 f.
— *b.* Laciniata. == *Aune à feuilles découpées.* B. de 2 à 3 f.
— Incana. == Betula incana. *L.* == *Aune blanchâtre* G. A. de 1 à 2 f. 50 c.
— Serrulata. *mich.* == Betula serrulata. *Ait.* == B. rugosa. *du Roi.* == *Aune à feuilles en scie.* A. de 2 à 3 f.
Alyssum saxatile. *L.* == *Alysse jaune* == *Corbeille d'or.* † C. de 30 à 75 c.
— Spinosum. *L.* == *Alysse épineux.* †. C. de 50 c. à 1 f.
Amorpha fruticosa *L.* *Amorpha frutiqueux.* == *Indigo bâtard* G. B. de 50 c. à 2 f.
— Glabra. *Desf.* == A. pseudo-anis. == *Amorpha glabre* C. * de 2 à 3 f.
Amygdalus Communis. *L.* == *Amandier commun.* (vide pag. 4.) G. A. de 40 à 60 f. °/o
— *b.* Amara. == *Amandier à fruit amer.* G. A.
— *c.* Fragilis. == *Amandier à coque tendre.* G. A:
— Hybrida *Pers.* *Amande pêche.* G. A. de 75 c. à 1 f.
— Nana. *L.* == *Amandier nain des Indes.* C. de 75 c. à 1 f.
— Orientalis *Ait.* == A argentea. *Lam.* == *Amandier argenté.* B. de 75 c. à 1 f.
— Persica. *L.* == *Pêcher.* (vide pag. 6.) G. B. de 40 c. à 1 f.
— Sibirica *F. B.* == *Amendier de Sibérie.* C.
Amyris polygama. *Cav.* == Schinus dependens. *Orteg.* == *Amyris polygame.* * B. de 2 à 4 f.
Anagyris fœtida. *L.* == *A. fæt.* == *Bois puant.* G. * † B. de 75 c. à 2 f.

Andromeda

Andromeda axillaris. *Lam.* = A. catesbæi *Walt.* = *Andromède axillaire.* C. † de 1 à 3 f.
— Caliculata. *L.* = *A. Caliculée.* C. † de 2 à 3 f.
— Lucida. = A. coriacea. *Ait.* = A. nitida. *Bartram.* = A. myrtifolia. *Hortul.* = *Andromède luisante.* C. † de 2 à 3 f.
— Mariana. *L.* = *Andromède du Maryland.* C. de 2 à 4 f.
— Polifolia. *L.* = *Andromède à feuilles de germandrée* C. † de 1 à 2 f.
b. Latifolia. = Andromède à larges feuilles. C. † de 1 à 2 f.
— Racemosa. *Lam.* = A. paniculata. *Walt.* = *Andromède à grappes.* C. de 1 à 2 f.
Annona triloba. *L.* = Orchidocarpum arietinum. *Mich.* = Porcelia triloba. *Pers.* = *Asiminier.* = *Corossol.* B. de 6 à 10 f.
Anthyllis barba jovis. *L. Anthyllide argentée* = *Barbe de Jupiter.* † C. 1 à 2 f.
— Cytisoïdes. *L.* = *Anthyllide à fleurs de cytise.* = *A. faux-cytise* † C. de 1 à 2 f.
— Hermaniæ. *L.* = Aspalanthus cretica. = *Anthyllide d'orient.* G. C. de 1 à 2 f.
Aralia spinosa. *L.* = *Angélique épineuse.* = *A. en arbre* C. de 1 à 3 f.
Arbutus andrachne. *L.* = *Arbousier du levant.* = *A. à panicules.* * † B. G. de 5 à 15 f.
— Unedo. *L. Arbousier fraisier en arbre.* * † B. G. de 75 c. à 2 f.
b. Flore rubro. = *A. à fleurs rouges.* * † B. de 2 à 4 f.
— Uva ursi. *L.* = Marania uva ursi. *Desv.* = Arctostaphyllos. *Adanson.* = *Arbousier Busserole.* = *Raisin d'Ours.* † C. de 50 c. à 2 f.
Aristolochia sempervirens. = *Aristoloche toujours verte* C. † § * de 1 à 2 f.
— Sipho. *Ait.* = A. macrophylla. *Lam.* = A. frutescens. *Marsch. Aristoloche à grandes fleurs* B. § de 2 à 3 f.
Aristotelia macqui. *L'Hérit.* = *Maqui du chili.* * B. de 2 à 4 f.
Armeniaca vulgaris. *Lam.* = Prunus armeniaca. *L.* = *Abricotier commun.* G. B. de 60 c. 1 f.
b. Macrocarpa. *H. P.* A. percicoïdes. *Pers.* = *Abricotier pêche.* G. B. de 60 c. à 1 f. 25 c.
c. Nigra. *H. P.* = A. dasycarpa. *Pers.* = A. atropurpurea. *Duh. ed. nov.* = Prunus dasycarpa. *Ehrh* = *Abricotier à fruit noir.* = *A. de Bruxelles.* Dum. Cours. = *A. du Pape.* = *A. violet.* G. B. de 1 à 1 f. 50 c.
d. Persicæfolia. *Duh. ed. nov.* = *Abricotier noir à feuilles de pêcher.* B. de 1 à 2 f.
— Brigantiaca *Pers.* = Prunus Brigantiaca *Vill.* = *Prunier de Briançon.* Duh. ed. nov. = *Abricotier de Briançon* G. B. de 50 c. à 1 f.
Artemisia abrotanum. *L.* = *Armoise aurone.* = *Citronelle* † C. de 25 à 75 c.
Arundo donax. *L.* = *Roseau des jardins* * B. 25 c.
b. Variegata — *à feuilles panachées* * B. de 50 à 75 c.
Asclepias fruticosa. *L.* = A. glabra. *Mill.* = *Asclépiade à feuilles de saule.* * † C. G. de 50 à 75 c.
Asparagus acutifolius. *L.* = A. corruda *Vill.* = *Asperge à feuilles aigues* * † C. G. de 50 à 75 c.
Aster carolinianus. *Willd.* = A. scandens. *Balbis* = A. serotinus. *Hort. Telon.* = *Aster de la caroline.* de 75 c. 1 f. 50 c.
Astragalus massiliensis. *Lam.* = A. tragacantha. = *Astragale barbe de Renard.* C. de 1 à 2 f.
Atragene alpina. = Clematis alpina. *Lam.* = *Atragené des Alpes.* §. de 1 à 2 f.
— Balearica. *Pers.* = Clematis balearica. *H. P.* = C. calycina. *Ait.* = *Atragené de Mahon.* §. de 1 à 2 f.
— Cirrhosa. *Pers.* = Clematis cyrrhosa. *L.* = *Clematite à vrilles.* §. de 2 à 3 f.
Atraphaxis spinosa *L.* = Polygonum frutescens. *Dum. Cours.* = *Atraphace épineuse* G. † ? C. de 1 à 2 f.
Atriplex halimus. *L. Arroche frutiqueuse.* = *Pourpier de mer.* G. » † de 5 à 20 f. 0/0
— Portulacoïdes. *L.* = *Arroche pourpière.* » † 50 c.
Aucuba japonica. *L.* = *Aucuba du Japon.* * † de 1 à 4 f.
Azalea glauca. *Willd.* = *Azalée. Glauque.* C. de 3 à 5 f.
— Nudiflora. *L. Azalée à fleurs nues.* C. de 2 à 4 f.
b. Carnea. = *Azalée à fleurs carnées.* C. de 5 à 4 fr.
c. Coccinea. — *à fleurs écarlates.* C. de 5 à 10 f.
— Pontica. *Schreb.* = A. arborea. = *Azalée à fleurs jaunes* = *A. du Pont.* C. de 3 à 6 f.

Azalea Viscosa. = *Azalée visqueuse.* C. de 2 à 5 f.
Baccharis halimifolia. *L.* = *Bacchante de virginie.* = *Seneçon en arbre.* B. * † G. de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Ivœfolia. *L.* = Conyza ivœfolia. *H. P.* = *Baccharis à feuilles d'iva.* G. * C. 50 c.
Berberis ilicifolia? *Willd.* = *Vinetier à feuilles de Houx.* G. C. 1 f.
— Sinensis. *Desf.* = *Vinetier de la Chine.* G. C. 1 f. 50 c.
— Vulgaris. *L.* = *Vinetier commun.* G. C. » de 10 à 75 c.
a. Rubra. — *à fruit rouge.*
b. Violacea. — *à fruit violet.* 1 f.
c. Asperma. = B. arbortiva. — *Sans pepins.* 1 f. 50 c.
d. Canadensis. *Desf.* = V. *Du Canada.* G. » C. 50 c.
Betula alba. *L.* = *Bouleau blanc.* G. A. de 50 c. à 2 f.
b. Pendula — *à rameaux pendants.* de 1 à 2 f.
c. Verrucosa — *verruqueux.* de 1 à 2 f.
— Lenta. *L.* = B. Carpinifolia. *Ehrh.* = B. Nigra. *du Roi* = *Bouleau merisier.* A. de 1 à 3 f.
— Nana *L.* = *Bouleau nain.* C. de 1 à 2 f.
— Pubescens. *Ehrh.* = B. Broecembergensis. G. A de 1 à 2 f.
Bignonia capræolata. *L.* = *Bignone orangée.* * §. de 1 à 2 f.
— Catalpa. *L.* = C. ternifolia. *Cav.* = C. communis. *Dum. cours.* = C. syringifolia. *Ait.* = *Le Catalpa.* G. A. de 1 à 2 f.
— Radicans. *L.* = Tecoma radicans. *Juss.* = *Jasmin de Virginie.* = *J. à fleurs en trompette.* §. de 50 à 1 f.
b. Minor. = *Bignone de virginie à fleurs rouges.* §. de 1 à 2 f.
Broussonetia papyrifera *L'Hérit.* = Morus papyrifera. *L.* = *Mûrier de la Chine* = *mûrier à papier.* (mâle et femelle.) G. A. de 1 à 3 f.
Brunnichia cyrrhosa. *Gœrt.* = *Brunnichia à vrilles* §. de 1 à 2 f.
Budleïa globosa *Lam. Budlèje globuleux.* * † de 1 à 3 f.
Bumelia tenax. *W.* = Sideroxylon tenax. *L.* = S. Chrysophylloïdes. *Mich.* = Chrysophyllum carolinense. *Jacq.* = *Argan doré.* = *Bois de fer.* G. * B. de 1 à 4 f.
— Lycioïdes. = Sideroxylon lycioïdes. *L.* = S. lœve. *Walt.* = *Argan à feuilles de saule* = *Bois laiteux du Mississipi.* G. * B. de 1 à 5 f.
Buphthalmum frutescens. *L.* = *Buphthalme de Virginie.* = *B. Arbrisseau.* † de 50 à 1 f.
Buplevrum fruticosum. *L. Buplèvre frutiqueuse.* = *B. d'Éthiopie.* G. * C. de 50 c. à 1 f.
b. Angustifolia. = var. *à feuilles étroites.*
— Spinosum. *L.* = *Buplèvre épineux.* * C. de 1 à 3 f.
Buxus balearica. *Lam.* = *Buis de Mahon.* * † B. de 75 c. à 2 f.
— Sempervirens *L.* = *Buis commun.* † B.
b. Arborescens. *Lam.* = *Buis en arbre.* †
— Variegata. = *Buis panaché.* † C. de 50 c. à 1 f. 50 c.
c. Angustifolia. *Mill.* = *Buis à feuilles de myrthe.* † de 1 à 2 f.
d. Suffruticosa. *Lam.* = *Buis nain.* = *B. d'Artois.* = *B. à bordures.* † C.
Callicarpa americana. *L.* = Spondylococcos. = Burchardia. *Duh.* = Johnsonia americana. *Mill.* = Anonymus baccifera. *Pluk.* = *Callicarpe d'Amérique.* G. * C. de 1 à 3 f.
Calycanthus ferax. *Mich.* C. fertilis. *Walt.* = C. lœvigatus. *Willd.* = *Calycanthe fertile.* = *C. à feuilles lisses.* * C. de 1 à 4 f.
— Floridus. *L.* = Basteria. *Mill.* = Buttneria. *Duh.* = Beureria. *Erhet.* = *Calycanthe de la Caroline.* = *Pompadour.* = *Arbre aux annemones.* B. de 1 à 3 f.
— Nanus. *Cels.* = C. oblongatus? *Ait. Calycanthe nain.* C. de 1 à 4 f.
— Precox. *L.* = *Calycanthe du Japon.* = *C. précoce.* * B. de 1 à 4 f.
Capparis spinosa. *L.* = *Caprier cultivé.* = *C. Commun.* G. * C. de 40 c. à 1 f.
Caragana. (*Vide* Robinia)
Carpinus betulus = *Charme commun* = *Charmille* G. » A » C. de 4 f. le 0/0 à 2 f. pièce.
b. Quercifolia. *H. P.* = *Charme à feuilles de chêne* A. de 1 à 3 f.
— Ostrya. *L.* = Ostrya vulgaris. *Willd.* = *Charme à fruits de houblon.* G. A. de 1 à 2 f.
— Virginiana. *Lam.* = Ostrya virginiana. *Willd.* = *Charme de Virginie.* A. de 1 à 3 f.
Cassia corymbosa. *L.* = C. falcata. *Hortul.* = *Casse de Buenos-Ayres.* † * G. de 50 c. à 1 f.
Ceanothus americanus. *L.* = *Céanothe d'Amérique.* de 1 à 2 f.
Celastrus pyracanthus. = Lycium Æthiopicum. *Comm.* C. * † 1 à 3 f.

4

Celastrus Scandens. *L.* == C. punctatus ? *Thumb.* == *Célastre grimpant.* == *Bourreau des Arbres* G. §. de 1 à 2 f.
Celtis australis. == *Micocoulier de Provence.* == *Alisier.* vulg. == *Falabreguier.* Prov. G. A. de 1 à 2 f.
— Cordata. *H. P.* == C. crassifolia. *Lam.* == *Micocoulier à feuilles en cœur* G. A. de 2 à 3 f.
— Occidentalis. *L.* == *Micocoulier de Virginie.* == *M. d'Amérique.* G. A. de 1 à 2 f. 50 c.
— Orientalis. *Mill.* == C. tournefortii. *Lam.* == C. lutea. *Pers. Micocoulier du levant.* * B. de 2 à 3 f.
— Sinensis. *Pers.* == *Micocoulier de la Chine.* * B. de 3 à 5 f.
Cephalanthus occidentalis. *L.* == *Céphalanthe d'Amérique.* == *Bois bouton.* C. de 1 à 3 f.
Cerasus avium. *Mœnch.* == C. nigra. *Mill.* == C. Sylvestris *J. Bauh.* == Prunus c. avium. *L. Cerisier-merisier.* (*vide* page. 4.) A.
b. Flore pleno. == *Merisier à fleurs doubles.* de 75 c. à 1 f. 50 c.
c. Bigarella. *H. P.* == C. duracina. *D C.* == *Bigarreautier.* A. de 40 c. à 1 f. 25 c.
d. Juliana *D C.* == *Guigner.* A. de 40 c. à 1 f. 25 c.
— Caproniana. *D C.* == C. vulgaris. *Mill.* Prunus. *Cerasus. L.* == *Cerisier commun.* == *C. vulgaire.* (*vide* pag. 4.) A.
b. Flore pleno. == *Cerisier à fleurs doubles.* A. de 75 c. à 1 f. 50 c.
c. Suavissima. *H. P.* == *Cerisier Royal.* == *Cherry-Duke. Duh.* A. de 40 c. à 1 f. 25 c.
d. Ruberrima. *H.P. Cerisier de Montmorency.* de 40 c. à 1 f. 25 c.
e. Polygyna. *N.* == C. racemosa hortensis. *Bauh.* == C. plura ferens. *J. Bauh.* == *cerisier à bouquet.* A. de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Bracteata. *Lois. Ined.* == Padus bracteata. == *Cérisier à bractées.* G B de 1 à 2 f.
— Chamæcerasus. *Duh. ed. nov.* == C. pumila. *Bauh.* == Prunus chamæcerasus. *Jacq.* == *Cerisier à feuilles luisantes.* == *C. nain de Sybérie.* G C de 1 à 2 f.
— Laurocerasus. *Duh. ed. nov.* == Prunus laurocerasus. *L.* == Padus laurocerasus. *Mill.* == *Cerisier laurier-cerise.* == *L. amandier.* G † B de 75 c. à 2 f.
b. foliis argenteo maculatis. == *Laurier cerise panaché.* de 2 à 3 f.
— Lusitanica. *Duh. ed. nov.* == Prunus lusitanica. *L.* == Padus lusitanica. *Mill.* == *Laurier du Portugal.* == Azazero *des Portugais.* » † B 2 à 4 f.
— Mahaleb. *Mill.* == Prunus odorata. *Lam.* == P. Mahaleb. *L.* == *Cerisier de Ste. Lucie.* == *Bois de Ste. Lucie.* G » A 50 c. à 2 f.
b. fructu luteo. == *Mahaleb à fruits jaunes.* 1 à 2 f.
— Nicotianœfolia. *Pall.* == C. Decumana. *De Launay.* == *Cerisier de quatre à la livre.* == *Guiguer à feuil. de tabac.* B 1 f. 50 à 3 f.
— Padus. *D. C.* == Prunus padus. *L.* == P. racemosa. *Lam.* == P. rubra. == Padus avium. *Mill.* == P. theophrasti. *Dalech.* == *Cerisier à grappes.* == *Merisier à grappes.* == *Laurier-putiet.* == *Faux bois de Ste. Lucie.* G B 50 c. à 1 f. 25 c.
— *b.* rubra. == *Cerisier à grappes rouges.* 25 c. à 2 f.
c. Variegata. — *à feuilles panachées.* G B 1 à 3 f.
— Persicœfolia. *Duh. ed. nov.* == Prunus persicœfolia. *H. P.* == *Cerisier à feuilles de pêcher.* A 2 à 3 f.
— Pumila. *Mich.* == Cerasus Canadensis. *Mill.* == Prunus pumila. *L.* == *Cerisier nain.* == *Ragoumenier.* == Nega. == Minel *du Canada.* G C 50 c à 2 f.
— Semperflorens. *D C.* == C. racemosa. *Bauh.* == Prunus semperflorens. *Willd.* == P. Serotina. *Roth.* == *Cerisier toujours fleurissant.* == *C. de la Toussaint.* == *C. à la feuille.* == *C. de St.-Martin.* == *C. tardif.* B 1 à 2 f.
— Serotina. == Prunus serotina. *Willd.* == P. virginiana. *Mill.* == *Cerisier tardif.* B 2 à 3 f.
— Virginiana. *Mich.* == Prunus virginiana. *L.* == P. rubra. *Ait.* B 1 à 2 f.
Cercis Canadensis. *L.* == *Gainier du Canada.* == *Arbre de Judée à fleurs blanches.* A 2 à 3 f.
— Siliquastrum. *L.* == *Gainier commun.* == *Arbre de Judée.* G A 1 à 2. f.
b. Flore carnea. == *Arbre de Judée, à fleurs couleur de chair.* G A 1 f. 50 c. à 3 f.
Cestrum parqui. l'*Herit.* == C. Jamaïcence. *Lam.* == *Cestreau du Chili.* G † * C 1 à 2 f.
Chamœrops humilis. *L.* == Phœnis humilis. *Cav.* == *Chamœrops commun.* * † 2 à 5 f.

Cheiranthus scoparius. *Willd. Giroflée des Canaries.* G * † 50 c. à 1 f.
b. Cameleo. *D C.* == *Giroflée à fleurs changeantes.* G * † 50 c. à 1 f. 50
— Cheiri. == *Giroflée des Murailles.* == *Violier jaune.* == *Muret.*
Var. { *à fleurs doubles orangées et ponceau.* 25 c. à 2 f.
idem. *jaunes.* == *Baguette d'or.* 1 à 2 f. }
Chionanthus Virginica. == *Chionanthe de Virginie.* == *Arbre de Neige.* B 2 à 3 f.
Cissus ampelopsis. *Pers.* == Ampelopsis cordata. *Mich.* == *Achit à feuilles en cœur.* § 75 c. à 2 f.
— Hederacea. *Willd.* == Ampelopsis. *Mich.* == Hedera quinquefolia. *L.* == Vitis hederacea. == *Vigne vierge.* == *Achit grimpant.* G § 25 c 1 f.
— Orientalis. *Lam.* == *Achit d'Orient.* G* § de 50 c. à 1 f.
Cistus albidus. *L.* == *Ciste blanchâtre.* == Badaffre. *Prov.* † * C G de 75 c. à 1 f.
— Crispus. *L.* == *Ciste crépu.* † * C de 75 c. à 1 f.
— Ladaniferus. *L.* == *Ciste ladanifère* † * C de 2 à 3 f.
— Laurifoliis. *L.* == *Ciste à feuilles de laurier.* † * C de 1 à 2 f.
— Ledon *Lam.* == *Ciste ledon.* † * C de 1 à 2 f.
— Monspeliensis. *L.* == *Ciste de Montpellier.* † * C G 50 c. à 1 f.
— Purpureus. *L.* == C. creticus. *Ait.* == *Ciste pourpre.* †. *. C. de 2 à 3 f.
— Salviæfolius. *L.* == *Ciste à feuilles de sauge* †. *. C. de 1 à 2 f.
Clematis flammula. *L.* == *Clématite odorante.* G. *. §. de 50 c. à f.
— Maritima *L.* == *Clématite maritime.* *. §. de 50 c. à 1 f.
— Orientalis. *L.* == *Clématite orientale.* §. de 75 c. à 1 f.
— Viorna. *L.* == *Clématite viorne.* §. de 1 à 3 f.
— Virginiana. *L.* == *Clématite de Virginie.* § de 50 c. à 1 f.
— Vitalba. *L.* == *Clématite des haies.* == *Herbe aux gueux.* Vulg. §. 25 c.
b. Sylvestris. == *Clém. des haies à feuill. entières.* §. 50 à 75 c.
— Viticella. *L.* == *Clém. à fleurs bleues.* G. §. de 75 c. à 1 f. 50 c.
b. Flore pleno. == *Clém. à fleurs doubles bleues.* §. 2 f.
v. Pulchella. == *Clém. à fleurs rouges.* § de 1 50 c. à 2 f.
d. Flore pleno. == *Clém. à fleurs rouges doubles.* §. de 2 à 4 f.
Clethra alnifolia. *L.* == *Cléthra glabre.* C. de 75 c. à 3 f.
— Incana. *Pers.* == C. tomentosa. *Lam.* == C. pubescens. *Ait.* == C. alnifolia. *Willd.* == *Cléthra blanchâtre* C. de 2 à 3 f.
Cneorum tricoccoon. *L.* == *Camelée à 3 coques.* G. *. C. 50 c. à 1 50 c.
Colutea arborescens. *L.* == Baguenaudier commun. G. B. 50 c. à 1 f.
b. Hybrida. == C. intermedia. *H. P.* == *Bag. hybride.* G. B. de 1 à 2 f.
— Cruenta. *L.* == C. orientalis. *Lam.* == C. sanguinea. *Pall.* == C. humilis. *Scop.* == *Baguenaudier du levant.* C. 50 c. à 1 f.
— Halepica. *Lam.* == C. istria. *Mill.* == C. pocokii. *Ait.* == *Bag. d'Alep.* G. B. de 50 c. à 1 f.
Comptonia asplenifolia. *L'Hérit.* == Liquidambar asplenifolium. *L.* == *Comptone à feuilles de cétérach.* C. de 2 à 4 f.
Conyza sordida. *L.* == Baccharis sordida. *H. P.* == *Conysé à fleurs ternées.* C. 50 c.
Coriaria myrtifolia. *L.* == *Fustet des corroyeurs.* == *Redoul à feuilles de mirthe.* ». G. * C. de 25 c. à 1 f.
Coris monspeliensis. *L.* == *Coride de Montpellier.* *. †. C. 50 c.
Cornus alba. *L.* == C. tartarica. *Mill.* == *Cornouiller à fruit blanc.* B. de 50 c. à 1 f.
— Alternifolia. *L.* == *Cornouiller à feuilles alternes.* B. 2 f.
— Circinalis. *L'Hérit.* == C. rugosa. *Lam.* == C. virginiana. *H. P.* == C. tomentosa. *Mich.* == *Cornoullier ridé.* B. 2. f. 50 c.
— Cœrulea. *Lam.* == C. ferruginea. *H. P.* == C sericea. *Ait.* == C. Lanuginosa. *Mich.* == C. rubiginosa. *Eh.* == C. amomum. *Mill.* == *Cornouiller soyeux.* == *C. à fruit bleu.* G. B. de 25 c. à 1 f.
— Florida. *L.* == *Cornouiller de la floride.* == *C. à fleurs.* B. de 2 à 4 f.
— Mascula. *L.* == C. arborea. == *Cornouiller Mâle.* G. B.
b flava. == *C. m. à fruit jaune.* G. B. 2 f.
— Paniculata. *L'Hérit.* == C. racemosa. *Lam.* == C. citrifolia *H. P.* == C. albida. *Villd.* == *Cornouiller à grappes* B. 2 f. 25 c.
— Sanguinea. *L.* == *Cornouiller sanguin.* == *Bois-punais.* == *Puine.* ». B. 25 c.
b Variegata. == *Cornouiller panaché.* de 1 à 2 f.
— Stricta. *L'Hérit.* == C. canadensis ? *H. P.* == *Cornouiller élancé.* G. B. de 1 à 2 f.
Coronilla coronata. *L.* == C. montana. *Scop.* == *Coronille couronnée.*

Coronilla emerus. *L.* == Securidaca. *Hortul.* == *Coronille des jardins.* de 25 à 75 c.
— **Glauca.** *L.* == *Coronille glauque.* == Trifolium. *Vulg.* †. » C. G. de 25 c. à 1 f.
— **Juncea.** *L.* == *Coronille effilée.* *. †. G. C. de 75 c. à 1 f. 25 c.
— **Valentina.** *L.* == C. stipularis. *Lam.* == *Coronille stipulaire.* C. *. †. G. de 1 à 2 f.
Corylus avellana. *L.* == *Noisetier.* ». B. (*Vide pag.* 5.)
a. Silvestris. == *Noisetier des bois.* ». B. 1 f. 50 c. la douz.
b. Ovata. == *N. à fruits allongés.* B.
c. Maxima. == C. grandis. == *Noisetier à gros fruits.* ». B. 5 f. la douz.
d. Alba. == *Noisetier blanc de Piémont.* B. 3 f. la douz.
— **Colurna.** *L.* == C. bizantina. *Seb.* == *Noisetier de Constantinople.* A. de 1 f. 50 c. à 2 f. la pièce.
— **Rostrata** *Ait.* == *Noisetier cornu.* B. 2 f. la pièce.
— **Tubulosa.** *Willd.* == C. maxima. *Mill.* == *Noisetier tubulé.* G. B. 75 c.
b. Rubra. == *Noisetier à fruit rouge.* == *Noix de St. Gratien.* B. de 1 à 1 f. 50 c.
Cratœgus amelanchier. *Desf.* == C: rotundifolia. *Lam.* == Mesp. Amelanchier. *L.* == Pyrus rotundifolia. *Willd.* == Aronia rotundifolia. *Pers.* == *Amelanchier.* G. C. de 50 à 75 c.
— **Arbutifolia.** *Lam.* == Mesp. arbutifolia. *L.* == Pyrus arb. *Willd.* == Aronia arbutifolia. *Pers.* == *Amelanchier à feuille d'arbousier.* G. B. de 75 c. à 1 f.
— **Aria.** *L.* == Pyrus aria. *Willd.* == Sorbus aria. *Crantz.* == *Alouchier de Bourgogne.* == *Drouiller.* == *Allier.* == *Alisier.* A. de 50 c. à 1 f.
b. Longifolia. == *Alisier à longues feuilles.* de 1 à 2 f.
— **Chamœ-mespibus.** *Duh. ed. nov.* == C. humilis. *Lam.* == Aronia chamœ-mespilus. *Pers.* == Sorbus fruticosa. *Crantz.* == Mesp. chamœ-mespilus. *L.* == *Alisier nain.* == *Faux neflier.* == *Alisier du mont d'or.* C. de 1 à 2 f.
— **Latifolia.** *Lam.* == Cratœgus dentata. *Thuill.* == Pyrus latif. *Willd.* == Sorbus latif. *Pers.* == *Alisier de Fontainebleau.* G. A. de 1 à 2 f.
b. Suecica. *Ait.* == C. intermedia. *Willd.* == Pyrus intermedia. *Ehrh.* == Sorbus intermedia *Pers.* == *Alisier de Suède.* A. de 1 50 à 2 f.
— **Pyrifolia.** *Lam.* == Pyrus arbutifolia. *a. Willd.* == Aronia pyrifolia. *Pers.* = *Amelanchier à feuilles de poirier.* C. 1 à 2 f.
— **Racemosa.** *Lam.* == Aronia racemosa. *Pers.* == *Amelanchier de Choissy.* B.
b. Botryapium. == Pyrus botry. *Villd.* == Mespilus canadensis. *L.* == *Amelanchier du Canada.* B. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— **Torminalis.** *L.* == Pyrus torminalis. *Willd.* == Sorbus torminalis. *Crantz.* == *Alisier des bois.* A. de 75 c. à 2 f.
Cupressus disticha. *L.* == *Cyprès de la Louisiane.* == *C. chauve.* == *C. à feuilles d'acacia.* G. A. de 2 à 6 f.
— **Fastigiata.** *Mill.* == Sempervirens. *Willd.* == *Cyprès pyramidal.* ». G. †. A. *. de 25 à 60 f. le °/₀
— **Horizontalis.** *Mill.* == C. expansa. == *Cyprès étalé.* == *C. horizontal.* == Cèdre de Montpellier. *. G. †. A. de 50 c. à 2 f.
— **Thuyoïdes.** *L* == *Cyprès à feuilles de thuya.* == *Cèdre blanc.* *Thuya-cyprès.* †. *. C. de 1 à 2 f.
Cydonia communis. == C. vulgaris. *Willd.* == Pyrus cydonia. *L.* == Sorbus cydonia. *Crantz.* = *Cognassier commun.* (*Vid. pag.* 4.)
b. Lusitanica. == *Cognassier du Portugal.* B. de 40 à 75 c.
— **Lagenaria.** *Duh. ed. nov.* == C. Japonica. *Pers.* == Pyrus japonica. *Thumb.* == Malus japonica. *Dum. Cours.* == *Cognassier à fruit en gourde.* *. C. de 3 à 6 f.
— **Sinensis.** *Thouin.* == *Cognassier de la Chine.* B. de 1 f. 50 à 3 f.
Cynanchum erectum. *L.* == *Cynanque droite.* C. de 50 c. à 1 f.
Cytisus argenteus. *L.* == *Cytise argenté.* *. C. de 50 c. à 1 f.
— **Austriacus.** *Jacq.* == *C. d'Autriche.* C. de 1 à 2 f.
— **Biflorus** ? == C. glabes. *L. F.* == C. Sibiricus ? *F. B.* C. 2 f.
— **Candicans.** *Lam.* == C. monspessulanus. *Tournef.* == Genista candicans. *L.* == *Cytise blanchâtre.* == *C. de Montpellier.* G. *. C. †. de 50 c. à 1 f.
— **Capitatus.** *Jacq.* == C. supinus ? *L.* == C. hirsutus. *Crantz.* == *Cytise à fleurs en tête.* G. C. de 1 à 2 f.
— **Complicatus.** *D C* == C. parvifolius. *Lam.* == C. divaricatus. *L'Hérit.* == Spartium complicatum. *L.* == *Cytise à feuilles pliées* *. C. de 1 à 2 f.

Cytisus Telonensis. *Lois.* == *Cytise de Toulon.* *. C. de 1 à 2 f.
— **Laburnum.** *L.* == Spartium laburnum. *Cav.* == *Cytise des Alpes.* *C. à grappes.* == *Faux ébenier.* == *Aubours.* G. A. 50 c. à 2 f.
b. Latifolia. *Pers.* == *Cytise à larges feuilles.* == *C. à fleurs odorantes.* G. A. de 2 à 3 f.
c. Flore albo. = *Cytise des Alpes à fleurs blanches.* de 3 à 4 f.
— **Nigricans.** *L.* = *Cytise noirâtre.* = *C. à épis.* C. de 1 f. 50 à 2 f.
— **Purpureus.** *Jacq.* = *Cytise pourpré.* C. de 2 à 3 f.
— **Sessilifolius.** *L.* == Spartium sessilifolium: *Cav.* == *Cytise à feuilles sessiles.* == Trifolium. *des jardiniers.* G. C. de 50 à 75 c.
— **Spinosus.** *Lam.* == spartium spinosum. *L.* == *Cytise épineux.* C. de 75 c. à 1 f.
— **Triflorus.** *l'Herit.* == C. villosus. *Pourr.* == C. tertius. *Clus.* == *Cytise à fleurs ternées.* * † C. de 1 à 2 f.
Daphne collina. *Smith.* == D. sericea. *Vahl.* == D. oleæfolia. *Lam.* == D. buxifolia ? == D. villosa. *Hortul.* == *Lauréole des collines* * † C. de 3 à 4 f.
— **Gnidium.** *L.* == Lauréole paniculée. == *Garou* == *Saint-bois.* G. * † C. de 75 c. à 2 f.
— **Laureola.** == *Lauréole commune.* == *L. toujours verte.* G. C. †
— **Mezereum.** *L.* == *Lauréole gentille* == *Mézéréon.* == *Bois-gentil.* C. de 50 c. à 1 f.
b. Album. == *Mézéréon à fleurs blanches.* C. de 2 à 3 f.
Decumaria barbara. *L.* == D. sarmentosa. *Bosc.* == D. forsythia. *Mich.* == forsythia scandens. *Walt.* == *Decumaria de Caroline.* * C. de 1 à 3 f.
Diervilla humilis. *Pers.* == D. lutea. *H. P.* == D. tournefortii. == D. acadiensis. *Dum. Cours.* == Lonicera diervilla. *L.* == *Dierville d'Acadie.* C. de 50 c. à 1 f. 50 c.
Dillenia scandens. *Willd* == D. humilis. *Donn.* == D. turneræflora. *Grawler.* == D. volubilis. *Vent.* == hibbertia volubilis. *Andrews.* == *Dillénia sarmenteux.* * † C. de 1 à 3 f.
Diospyros calycina. *N.* == *Plaquemenier à grandes fleurs.* de 10 à 20 f.
— **Lucida.** *N.* == D. kaki. *Hort. Telon.* == *Plaquemenier glabre.* A. de 5 à 10 f.
b. Augustifolia: *N.* == *Plaquemenier à feuilles étroites.* A. de 6 à 15 f.
— **Intermedia** *N. Plaquemenier hybride.* A. de 6 à 10 f.
— **Kaki.** *L. F.* == *Plaquemenier figue caque.* * de 3 à 8 fr
— **Lotus.** *L.* == Guaiacana. *Tournef.* == *Plaquemenier d'Europe.* G. A. de 50 c. à 2 f.
— **Virginiana** *L.* == *Plaquemenier d'Amérique.* G. A. de 50 c. à 3 f.
Dirca palustris. *L.* == *Dirca des marais.* == *Bois de plomb.* == *B. de cuir* C. de 2 à 3 f.
Dorycnium monspeliense. *Willd.* == D. suffruticosum. *Vill.* == D. parviflorum. *Savi.* == Lotus dorycnium. *L.* == *Aspalathus dory.* Lam. *Dorynic fructescent.* == *Lotier digité.* * C. 50 à 75 c.
Elœagnus angustifolia. *L.* == Ch lef. == *Olivier de Bohême.* == *Saule odorant.* == *S. de Paradis.* A. de 75 c. à 2 f.
— **Orientalis.** *L.* == *Chalef d'Orient.* A. de 1 à 3 f.
Empetrum nigrum. *L.* == *Camarine à fruit noir.* C. 2 f.
Ephedra distachya. *L.* == *Ephedra à deux épis.* §. de 75 c à 2 f.
— **Altissima.** *Desf.* == *Ephedra élevé.* * §. de 2 à 4 f.
Erica arborea. *L.* = E. procera. *Salisb.* == *Bruyère en arbre.* * † B. de 1 à 3 f.
— **Ciliaris.** *L.* == *Bruyère ciliée.* * † C. 2 f.
— **Cinerea.** *L.* == E. mutabilis. *Salisb.* == *Bruy. cendrée* * † C. 2 f.
— **Herbacea.** *L.* == E. saxatilis. *Salib.* == E. carnea. *Curt.* == *Bruyère précoce.* de 1 à 2 f.
— **Mediterranea.** *L.* == E. lugubris. *Salib.* == *Bruyère lugubre.* * † C. 2 f.
— **Multicaulis** *Salib.* == E. stricta. *Willd.* == E. viridi purpurea. *Hortul.* == *Bruyère à tiges nombreuses.* * † C. 2 f.
— **Multiflora.** *L.* == *Bruyère multiflore.* * † C. 2 f.
— **Scoparia.** *L.* == E. fucata. *Thumb.* == *Bruyère à balais* * † C. de 50 c. à 1 f.
— **Tetralix.** *L.* == E. botuliformis. *Salib.* == *Bruyère quaternée.* * † C.
b. Rosea. *Var.* { *à fleurs roses.* 2 f.
c. Alba. { *à fleurs blanches.* 2 f.
— **Vagans.** *L.* == E. vaga. *Salib.* == E. purpurascens. *Willd.* == *Bruyère pourprée.* == *B. étalée.* * † C. 2 f.
— **Vulgaris.** *L.* == E. Europœa. == Calluna. == *Bruyère commune.* † C. de 50 c. à 1 f.

Euphorbia characias. *L.* == *Euphorbe à fleurs pourpres.* == *Titymale.* == Chuscle. *Prov.* * † C. 50 c.
— Dendroides. *L.* == *Euphorbe arborescente.* * C. de 1 à 2 f.
Evonymus atropurpureus. *Jacq.* == E. carolinensis. *Marsch.* == *Fusain à fleurs pourpres.* B. de 2 à 3 f.
— Latifolius. *Mill.* == *Fusain à larges feuilles.* == *F. d'Autriche.* G. B. de 1 à 2 f.
— Verrucosus. *Scop.* == *Fusain galeux.* == *F. vérruqueux.* B. de 1 à 3 f.
— Vulgaris. *Pers.* == E. europoeus. *L.* == *Fusain commun.* == *Bonnet de Prêtre.* G. B. de 25 c. à 1 f.
b. Fructus albo. == *Fusain à fruit blanc.* de 1 à 2 f.
Fagus castanea. *L.* == Castanea vulgaris. == C. vesca. *Gært.* == *Chataigner commun.* A. (vide pag. 4)
— Pumila. *L.* == Castanea pumila. *Lam.* == C. americana. *Bosc.* == *Chataignier nain d'Amérique.* == *Chincapin.* C. 5 à 8 f.
— Sylvatica. *L.* == *Hêtre commun* A. de 75 c. à 2 f.
b. Variegata. == *Hêtre panaché.* de 3 à 6 f.
c. Purpurea. *H. P.* == F. sanguinea. *Du Roi.* == *Hêtre pourpre.* de 3 à 6 f.
d. OEnea. *Dum. Cours.* == *Hêtre cuivré.* de 5 à 8 f.
e. Cristata. == *Hêtre crête de coq.* de 5 à 8 f.
f. Asplenifolia. *Hort.* == *Hêtre à feuilles de cétérach* de 6 à 8 f.
Ficus carica. *L.* == *Figuier cultivé.* A.* (vide pag. 4) de 50c. à 1 f. 25 c.
b. Silvestris. == *Caprifiguier.*
Fontanesia phillyroeoides *La Bill.* == *Fontainèse à feuilles de filaria.* † B. de 50 à 1 f. 50 c.
Fothergilla alnifolia. *L.* == F. gardeni. *Jacq.* == *Fothergile à feuilles d'aune.* C. de 2 à 3 f.
Fraxinus acuminata. *Lam.* == F. americana. *Willd.* == *Frêne acuminé.* == *Frêne blanc.* == *F. de la nouvelle Angleterre.* A. de 1 à 2 f.
— Atrovirens. *Hort.* == F. atra. == F. crispa. *Willd.* == *Frêne crépu.* B. de 1 à 2 f.
— Aurea *Willd.* == *Frêne doré.* B. de 1 à 2 f.
— Caroliniana. *Lam.* == *Frêne de la caroline* A. de 1 à 2 f.
— Elliptica. *Bosc.* == *F. elliptique.* A. de 1 à 2 f.
— Excelsior. *L.* == *Frêne commun.* A. de 40 c. à 1 f. 50 c.
b. Argentea. == *Frêne argenté.* B. de 1 à 3 f.
c. Jaspidea. == *Frêne jaspé.* A. de 1 à 2 f.
d. Nigricans. == *Frêne noirâtre.* == *F. pyramidal.* A. de 1 à 2 f.
e. Oxyphylla? *Marsch.* == *Frêne de Provence.* G. A. de 1 à 2 f.
f. Pendula. == *Frêne parassol.* B. de 1 à 3 f.
g. Simplicifolia. *Willd.* == F. heterophylla. *Vahl.* == F. diversifolia. *Ait.* == F. monophylla. *Hortul.* == *Frêne à feuilles simples* A. de 1 à 2 f.
h. Striata. *Descemet.* == *Frêne strié.* A. de 1 à 2 f.
i. Verrucosa. == *Frêne graveleux.* == *F. verruqueux.* A. de 1 à 2 f.
— Juglandifolia. *Lam.* == *Frêne à feuilles de noyer.* A. de 1 à 3 f.
— Lentiscifolia. *Desf.* == F. tamariscifolia? *Vahl.* == F. halepensis. *Herm.* == *Frêne à feuilles de lentisque.* A. de 1 à 2 f.
— Ornus. *L.* == F. florifera. *Scop.* == F. paniculata. *Mill.* == Ornus europoea. *Pers.* == *Frêne à fleurs.* == *F. polypétalé.* A. de 1 à 2 f.
— Parvifolia. *Lam.* == *F. à petites feuilles.* == *F. à mèche.* A. 1 à 2 f.
— Platicarpa. *Mich.* == *Frêne à larges fruits.* A. de 1 à 2 f.
— Polemoniifolia. *Duh. ed. nov.* == F. nana. *H. P.* == F. apendiculata. *Pers.* == *Frêne nain.* C. de 1 à 3 f.
— Pubescens. *Lam.* == F. epiptera. *Mich.* == F. villosa. *Hort* == F. nigra. *Du Roi.* == *Frêne pubescent.* G. A. de 1 à 2 f.
b. longifolia. == *Frêne pub. à longues feuilles.* de 1 à 2 f.
c. Latifolia. == *Frêne pub. à larges feuilles.* de 1 à 2 f.
— Rotundifolia. == *Frêne de Calabre.* == *F. à manne.* A. de 1 à 2 f.
— Sambucifolia. *Lam.* *Frêne à feuilles de sureau.* A. de 1 à 2 f.
— Tetragona. *Mich.* == *Frêne bleu.* == *F. tetragone.* A. de 3 à 6 f.
Gaultheria procumbens. *L.* == *Gaulthéria du Canada.* † C. de 2 à 3 f.
Genista anglica. *L.* == *Genêt anglican.* † C. de 50 à 75 c.
— Hispanica. *L.* *Genêt corrudolle.* † C. de 50 à 75 c.
— Juncea. *Lam.* == spartium. *L.* == *G. d'Espagne.* G. † B. de 25 c. à 1 f.
b. Flore pleno. *Genêt d'Esp. à fleurs doub.* 1 à 2 f. 50 c.
— Monosperma. *Lam.* == *Genêt monosperme.* * C. de 1 à 3 f.
— Pilosa. *L.* == *Genêt à feuilles de renouée.* C. de 50 c. à 1 f. 25 c.
— Scoparia. *L.* == spartium scoparium. *L.* == *Genêt commun* == *Genêt à balais.* B. G. de 25 c. à 1 f. 25 c.

Genista Scorpius. *D C.* == spartium. *L.* == Genista spiniflora. *Duh. ed. nov.* == *Genêt spiniflore.* † C. * de 50 c. à 1 f.
— Tinctoria. *L.* == *Genêt des Teinturiers.* == *Herbe à jaunir.* C. † G. de 50 c. à 1 f.
b. Sibirica. *L.* == *Genêt de Sibérie.* C † G. de 50 c. à 1 f.
— Sphoerocarpa. *Lam.* == Spartium. *L.* == *Genêt sphærocarpe.* C. de 2 à 3 f.
Ginkgo biloba. *L.* == Salisburia adianthifolia. *Willd.* == *Gingo à deux lobes.* == *noyer du Japon.* == *arbre aux quarante écus.* A. de 3 à 10 f.
Gleditsia macrocanthos. *Desf.* == *Février à grosses épines.* A. G. de 2 à 3 f.
— Monosperma. *Mich.* == G. aquatica. *Marsch.* == G. carolinensis. *Lam.* == *Févier monosperme.* A. de 2 à 3 f.
— Sinensis. *Lam.* == *Févier de la Chine.* A. G. de 1 à 2 f.
b. Horrida A. G. de 2 à 3 f.
— Triacanthos. *L.* == G. spinosa. *Duh.* == G. meliloba. *Walt.* == *Févier épineux.* == *F. d'Amérique.* == *Acacia de la Passion.* vulg. A. G. de 1 à 2 f. 25 c.
b. Latisiliqua. == *Févier d'Amérique à larges siliques.* A. G. de 2 à 3 f.
c. Siliqua flava. == *Id. à siliques jaunes.* A. G. de 3 à 4 f.
Globularia alypum. *L.* == G. fruticosa. *Garid.* == hippoglossum valentinum. *Clus.* == empetrum phocoïdes. *Dalech.* == *Globulaire turbith.* † * C. de 1 à 2 f.
Glycine frutescens *L.* == *Glycine frutescente.* == *haricot en arbre.* de 5 f. 50 c. à 2 f.
Gnaphalium stoechas *L.* == Elychrysum stoechas. == *Gnaphale citrine.* † C. * de 25 c. à 1 f.
Grewia occidentalis. *L.* == *Greuvier occidental.* * C. de 1 à 2 f.
Gymnocladus canadensis. *Lam.* == hyperanthera dioïca. *Vahl.* == Guillandina dioïca. *L.* == *bonduc.* == *Chiquier.* == *chicot. du Canada.* A. de 1 à 3 f.
Halesia tetraptera. == *Halesie à quatre ailes.* C. de 2 à 3 f.
Hamamelis virginica. == Pistacia virginiana. *Pluk.* == *Hamamelis de virginie.* C. de 3 à 5 f.
Helianthemum mutabile. *Jacq.* == *Helianthême à fleurs changeantes.* C. † de 50 c. à 1 f.
Hedera helix. *L.* == *Lierre rampant.* G. §. † 20 c.
b. Variegata. == *Lierre panaché.* §. † de 1 à 2 f.
Hibiscus mutabilis. *L.* == H. sinensis. *Mill.* == *Ketmie rose de de Cayenne.* vulg. C. * de 3 à 6 f.
— Syriacus *L.* *Ketmie des jardins.* == Althea. B. G. de 25 à 75 c.
a. Simplex *à fleurs simples variées en couleurs* le °/₀ de 5 à 25 f.

b. Multiplex	*à fleurs doubles rouges.* *à fleurs doubles blanches.* *à fleurs doubles violettes.* *à fleurs doubles couleur de chair.*	75 à 1 f.
c. Variegata	*à feuilles panachées.* C.	

Hippophae rhamnoïdes. *L.* == Argousier rhamnoïde. == *Griset.* == *Saule épineux.* B. G. de 50 c. à 2 f.
Hortensia opuloides. *Lam.* == H. rosea. *Desf.* == H. japonica. *Comm.* == Hydrangea hortensia. *Hort. Lond.* == Hyd. hortensis. *Willd.* == Viburnum serratum. *Thumb.* == Primula mutabilis. *Loureiro.* == *Hortensia.* == *rose du Japon.* C. * de 75 c. à 4 f.
Hydrangea arborescens. *L.* == H. vulgaris. *Mich.* == *Hydrangée de virginie.* C. de 1 à 2 f
— Nivea. *Mich.* == H. radiata. *Walt.* == H. glauca? == *Hydrangée blanche.* C. de 2 à 3 f.
— Quercifolia. *Batram.* == H. radiata. *Smith.* == *Hydrangée à feuilles de chêne.* C. de 3 à 6 f.
Hypericum androsoemum. *L.* == *Millep. toute-saine.* C. G. de 50 c. à 1 f.
— Balearicum. == *Millepertuis de Mahon.* C. † * G. de 1 à 2 f.
— Calycinum. == *Millepertuis à grandes fleurs.* * C. d † de 1 à 2 f.
— Elatum? *F. B.* == *Millepertuis élevé.* C. de 1 à 2 f.
— Hircinum. *L.* == *Millepertuis fœtide.* C. G. de 50 c. à 1 f.
— Prolificum. *L.* == *Millepertuis prolifère.* C. de 1 à 2 f.
Iberis semperflorens. *L.* == *Ibéride de Perse.* == *Taraspi.* == *Tlaspi.* C. * † de 25 c. à 1 f.
— Sempervirens. *L.* == *Ibéride toujours verte.* C. * † de 50 c. à 1 f.

Ilex

Ilex aquifolium. *L.* = *Houx commun.* B. G. † de 25 c. à 2 f.
b. Fol. aureis. = *Houx panaché de jaune.* B. † de 2 à 4 f.
c. Fol. argenteo maculatis. = *H. panaché de blanc.* B. † de 2 à 4 f.
d. Balearica. = I. heterophylla. = *Houx de Madère.* B. † de 2 à 4 f.
e. Echinata. = I. ferox. = *Houx hérisson.* B. † de 2 à 4 f.
— Variegata. = *Houx hérisson panaché.* B. † de 3 à 5 f.
f. Serrata. *Thumb.* = *Houx à dents de scie.* B. † de 3 à 6 f.
— Cassine *L.* = I. Caroliniana. *Mill.* = I. Dahoon. *Walt.* = *Houx. à feuilles de laurier.* B. de 3 à 5 f.
— Prinoïdes. *Ait.* = I. deciduа. *Walt.* = *Houx d'été.* = *H. à feuilles caduques.* B. de 2 à 4 f.
— Vomitoria. *Ait.* = I. ligustrina. *Jacq.* = I. floridana. *Lam.* = Cassine peragua. *Mill.* = *Houx Emétique.* = *Thé du Paraguay.* = *Cassine toujours verte* = yapon *de virginie.* = *L'apalachine.* † B. * de 3 à 6 f.
Itea virginica. *Mich.* = *Itéa de Virginie*: C. de 1 à 3 f.
Iva frutescens. *L.* = *Kinkina du Mexique.* C. * de 1 à 2 f.
Jasminum fruticans. *L.* = *Jasmin d'Italie.* C † * de 25 à 75 f.
— Humile. *L.* = *Jasmin à feuilles de cytise.* C. * de 50 à 1 f.
— Officinale. *L.* = *Jasmin commun.* §. 52 c.
b. Variegata. = *Jasmin à feuilles panachées.* §. de 75 à 1 f.
Juglans alba. *Willd.* = J. tomentosa. *Mich.* = *Noyer blanc* = *Jkory.* A. de 3 à 6 f.
— Cinerea. *L.* = J. oblonga. *Mill.* = *Noyer cendré.* = *N. à fruit visqueux.* A. de 3 à 6 f.
— Fraxinifolia. *Lam.* = J. lœvigata. *Hortul.* = *Noyer à feuilles de Frêne.* B. * de 3 à 8 f.
— Mucronata. *Dum. Cours.* = J. squamosa. *Lam.* = J. Sulcata. *Willd.* = J. alba acuminata. *Marsch.* = *Noyer écailleux. N. mucroné.* A.
— Nigra. *L.* = *Noyer d'Amérique.* = *N. noir.* A. G. de 1 à 3 f.
b. Angustifolia. = *Noyer noir à feuilles étroites.* A. de 2 à 5 f.
— Olivœformis. *Mich.* = J. Cylindrica. *Lam.* = J. rubra. *Gært.* = J. pecan. *Mühlemb.* = J. angustifolia. *Ait.* = *Noyer pacanier.* A. G. de 2 à 5 f.
— Regia. *L.* = *Noyer commun.* (*vide* pag. 6) A. de 50 c. à 2 f.
b. Maxima. = J. cabalina. = J. macrocarpa. = *Noyer à gros fruit.* = *noix de jauge.* = *N. de gands.* A. G. 3 à 5 f.
c. Serotina. *H. P.* = *Noyer tardif.* = *N. des Miracles.* = *N. de la Saint Jean.* A. G. de 1 f. 25 c. à 2 f.
Juniperus communis. *L.* = *Genevier commun* † B. G. de 50 c. à 1 f. 25 c.
b. Suecica. = *G. de Suède.* † B. de 1 à 2 f.
c. Montana. = J. Prostrata. = G. de Montagne. † B. 2 à 3 f.
— Oxycedrus. *L.* = *Genevrier oxycèdre.* = *Cade.* Prov. † B. G. * de 75 c. à 1 f. 50 c.
b. Drupacea. = *G. ox. à gros fruits.* † B. * de 2 à 3 f.
— Phœnicea. *L.* = *G. de phœnicie.* = *Cedre phœnicien* † B. G. * de 1 à 2 f.
b. Lycia. = *Genevrier de lycie.* † B. G. * de 3 à 4 f.
— Sabina. *L.* = *Genevrier sabine.* † B. de 75 c. à 2 f.
b. Cupressina. = *G. Sab. à feuill. de cyprès.* † B de 2 à 3 f.
c. Tamariscifolia. = *Sabine à fleuill. de Tamaris.* † B. 1 à 2 f.
d. Repens. = *Sabine rampante.* † C. de 1 à 2 f.
e. Variegata. = *Sabine panachée.* † C. de 2 à 3 f.
— Thurifera. *L.* = I. hispanica. *Lam.* = *Genevrier d'Espagne.* = *Cèdre d'Espagne.* * B. † de 3 à 4 f.
— Virginiana. *L.* = J. Caroliana: *Mill.* = *Genevrier cèdre de Virginie.* A. † G. de 75 c. à 3 f.
Justicia coccinea. *Cav.* = J. quadrifida. *Vahl.* = J. superba. *H. Lond.* = *Carmentine écarlate.* * C. G. de 1 à 3 f.
b. Nana. de 2 à 3 f.
Kalmia angustifolia *L.* = *Kalmia à feuilles étroites.* † C. de 2 à 3 f.
— Glauca. *Ait.* = K. rosmarinifolia: *Dum. Cours.* = K. polifolia. *Wangh.* = *Kalmia glauque.* = *K. de Miquelon* † C. 2 à 4 f.
— Latifolia. *L.* = *Kalmia à larges feuilles* † C. de 4 à 15 f.
— Oleifolia. *Dum. Cours.* = Kalmia polifolia? *Hort. Angl.* = *Kalmie à feuilles d'olivier* C. † de 2 à 3 f.
Keria japonica, flore pleno. *D C.* = Corchorus japonicus. *L.* C. * de 1 à 3 f.
Kœlreutheria paniculata. *Lam.* = K. paulinoïdes. *l'Hérit.* = Sapindus paniculata. *Dum. Cours.* = S. sinensis. *L.* = Paulinia aurea. = *Savonnier paniculé.* B. G. * de 75 c. à 3 f.
Lagerstrœmia indica. *L.* = L. chinensis. *Lam.* * B. de 4 à 6 f.
Laurus benzoin. *L.* = L. pseudo-benzoin. *Mich.* = *Laurier benjoin.* B. de 2 à 6 f.
— Nobilis. = *Laurier d'Apollon.* = *L. des guerriers* = *L. franc.* = *L. à sauce* » B. G. * de 23 à 75 f. le °/o
b. Latifolia. = *Laurier franc à larges feuilles.* † * B. de 75 c. à 1 f.
c. Latifolia undulata = *Laurier franc à feuilles ondulées.* † * B. de 75 c. à 1 f.
d. Angustifolia. = L. n. salicifolia. = *Laurier franc à feuilles étroites ondulées.* † * B. de 1 à 3 f.
e. Ovata. = L. pyrifolia. = *Laurier franc à feuilles arrondies.* † * B. de 2 à 4 f.
f. Crispa. = *Laurier franc à feuilles crépues* * † B. 3 à 6 f.
— Sassafras. *L.* = *Laurier sassafras.* B. de 4 à 6 f.
Lavandula Spica. *L.* = *L.* latifolia. *Vill.* = *D C.* = *Lavande commune.* = *Aspic.* † C. G. * 25 c.
b. Angustifolia. *N.* = *vraie lavande* † C. G. 30 c.
— Stœchas. *L.* = Stœchas pedunculata. *Mill.* = *Lavande stæchade.* † C. * de 50 à 75 c.
Lavatera arborea. *L.* = *Lavatère en arbre.* † * G. 50 ».
— Maritima. *Gouan.* = L. africana. *Cav.* = *Lavatère maritime.* † C. G. *. de 75 c. à 1 f.
— Micans. *L.* = *Lavatère brillante.* * † C. de 75 c. 1 f.
— Olbia. *L.* = *Lavatère à feuilles pointues.* * † C. G. de 75 c. à 1 f.
— Triloba. *L.* = *Lavatère plissée.* * † C. de 75 c. à 1 f.
Ledum latifolium. = L. Groenlandicum. *Retz.* = *Ledier à larges feuilles.* = *Thé du Labrador.* C. † de 1 à 3 f.
— Palustre *L.* = *Lédier à feuilles étroites.* C. † de 1 à 3 f.
Ligustrum vulgare. *L.* = *Troëne commun.* C. G. † ? » 3 f. à 25 c. le °/o
b. Album. = *Troëne à fruit blanc.* C. G. † ? de 50 à 75 c.
Liquidambar styraciflua. *L.* = Xochiocotzo-quahuiel. *Hernand.* = *Liquidambar copal.* = *L. d'Amérique.* A. de 2 à 6 f.
Liriodendum tulipifera. *L.* = *Tulipier de Virginie*: A. G. de 1 à 10 f.
b. Integrifolia. = *Tulipier à feuilles entières* A. de 6 à 10 f.
Lithospermum fruticosum. *L.* = Anchusa arborea. = Buglossum fruticosum. *Garid.* = Anchusa angustifolia. *Bauh.* = A. Lignosior. *Barr.* = *Gremil frutescent.* de 75 c. à 1 f.
Lonicera canescens. *Schoubs.* = L. Dubia. = L. biflora. *Desf.* §. G. † de 50 c. à 1 f.
— Caprifolium. *L.* = Caprifolium hortense. = *Chevre-feuille des jardins.* † § G. de 30 à 50 c.
— Dioscoridis. *Roubieu.* = *Chevre-feuille de Dioscoride.* § † G. de 50 c. à 1 f.
— Dioica. *Ait.* = L. media. *Murr.* = L. parviflora. *Lam.* = L. glauca. *Burgsdorf.* = Caprifolium glaucum. = C. bracteosum. *Mich.* = *Chevre-feuille glauque.* † §. de 1 à 2 f.
— Etrusca. *Savi.* Caprifolium Etruscum. = *Chevre-feuille de Toscane.* §. G. de 40 à 75 c.
— Grata. *Ait.* = Caprifolium americanum. = periclymenum americanum. *Mill.* = *Chevre-feuille toujours vert.* Dum. Cours. = *Chevre-feuille du Canada.* *Lam.* † §. G. 50 à 75 f.
— Periclymenum. *L.* = Caprifolium periclymenum. = *Chevre-feuille des bois.* §. G. de 30 à 50 c.
b. Quercifolium. = *Chev. à feuill. de chêne.* § de 50 à 75 c.
c. Serotinum. = *Chev. à fleurs tardives.* §. 50 c. à 1 f.
d. Germanicum. = *Chev. à feuilles glabres* §. 50 c. à 1 f.
— Sempervirens. *L.* = L. coccinea. *Pers.* = Periclymenum sempervirens. *Mill.* = Caprifolium sempervirens. = *Chevre-feuille écarlate* = *Chevre-feuille de Virginie.*
a. Foliis ovatis = *Chevre-feuille écarlate à feuilles ovales.* §. † de 75 c. 1 f. 50 c.
b. Foliis oblongis. = *Chevre-feuille écarlate à feuilles oblongues.* §. † 75 c. 1 f. 50 c.
Lonicera alpigena. *L.* = Xylosteon alpinum. = *Camécerisier des Alpes.* C. de 50 c. à 1 f.
— Cœrulea. *L.* = Xyl. Cœruleum. = *Camécerisier à fruit bleu.* C. » G. de 30 c. 1 f.
— Xylosteum *L.* = Xylosteum dumetorum. = *Camécerisier des haies.* C. » G. de 30 c. à 1 f.
a. Fructu nigro. = *Cam. des h. à fru. noirs.*
b. Fructu rubro. = *Cam. des h. à fru. rouge.*
— Nigra. *L.* = Xylosteum nigrum. = Periclymenum rectum. *clus.* = *Camécerisier à fruit. noir* C. de 1 à 2 f.
— Tartarica. *L.* = Xylosteon tartaricum. *Pers.* = *Chevre-feuille de Tartarie* = *Camécerisier.*

Lon. tart. *a*. Rosea. = *Chevre-feuille de Tartarie à fleurs roses*. C. G. de 40 c. à 1 f.
b. Rubra = *Chevre-feuille de Tartarie à fleurs rouges*. C. de 75 c. à 1 f. 50 c.
c. Alba. = *Chevre-feuille de Tartarie à fleurs blanches*. C. de 40 à 75 c.
Lotus hirsutus. *L*. = *Lotier velu*. = *L. Hémorroïdal*. † C. G. de 50 c. à 1 f.
Lycium afrum. = *Jasmin d'Afrique*. † * C. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Barbarum. *L*. = L. inerme. = *Liciet jasminoïde* B. §. ? G. de 40 à 75 c.
— Boerhaavicefolium. *L*. = L. heterophyllum. *Murr*. = Ehretia halimifolia. *l'Hérit*. = *Lyciet glauque*. B. de 1 à 3 f.
— Chinense. *Lam*. = *Liciet de la Chine*. C. de 75 c. à 1 f.
— Europœum. *L*. = *Liciet d'Europe*. B. de 40 à 75 c.
Magnolia discolor. *Vent*. = M. obovata. *Willd*. = M. denudata. *Lam*. = M. purpurea. *Curtis*. = *Magnolier discolore*. B. de 3 à 10 f.
— Glauca. *L*. = *Magnolier glauque*. = *M. bleu*. = *M. de marais*. = *Arbre du Castor*. A. de 5 à 10 f.
— Grandiflora. *L*. = *Magnolier à grandes fleurs*. = *Laurier Tulipier*. A. † G. de 2 à 10 f.
b. Elliptica. *Ait*. = *Magnolier à feuilles Elliptiques*. A. † de 2 à 10 f.
c. Obovata. *Ait*. = *Magnolier à feuilles obovales*. A. † de 3 à 10 f.
d. Lanceolata. *Ait*. = *Magnolier à feuilles lanceolées*. A. † de 3 à 10 f.
e. Ferruginea. = *Magnolier à feuilles ferrugineuses*. A. † de 5 à 10 f.
f. Crispa. *Magnolier à feuilles crépues*. A † de 10 à 15 f.
— Umbrella. *Lam*. = M. Tripetala. = *Magnolier parassol*. A de 6 à 12 f.
Malus baccata. *Desf*. = Pyrus baccata. *L*. = *Pommier cerise*. = *P. de Sibérie*. = *P. baccifere*. B. G. de 50 c. à 2 f.
— Communis. *D C*. = Pyrus malus. *L*. = Sorbus malus. *Crantz*. = *Pommier cultivé*. (*vide* pag. 8)
a. Sylvestris. = *Pommier sauvageon*. de 3 à 5 f. le °/o
b. Sativa. = *Pommier cultivé*. A. (*vide* pag. 8)
c. Prasomila. = *Pommier de Reinette*.
d. Paradisiaca. = M. pumila. = *Pom. nain de Paradis*.
e. Castanea = *Pommier de chataignes*.
f. Calvilea. = *Pommier de calville*.
g. Apiosa. = *Pommier d'api*.
Id. Nigra. = *Pommier api noir*. de 75 c. à 1 f.
Id. Variegata. = *Pommier api panaché*. de 75 c. à 1 f.
— Coronaria. *Mill*. = Pyrus coronaria. *L*. = *Pommier odorant*. B. de 2 à 3 f.
— Dioica. *Duh. ed. nov*. = Pyrus apetala ? = Malus non florens. *Bauh*. = *Pommier dioïque*. = *Pommier sans fleurs et sans pepins*. = *Pomme figue* ? A. de 75 c. à 1 f.
— Hybrida. *Desf*. = Pyrus prunifolia *Willd*. = M. sinensis. *Hortul*. = Cratœgus cerasifolia. *Mill*. = *Pommier hybride*. = *Pommier de Sibérie*. = *Neflier de la Chine*. B. G. de 75 c. à 2 f.
— Sempervirens. *Desf*. = Pyrus coronaria. *Wangenh*. = P. Angustifolia. *Ait*. = *Pommier toujours vert*. B. 1 f. 50 c. à 3 f.
— Spectabilis. *Desf*. = Pyrus spectabilis. *Ait*. = *Pommier à bouquets* = *Pommier de la Chine à fleurs doubles*. B. 50 c. à 2 f.
— Upsulu. = Pyrus Upsula ? *F. B*. = *Pommier d'Upsal*. 1 à 2 f.
Medeola asparagoïdes. *L*. = Dracena medeoloïdes. = Asparagus medeoloïdes. *Thumb*. = *Médéole à larges feuilles*. §. 1 à 2 f.
Medicago arborea. *L*. = *Luzerne arborescente*. G. * † de 75 c. à 2 f.
Melia azedarach. *L*. = *Azédarac bipinné*. Duh. ed. nov. = *Lilas des Indes* = *Faux sycomore*. = *Arbre à chapelets*. = *Arbre-saint*. * A. G. de 75 c. à 2 f.
— Sempervirens. *Sw*. = *Azedarac toujour vert* = *Lilas des Indes*. * B. de 1 à 3 f.
Melianthus comosus. *Willd*. = M. minor. *Hortul*. = *Mélianthe velu*. = *Fleur de miel*. † B. * G. de 1 à 3 f.
— Major. *L*. = *Mélianthe pyramidal*. † * B. 1 à 2 f.
Menispermum canadense. *L*. = *Ménisperme de Virginie*. §. de 1 à 2 f.
Menziesia polifolia. *Juss*. = Andromeda daboecia. *L*. = Erica daboecii. *Id*. = *Menziesia à feuille de pollum*. † C. de 2 à 3 f.
Mercurialis tomentosa. *L*. = *Mercuriale cotonneuse*. † * C. de 1 à 2 f.

Mespilus axillaris. *Pers*. = Cratægus parvifolia. *Willd*. = C. uniflora ? *Du Roi*. = C. Tomentosa. *L*. = *Neflier axillaire*. = *Pinchaw*. B. de 1 à 2 f.
— Azarolus. = Cratægus azar. *L*. = *Azérolier cultivé*.
a. Fru. albo = *Azérolier à fruit blanc*. A. de 75 c. à 1 f.
b. Fru. rubro. = *Azérolier à fruit rouge*. A. de 50 c. à 1 f.
c. Monspeliensis. = *Azérolier sauvage*. A. de 50 c. à 1 f.
— Corallina. *H. P*. = M. cordata. *Mill*. = M. acerifolia. *Burgsdorf*. = Cratœgus cordata. *Ait*. = C. populifolia. *Walt*. = C. phœnopyrum. = *Neflier petit corail*. B. G. de 1 à 2 f.
— Coccinea. *H. P*. = Cratœgus coccinea. *L*. = *Neflier écarlate*. B. G. de 1 à 1/2 f.
— Cotoneaster. *L*. = M. Tomentosa. *Schleicher*. = *Neflier cotonier*. B. G. de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Crus-galli. *L*. = Mesp. lucida. *Ehrh*. = Cratœg. crus-galli. = *Neflier ergot de coq*. B. G. de 75 c. à 2 f.
b. Splendens. *Ait*. = mesp. crus-galli ovalis. B. G. 1 à 2 f.
— Germanica. *L*. = *Neflier d'Allemagne*. (*vide* pag. 5)
a. Sylvestris. = M. Stricta. *Ait*. = *Neflier des bois*. = *Meslier*. A. 50 c.
b. Minor. *F. B*. = *petit neflier d'Allemagne*. B. 75 c. 1 f.
c. Domestica. = M. macrocarpa. *D C*. = M. diffusa. *Ait*. = M. laurina. *Bauh*. = *Neflier cultivé*. A. 50 à 75 c.
d. Apyrena. *D C*. = M. abortiva. *Delaunay*. = *Neflier à fruit sans noyeaux*. B. de 75 c. à 1 f.
— Japonica. *Thumb*. = *Neflier du Japon* = *Bibacier*. † B. * de 1 à 3 f.
— Latifolia. Poir. = *Neflier à larges feuilles*. B. G. de 1 à 2 f.
— Linearis. *H. P*. = Cratœg. crus-galli. *e*. *Ait*. B. G. de 1 à 2 f.
— Lucida. = Cratœg. pyracantifolia. *Ait*. = *Neflier luisant*. B. G. de 1 à 2 f.
— Oxyacantha. *Gært*. = Cratœgus-ox. *L*. = *Aubépine*. = *Épine blanche* A. G. » de 2 à 4 f. le °/o
b. Major. = *Aubépine à gros fruit*. A. G. de 50 c. à 1 f.
c. Aurea. = *Aubépine à fruit jaune*. A. G. de 75 c. à 1 f.
d. Rosea. = M. ox. nigra. = *Aubépine à fleurs roses*. A. G. de 75 c. à 1 f. 50 c.
Id. Semi plena = *Aubépine à fleurs roses semi doubles*. B. de 1 à 2 f.
e. Plena. = Crat. oxyacanthoïdes. = *Aubépine à fleurs doubles*. B. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Prunifolia. *H. P*. = *Neflier à feuilles de prunier* B. de 1 à 2 f.
— Punctata. *Ait*. = M. cuneifolia. *Ehrh*. = *Neflier ponctué*. = *Azérolier du Canada*. A. G. de 75 c. à 1 f.
b. Flava. = *Azér. du Canada à fruit jaune*. A G. 1 à 2 f.
— Pyracantha. *L*. = *Neflier buisson ardent*. B. † G. 50 c. à 1 f. 50 c.
b. Multifera. = *Buisson ardent nain à gros fruit*. C. † 1 à 3 f.
— Sanguinea. *Bosc*. = Crat. sanguinea. *Pall*. = Cratœg. glandulosa. *Ait*. = *Neflier sanguin*. B.
— Tanacetifolia. *Poir*. = M. pinnata. *Dum. Cours*. = *Neflier du levant*. A. de 1 à 2 f.
— Tomentosa. *Desf*. = *Neflier tomenteux*. B. de 1 à 2 f.
Mimosa acanthocarpa. *Willd*. = M. aculeaticarpa. *Orteg*. = *Acacie à fruits épineux*. » * B. G. de 75 c. à 2 f.
— Julibrizin. *L*. = Acacia arborea. *Forsk*. = *Acacia de Constantinople*. = *Arbre de soie*. A. * G. de 1 à 3 f.
Morus alba. *L*. = *Mûrier blanc*. (*vide* pag. 5.) A. G. 75 c. à 2 f. 50 c.
— Constantinopolitana. *Desf*. = *Mûrier de Constantinople*. B. de 2 à 3 f.
— Italica. *Desf*. = M. rosea. = *Mûrier d'Italie*. = *M. rose*. A. G. de 1 à 2 f. 50 c.
— Nigra. *L*. = *Mûrier à fruit noir*. = *M. de présent*. = *M. des Dames*. A. G. de 3 à 6 f.
— Rubra. *L*. = *Mûrier à fruit rouge*. A. de 2 à 3 f.
b. Canadensis. *Lam*. = *Mûrier du Canada*. A. de 2 à 3 f.
Myoporum debile. *Brow*. = Pogonia debilis. *Andrews*. = Andrewsia debilis. *Vent*. † * B. de 1 à 2 f.
— Ellipticum. *Brow*. = Pogonia glabra. *Andrews*. = Andrewsia glabra. *Vent*. † * B. de 2 à 3 f.
Myrica cerifera = *Galet de la Louisiane*. = *Cirier de la Caroline*. C. G. de 1 à 3 f.
— Gale. *L*. = *Galé*. = *Piment Royal*. C. de 1 à 2 f.
— Pensylvanica. *Lam*. = M. Carolinensis. *Willd*. = *Cirier de Pensylvanie*. = *Arbre de cire*. G. † B. de 1 à 3 f.

Myrsine africana. L. == Myrsine d'Afrique. * C. † de 1 à 3 f.
Myrtus communis. == Mirthe commun. † * B. de 1 à 2 f. 25 c.
a. Romana. Mill. == Mirthe romain. * B † de 1 à 3 f.
b. Tarentina. Mill. == M. de Tarente == M. à petites feuilles. † * B. de 1 à 3 f.
Id. Variegata. == Mirthe panaché. † * C. de 2 à 3 f.
c. Mucronata. Mill. == Mirthe à feuilles mucronées. † * B. de 2 à 3 f.
d. Belgica. Mirthe Belgique. † * B. de 2 à 3 f.
Id. Flore pleno. = Mirthe à fleurs doubles. † * B. 1 à 4 f.
e. Bætica. Mill. Mirthe Bétique. † * C. de 2 à 5 f.
f. Moschata. F. B. Mirthe musqué. † * C. de 2 à 4 f.
g. Linifolia. == Mirthe à feuilles de lin. † * C. de 2 à 5 f.
Nerium oleander. L. == Laurier rose. == Laurose commün. * † B. de 50 c. à 1 f. 25 c.
b. Album. == Laurose à fleurs blanches. † * B. de 1 à 2 f.
Id. Parviflorum. == Laurose à petites fleurs blanches. † * B. de 2 à 3 f.
c. Carneum. = Laurier rose couleur de chair. † * B. 2 à 3 f.
d. Variegatum. == Laurier rose à fleurs panachées. † * B. de 2 à 3 f.
e. Splendens. == Laurier rose éclatant. = Laurier rose à fleurs doubles. † * B. de 2 à 4 f.
Olea Europœa. == Olivier commun. (vide pag. 6.) † * A de 1 à 4 f.
Ononis fruticosa. L. == Bugrane frutiqueuse. C. G. de 50 c. à 1 f.
— Natrix. L. = O. pinguis. == Bugrane jaune. † C. G. de 50 à 75 c.
Osteospermum pinnatifidum. l'Hérit. = O. cœruleum. Ait. = Osteosperme pinnatifide. † C. * de 1 à 2 f.
Osyris alba. L. == Rouvet blanc. * G. C. de 50 à 75 c.
Othonna cherifolia. L. == O. calthoïdes. Mill. == Othonne violière. O. spatulée. == Souci d'Afrique. † * C. de 50 c. à 1 f.
Paliurus aculeatus. Desf. == P. australis. = P. petasus. Dum. Cours. == Rhamnus paliurus. L. == Ziziphus paliurus. Willd. == Paliure épineux. == Epine de Christ. == Porte chapeau. == Argalou. == Arnaveau. Prov. G. » B. de 5 à 25 f. le °/₀
Passerina hirsuta. L. = P. metnan. Forsk. == P. tomentosa Hortul. == Struthiola tomentosa. Andrews. C. * G. † de 1 à 3 f.
— Tartonraira. D C. == Daphne. L. † C. * de 1 à 3 f.
Passiflora cœrulea. L. == Grenadille à fleurs bleues. == fleurs de la Passion. vulg. §. * † de 50 c. à 1 f.
Periploca græca. L. == Périploque grimpante. == Scamonée grimp. == Bourreau d'arbres §. de 50 à 75 f.
Persica vulgaris. Mill. == Pêcher commun. A (vide pag. 4) 40 c. 1 f.
b. Pavia. D C. == P. alberge. == Pavie.
c. Nana. Pêcher nain d'Orléans. C. de 75 c. à 1 f. 25 c.
— Lœvis. D C. == Pêcher à fruit lisse. == Pêche violette. b. Brugno. D C. == Pêcher brugnon. } de 40 c. à 1 fr.
Philadelphus coronarius. L. == P. athenœi. Bauh. == Syringa des jardins. B. de 25 à 60 c.
b. Nanus. Mill. == Syringa nain. C. de 1 à 2 f.
c. Flor. multiplex. = Syringa à fleurs doubles. C. de 1 à 2 f.
— Inodorus. L. == Syringa inodore. == Syringa de la Caroline. B. de 75 c. à 2 f.
Phillyrea angustifolia. L. = Filaria à feuill. étroites. † B. G. 50 c. à 2 f.
b. Lanceolata. Ait. == F. à feuill. lanceolées. † B.
c. Rosmarinifolia. Ait. == F. à feuill. de Romarin. †. B.
— Latifolia. L. == Filaria à larges feuilles. † G. de 5 f. °/₀ à 2 f. p.
a. Lævis. Ait. — à dents obtuses. † G. A
b. Spinosa. Ait. — à dents épineuses. † G. A.
— Media. L. == Filaria à feuilles moyennes † G. B. 25 c. à 2 fr.
b. Ligustrifolia. Ait. == F. à feuill. de Trœne. † 82 c. à 3 f.
c. Oleæfolia. — à feuill. d'Olivier. † B. 1 à 2 f.
d. Buxifolia. Ait. — à feuill. de Buis. † B. 1 à 3 f.
Phlomis fruticosa. L. == Phlomide frutescente. == Sauge de Jérusalem. == Arbre de Sauge. G. * † C. 50 c. à 1 f.
— Leonurus. L. == Leonurus Africana. Mill. == Phlomide queue de lion. C. * 50 c. à 1 f.
Pinus altissima. L. == P. laricio. Desf. == Pin élevé. — P. de Corse. A. † G. 1 à 3 f.
— Cembra. L. == Pin de Sibérie. == P. Cembro. == Alviez. A. † 2 à 3 f.
— Halepensis. Mill. == Pin d'Alep. == P. le Jérusalem. A. † G. 50 c. à 2 f. 25

Pinus Inops. Lambert. == P. virginiana. Mill. == Pin chétif. == Pin de Jersey. † A. 1 à 3 f.
— Maritima. Lam. — P. pinaster. Willd. == P. silvestris. L. == P. maritima major. Duh. == Pin pinastre. == P. maritime. † A. G. 50 c. à 2 f.
— Mitis. Mich. == P. variabilis. Willd. == P. Tœda. b. Poir. == Pin variable. † 3 à 4 f.
— Mugho. Poir. == P. uncinata. D C. == P. montana. Mill. — Pin mugho. == P. de montagne. == P. crin. == P. du Briançonnois. == P. suffis. == Torche-pin. † A. 50 c. à 2 f.
— Pinea L. == P. Sativa. Bauh. == P. domestica. Math. == Pin pinier. == P. pignon. == Pin-bon. == P. cultivé. A. † G. 50 c. à 3 f.
— Strobus. L. == Pin du Lord Weymouth. == P. blanc du Canada. † A. G. 1 à 4 f.
— Sylvestris. L. == P. Genevensis. D C. == Pin sauvage. == Pin de Genève. † A. G. 50 c. à 2 f.
b. Rubra. Mill. == Pin rouge d'Ecosse. † A. G. 1 à 3 f.
— Tœda. L. == Pin d'encens. † 2 à 4 f.
— Variabilis. Lamb. == P. echinata. Mill. == Pin hérissé. † A. 3 à 4 f.
Pistacia lentiscus. L. == P. massiliensis. Mill. == Lentiscus ex chio. Tournef. == Therebinthus lentiscus. Juss. == Pistachier lentisque. † B. G. * 1 à 2 f.
— Reticulata. Willd. == P. Narbonensis. L. == Pistachier dit de Narbonne. A. G. * 1 à 3 f.
— Therebinthus. L. == P. vera. Mill. == Therebinthus vulgaris. Tournef. == Pistachier thérebinthe. == Pudis. Prov. B. G. 50 c. à 2 f.
— Trifoliata. == P. vera. L. == P. macrophylla. Pers. == Therebinthus pistacia. == Pistachier du Levant. A. G. * 3 à 6 f.
Planera Richardi. Mich. == Ulmus polygama. Rich. == U. crenata. Hort. Lugd. == Rhamnus carpinifolius. Pall. == Planéra de Richard. A. 1 à 3 f.
— Ulmifolia. Mich. == P. Gmelini. == Pl. aquatica. Pers. == Planéra à feuilles d'orme. A. 1 à 3 f.
Platanus acerifolia. Willd. == Platane à feuilles d'Erable. A. G. 1 à 2 f.
— Occidentalis. L. == Platane d'Occident. == P. d'Amérique. A. G. 75 c. à 2 f. 50
b. Macrophylla. F. B. == Pl. à grandes feuilles. A. 2 à 4 f.
— Orientalis. L. == Platane d'Orient. A. G. 1 à 2 f.
Polygonum acetosæfolium. Vent. == Cocoloba Sagitifolia. Orteg. == Renouée à feuilles d'oseille. §. * 1 à 2 f.
Populus alba. L. == Peuplier blanc. == Abèle. == Ypreau franc Picard. == Aube. A. G. 50 c. à 2 f.
b. Grisea. == P. Canescens. Willd. == Grisard. A. 50 c. à 2 f.
c. Nivea. Dum. Cours. == Bois blanc de Hollande. A. 50 c. à 2 f.
— Angulata. Ait. — P. Angulosa. Mich. == P. heterophylla. du Roi. == Peuplier de la Caroline. A. 1 à 2 f.
Populus balsamifera. L. == P. Tacamahaca. Mill. == Peuplier baumier. B. 1 à 2 f.
— Fastigiata. H. P. == P. pyramidalis. Ait. == Peuplier d'Italie. == P. pyramidal. == P. de Lombardie. A. 15 à 60 f. le °/₀
— Grandidentata. Mich. == Peuplier à grandes dents. A. 1 à 3 f.
— Græca. Ait. == P. cordata. H. P. == P. cordifolia. Hortul. == Peuplier d'Athènes. == P. à feuilles en cœur. A. 1 à 2 f.
— Heterophylla. L. == P. balsamifera ? Mill. == P. argentea. Peuplier argenté. A. 1 à 3 f.
— Hudsoniana. Mich. == Peuplier d'Hudson. A. 3 à 6 f.
— Monilifera. Ait. == P. Caroliniensis. Moench. == P. Canadensis. Burgsdorf. == Peuplier du Canada. A. 40 c. à 1 f.
— Nigra. L. == P. flexibilis. Roz. == Peuplier noir. == P. sauvage. == P. du pays. vulg. A. 20 à 50 f. le °/₀
— Tremula. L. == Peuplier tremble. A. 75 c. à 2 f.
— Tremuloïdes. Mich. == P. lœvigata. Ait. == Peuplier faux-tremble. A. 2 à 3 f.
— Viminea. == P. Candicans. Ait. == Peuplier liard. == Grand Baumier. A. 1 à 2 f.
— Virginiana. L. == Peuplier de Virginie. A. 50 à 75 f. °/₀
Potentilla fruticosa. L. == Quinte feuille-arbuste. C. 50 c. à 1 f. 50 c.
Prinos glaber. L. == Apalachine glabre. † C. 2 à 3 f.
— Verticillatus. L. == P. Gronowii. Mich. == Apalachine à feuilles de prunier. C. 2 à 3 f.
Prunus cerasifera. Willd. == P. mirobolana. Duh. ed. nov. == P. ma-

rima. *Marsch.* == P. spinosa. *Walt.* == *Prunier mirobolan.* *Prunier cerise.* == *Prunier de Virginie.* A. G. 1 f.
Prunus Domestica. *L.* == P. sativa. *Fuch.*==*Prunier cultivé.* (vide pag. 10.) 40 c. à 1 f. 25 c.
b. Juliana. == *Prunier St. Julien.*
c. Damascena. *H. P.* == *P. damas.*
d. Claudiana. *H. P.* == *Prune Reine-Claude.*
id. Flore pleno. *id.* *à fleurs doubles.* 1 f.
e. Cerea. *H. P.* *Prune Ste. Catherine.*
f. Cereola. *H. P.* *Prunier Mirabelle.*
g. Acinaria. *H. P.* *Prune Cerisette.*
h. Enucleata. — *Prunier sans noyau.* 1 f.
i. Bifera. — *Prunier qui porte deux fois l'an.* 1 f.
— Insititia. *L.* == *Prunier sauvage.* == *Crequier.* == *Prunes sibiarellos.* Prov. A. G. 50 c. à 1 f.
— Prostrata. *Labill.* == Amygdalus incana. *Pall.* == *Prunier couché.* C. 2 à 3 f.
— Pygmoea. *Willd.* == P. Nigra. *Ait.* B. 1 f. 50 c. à 2 f.
— Sinensis. *Pers.* == Amygdalus pumila. *L.* == *Prunier de la Chine.* == *Amandier à fleurs doubles.* C. 75 c. à 2 f.
— Sphœrocarpa. *Mich.* 1 à 2 f.
— Spinosa. *L.* == P. Silvestris. *Fuch.* == *Prunier épineux.* == *Prunelier épine noire.* B. G. 25 à 50 c.
Psoralea glandulosa. *L.*==*Psoralée glanduleuse.* * C. G. 50 c. à 1 f.
Ptelea trifoliata. *L.* == *Ptelée à 3 feuilles.* == *Orme de Samarie.* == *O. à 3 feuilles.* B. C. 75 c. à 1 f. 50 c.
Punica granatum. *L.* == *Grenadier commun.* (vide pag. 5.) de 8 f. °/₀ à 50 c. pièce.
b. Melitensis. == *Grenadier de Malte.* == *G. à gros grains doux.* * G. B. 75 c.
c. Multiplex. == *Grenadier à fleurs doubles.* * B. 75 c. à 1 f.
d. Alba. == *Grenadier à fleurs d'un blanc jaunâtre.* * C. G. 2 à 3 f.
— Nana. *L.* == P. semperflorens. == P. Americana. == *Grenadier nain.* == *Grenadier des Antilles.* C. G. * 2 à 4 f.
Pyrus amygdaliformis. *Vill.* == P. salicifolia. *Balbis.* A. G.
— Communis. *L.* == *Poirier commun.* A.
a. Pyraster. *L.* == Pyrus Silvestris. == *Poirier des bois.*
b. Sativa. *Tournef.* (vide pag. 7 et 8.) 30 c. à 1 f. 25 c.

Var. { Pompeiana. *H. P.* == *Poirier de bon chrétien.*
Rufescens. *H. P.* — *de Rousselet.*
Liquescens. *H. P.* — *de beurré.*
Pyramidalis. *H. P.* — *cuisse madame.* }

Pyrus nivalis. *Jacq.* == *Poirier des neiges.* B. 1 à 2 f.
— Pollveria. *L.* == P. polwilleriana. *J. Bauh.*==P. irregularis. *Knoop.* == *Poirier de Polwiller.*==*Poire azérole.* B. 1 à 2 f.
— Salicifolia. *Pall.* == P. Silvestris orientalis. *Tournef.* == *Poirier à feuill. de saule.* A. 1 à 2 f.
— Sinaï. *Desf.*==*Duh. ed. nov.*==*Poirier du Mont Sinaï.* B. 1 à 2 f.
Quercus alba. *L.* == *Chêne blanc d'Amérique.* A. 1 à 3 f.
b. repanda. *Mich.* A.
c. pubescens. *Willd.* A.
— Bicolor. *Pers.* == Q. Prinus tomentosa. *Mich.* A. 2 à 3 f.
— Castanea. *Willd.* == Q. Prinus acuminata. *Mich.* A. 2 à 3 f.
— Cerris. *L.* == Q. Crinita ? *Lam.* == *Chêne cerrus.* A. 2 à 3 f.
— Coccifera. *L.* == *Chêne Kermès.* == Avaou. *Prov.* † C. G. C. † G. 50 c. à 1 f.
— Fastigiata. *Lam.* == *Chêne cyprès.* == *C. des Pyrénées.* A. 1 à 2 f.
— Ilex. *L.* *Chêne vert.* == *Yeuse.* A. G. † 50 c. à 2 f.
b. Integrifolia. == Q. Smilax. == *Chêne à feuill. entières.* A. † 1 à 3 f.
— Imbricaria. *Mich.* == *Chêne imbriqué.* A. 3 à 4 f.
— Macrocarpa. *Mich.* == *Chêne à gros fruit.* A. 2 à 4 f.
— Obtusiloba. *Mich.* == Q. Stellata. *Willd.* A. 2 à 4 f.
— Prinus. *Willd.* A.
b. Palustris. *Mich.* A.
— Racemosa. *Lam.* == Q. Pedunculata. *Ehrh.* == Q. Fœmina. *du Roi.* == *Chêne blanc.* A. G. 50 c. à 2 f.
— Robus. *Willd.* == Q. Sessiliflora. *Smith.* == *Chêne rouvre.* A. G. 50 c. à 2 f.
b. Lanuginosa. *Thuill.* A. G. 1 à 2 f.

Quercus rubra. *Willd.*==Q. Lœvis. *Walt.* == *Chêne rouge.* A. 2 à 3 f.
b. Latifolia. *Lam.* == *Chêne rouge à larges feuilles.* A. 3 à 5 f.
— Suber. *L.* == *Chêne liège.* A. G. † 1 à 3 f.
— Toza. *Bosc.* == Q. nigra. *Thore.* == Q. Crinita. Var. *Lam.* A. 1 à 2 f.
Rhamnus alaternus. *L.* == *Nerprun alaterne.* == *Filaria.* Prov. » B. † G. * de 5 f. le °/₀ à 1 f. pièce.
b. Foliis aureo-variegatis. == *Alaterne panaché de jaune.* * B. † 1 à 3 f.
c. Foliis argenteo - variegatis. == *Alaterne panaché de blanc.* * B. † 1 à 3 f.
d. Hispanicus. *H. P.* == *Alaterne à larges feuilles.* * B. † 75 c. à 2 f.
e. Balearicus. *H. P.* == *Alaterne de Mahon.* * B. †
— Alnifolius. *l'Hérit.*==*Nerprun à feuilles d'aune.* B. G. 1 à 3 f.
— Alpinus. *L.* *Nerprun des Alpes.* B. 1 à 3 f.
— Catharticus. *L.* == R. solutivus. *Dod.* == *Nerprun purgatif.* B. G. 50 c. à 1 f. 50 c.
— Frangula. *L.* == *Nerprun bourdaine.* == *Bourgêne.* == *Bois à poudre.* == *Aune noir.* B. G. 50 c. à 1 f.
— Hybridus. *l'Hérit.* == R. burgundiacus. *H. P.* == R. sempervirens. *Hortul.* == *Nerprun hybride.* == *Bourgêne de Bourgogne.* † B. de 1 à 3 f.
— Infectorius. *L.* == R. Lycium. *Scop.* == Lycium gallicum. *Bauh.* == *Nerprun teignant.* == *Graine d'Avignon.* vulg. C. G. de 1 à 2 f.
Rhododendrum ferrugineum. *L.* == *Rosage ferrugineux.* C. † 1 à 3 f.
— Hirsutum. *L.* == *Rosage des Alpes.* == *Laurier rose des Alpes.* C. †. de 2 à 4 f.
— Maximum. *L.* == *Rosage à larges feuilles.* B. † de 1 à 4 f.
b. Album. == Var. *à fleurs blanches.* B. † de 2 à 5 f.
Rhododendrum ponticum. *L.* == *Rosage du Pont.*

a. Purpurea. Var. { *à fleurs pourpres.* B. † de 50 c. à 3 f.
b. Rosea. { *à fleurs roses.* B. † de 1 à 4 f.
c. Angustifolia. { *à feuilles étroites.* B. † de 2 à 4 f.
d. Variegata. { *à feuilles panachées.* C. † de 2 à 4 f.

— Punctatum. *Vent.* == R. minus. *Mich.* == R. parviflorum *Dum. Cours.* == *Rosage ponctué.* C. † * de 3 à 8 f.
Rhodora canadensis. *L.* == *Rhodore du Canada.* C. de 3 à 4 f.
Rhus coriaria. *L.* == *Sumac des Corroyeurs.* == *S. à feuilles d'orme.* == *Rouvre.* == Nerte. *en Lang.* B. G. de 50 c. à 1 f.
— Cotinus. *L.* == Cotinus coggyria. *Scop.* == C. coriaria ? *Dod.* == *Sumac fustet.* == *Bois jaune.* == *Arbre aux perruques.* B. G. de 75 c. à 2 f.
— Glabrum. *L.* == R. viridiflorum. *Hortul.* == *Sumac glabre.* B. G. de 50 c. à 2 f.
— Glaucum ? *Jacq.* B. == *Sumac glauque.*
— Radicans *L.* == Toxicodendrum vulgare. *Mill.* == *Sumac Traçant.* == *Arbre à la gale.* B. G. 1 f.
— Toxicodendrum. *L.* == Toxicodendrum pubescens. *L.* == *Sumac vénéneux.* == *Arbre au poison.* B. G. 1 f.
— Typhinum. *L.* == R. virginianum. *Mill.* == *Sumac de Virginie.* == *S. amarante.* B. G. de 15 f. °/₀ à 2 f. pièce.
— Vernix. *L.* == Toxicodendrum pinnatum. *Mill* == T. Carolinianum. *Duh.* == *Sumac vernis.* B. de 2 à 3 f.
— Viminale. *Ait.* == R. lanceum. *Lin.* == *Sumac flexible.* † * B. de 2 à 3 ..
Ribes alpinum. *L.* == *Groseiller des Alpes.* == *G. à fruit doux.* C. G. 3 fr. la douz.
— Diacantha ? *L. F.* == *Groseiller à deux épines.* C. de 1 à 2 f.
— Floridum *l'Hérit.* == R. Pensylvanicum. *Lam.* == R. americanum. *Mill.* == R. am. nigrum. *Mœnch.* == *Groseiller de Pensylvanie.* C. G. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Grossularia. *L.* == *Groseiller épineux.* == *Epine d'Angleterre.* C. » G. de 20 à 60 c.
b. Uva crispa. *L.* == *Groseiller à fruit velu.* C. » G. 20 c.
— Nigrum. *L.* == *Groseiller à fruit noir.* == *Cassis.* == *Poivrier.* C. G. de 2 f. 40 c. la douz.
— Petrœum. *Jacq.* == *Groseiller de roche.* = *Corinthe.* C. 1 à 2 f.
— Rubrum. == *Groseiller à grappes rouges.* (*vide* pag. 5.) C. G. de 10 f. °/₀ à 40 c. pièce.
b. Album. == *Groseiller à fruit blanc.* == *Groseiller perlé.* C. G. de 25 à 50 c.

Robinia altagana. *l'Hérit.* == **Caragana altagana.** == *Robinier de la Daurie.* B. G. de 2 à 3 f.
— Caragana. *L.* = caragana sibirica. *Roy.* == C. arborescens. *Lam.* == Aspalathus arborescens. *Anm.* == *Acacia de Sibérie.* == *A. à fleurs jaunes.* == *Arbre aux pois des Russes.* B. G. de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Chamlagu. *Ait.* == Caragana chamlagu. = *Robinier de la Chine.* == *Caragan de la Chine.* C. de 2 à 3 f.
— Dubia. *Journ. de Bot.* == R. hybrida. *N.* == *Robinier hybride.* A. G. de 2 à 3 f.
— Frutescens. *L.* == Caragana digitata. *Lam.* == C. frutescens. == *Robinier frutescent.* C. de 2 à 3 f.
— Halodendrum. *L. F.* == Caragana halodendr. == *Robinier satiné.* == *Caragan argenté.* C. de 1 à 3 f.
— Hispida. *L* == *Acacia rose.* == *A. Framboisier.* B. de 1 à 2 f.
— Pigmoea. *L.* == *Robinier.* == *Caragan pigmé.* C. de 2 à 3 f.
— Pseudo-acacia. *L.* == *Robinier faux acacia.* == *Acacia blanc.* == *Carrouge des Americains.* de 75 c. à 2 f.
a. Macrocantha. N. == *Robinier à grosses épines* 2 f.
b. Tortuosa. *D C.* == *Robinier tortueux* de 1 à 3 f.
c. Spectabilis. *Dum. Cours.* == R. inermis. *D C.* = *Robinier élégant.* — *Agapanthe.* de 1 à 3 f.
d. Crispa. N. == *Robinier crépu.* de 2 à 3 f.
e. Nova. *Jacq. B.* = *Robinier à feuill. de Sophora.* 2 à 3 f.
— Spinosa. *Ait.* == Caragana ferox. == *Robinier hérissé.* C. de 1 à 3 f.
— Umbraculifera. *D C.* == R. inermis. *Dum. Cours.* == *Robinier Acacia parassol.* B. A. de 75 c. à 3 f.
— Viscosa. *Mich.* == R. montana. *Bartram.* == R. Glutinosa. *Curt.* == *Robinier visqueux.* == *R. glutineux.* A. G. 1 à 3 f.
Rosa alba. *L.* == *Rosier blanc.* B. G.
b. Multiplex. == *R. blanc à fleurs doubles.* de 25 c. à 1 f.
c. Cœlestis. == *R. blanc celeste.* de 2 à 3 f.
d. Carnea. == Rosa incarnata. *Pers.* == *Rosier cuisse de Nymphe.* de 1 à 2 f.
— Alpina. *L.* == *Rosier des Alpes.* B. de 50 c. à 1 f.
b. Lagenaria. *Vill.* == *Rosier à fruits en gourde.* de 1 à 2 f.
c. Pyrenaïca. *Gouan.* == R. hispida. *Krock.* == R. pimpinelifolia ? *Vill.* == R. hybrida ? *Vill.* == *Rosier des Pyrénées.* de 1 à 2 f.
d. Pendulina. *L.* == *Rosier à fruit pendant.* de 1 à 2 f.
— Arvensis. *L.* == R. prostrata ? *D C.* == R. stylosa. *Mérat.* == R. setigera. *Mich.* — R. herporhodon. *Ehrh.* == R. sylvestris? *Roth.* C. de 75 c. à 1 f.
— Bifera. *Pers* == R. semperflorens. *Desf.* == R. damascena. *Willd.* == *Rosier de deux fois l'an.* == *R. de quatre saisons.* B. G. de 25 c. 1 f.
b. Semperflorens. == *Rosier de tous les mois.* == *R. à bouquet.* de 1 à 2 f.
c. Candida. == *Rosier des quatre saisons à fleurs blanches.* de 1 à 2 f.
d. Felicitas. == *Rosier Félicité* de 2 à 4 f.
e. Carnea. == *Rosier des mois couleur de chair.* de 2 à 3.
f. Argentea. == *Rosier des mois argenté.* C.
g. Virginalis. *Ait.* == R. incarnata.. *Mill.* == *Rosier Virginal.* B.
h. Bifera alba et rosea. == *Rosier de deux fois l'an, rouge et blanc.* == *R. Yorck et Lancastre.* B.
— Bracteata. *Vent.* == R. macarthnea. *Dum. Cours* == *Rosier à bractées.* == *R. de macartney.* §. † G. de 1 à 3 f.
— Canina. *L.* == R. Andegavensis. *Bast.* == R. leuchroa. *Desv.* == *Rosier de chien.* B. G. de 25 à 50 c.
— Carolina. *Willd.* == R. corymbosa. *Ehrh.* == R. virginiana. *Du Roi.* == *Rosier de Caroline.* C. de 1 à 3 f.
— Centifolia. *L.* == *Rosier à cent feuilles.* B.
a. Simplex. == *Rosier de Hollande simple.* de 1 à 2 f.
b. Maxima. == R. pictorum. == *Rosier des Peintres.* 1 à 2 f.
c. Crenata. == *Rosier à feuilles crénelées.* de 1 à 2 f.
d. Crispa. == R. bipinnata. *Dupont.* == *Rosier à feuilles de céléri.* de 2 à 5 f.
e. Vilmorina. == R. centifolia carnea. == *Rose vilmorin. R. transparente.* de 2 à 3 f.
f. Muscosa. == *Rosier mousseux.* de 2 à 4 f.
Id. Alba. == *Rosier mousseux à fleurs blanches.* 5 à 8 f.
g. Junonis. == *Rose junon.* de 2 à 3 f.

Rosa. *h.* Unguiculata. *Delaunay.* == R. caryophyllata. *Dupont.* == *R. œillet.* == *Rosier guenille.* de 3 à 4 f.
i. Kinston. *Hortul.* == *Rosier Liston Portugal.* de 1 à 3 f.
j. Unica. == R. mutabilis == R. nivæa. *Dupont.* == *Rose unique.* de 2 à 3 f.
k. Bullata. == *Rosier à feuille de laitue.* de 2 à 4 f.
— Cinnamomea. *L.* == *Rosier canelle.* de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Collina. *Jacq.* == R. dumetorum. *Thuill.* == R. leucantha. *Lois.* == R. obtusifolia. *Desv.* de 50 à 75 c.
— Eglanteria *L.* == R. lutea *Ait.* == R. fœtida. *Aller.* == R. chlorophylla. *Ehrh.* == R. cerea. *Rœssig.* de 75 c. à 1 f.
b. Puniçea. *Mill.* == R. bicolor. *Jacq.* == R. austriaca. *Parck.* == *Rosier capucine.* == *R. ponceau.* == *R. d'Autriche.* de 75 c. à 2 f.
Var. *à bandes ponceau.* == *Rose tulipe.* Dupont. de 2 à 3 f.
Rosa gallica. *L.* == R. rubra. *Blackw.* == R. austriaca. *Crantz.* == *Rosier de Provins.* == *R. de France.* C. de 5 à 25 f. le °/o
b. Versicolor. == *Provins panaché.* C. G. de 1 f. à 25 c.
c. Atropurpurea. == *Rose pourpre-noire.* 50 c.
d. Purpurea. == *R. belle veloutée.* 2 f.
e. Maheka == R. mutabilis. *Dum. Cours.* == *Mahek.* == *Rose changeante.* de 1 à 3 f.
f. purpureo violacea, magna. == *R. belle Evêque.* C. 2 à 3 f.
g. Chremesina. == *R. belle cramoisie.* 2 à 3 f.
— Glauca. *H. P.* == R. rubrifolia. *Vill.* == R. multiflora. *Regnier.* G. C. de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Hybrida. *Schleicher.* == *Rosier hybride.* de 50 c. à 1 f.
— Inermis. *Dupont.* == *Rosier sans épines* de 2 à 4 f.
— Lœvigata. *Mich.* == R. sinica. *L.* == R. chinensis. *Jacq.* == R. ternata. *Poir.* == R. nivœa. *D C.* == R. trifoliata. *Hortul.* == *Rosier lisse.* == *R. blanc de Neige.* † * de 2 à 3 f.
— Lucida. *Willd.* == R. turgida. *Pers.* == R. turneps. *Hort. Angl.* == *Rosier luisant.* C. de 1 à 3 f.
— Majalis. *Herm.* == R. collincola. *Ehrh.* == R. fecundissima. *Roth.* == Rosa regnier. *Schl.* == *Rosier de mai.* G. C. de 50 à 1 f.
b. Flore pleno == *R. du St. Sacrement. à fleurs doubles.* C. G. de 50 c. à 1 f.
— Montana. *Vill.* == R. biserrata. *Mérat.* == R. sepium. macrocrapa. *Desv.* == R. malmundariensis. *Lejeune.* == *Rosier de montagné.* C. G. de 50 c. à 1 f.
— Moschata. *Ait.* == R. opostemum. *Ehrh.* == R. arborea. *Pers.* == *Rosier musqué.* B. G. de 2 à 3 f.
b. Flore pleno. Var. { *à fleurs doubles.* B. de 2 à 3 f.
c. Nana. Var. { *Nain.* * C. G. de 2 à 4 f.
— Multiflora. *Thumb.* == *R. multiflore du Japon.* § † * 2 à 4 f.
— Myriacantha. *D C.* == R. involuta. *Smith.* == *Rosier mille épines.* C. G. de 1 f. à 1 f. 50 c.
— Nana. *Duh. ed. nov.* == R. burgundiaca. *Roess.* == R. pulchella. *Pers.* == *Rosier pompon.* == *R. de Bourgogne.* == *R. nain.* C. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Palustris ? *F. B. C.* de 1 à 2 f.
— Parviflora. *Ehrh.* == R. carolina. *Du Roi.* == R. pensylvanica. *Wang.* == R. humilis. *March.* == *Rosier parviflore.* C. 3 à 4 f.
— Parvifolia. *Ehrh.* == R. remensis. *Desf.* == *Rosier à petites feuilles.* == *R. de Meaux.* == *R. de Rheims.* == *R. de Champagne.* C. de 40 c. à 1 f.
— Pimpinellifolia. *L.* == *Rosier à feuilles de pimprenelle.* C. G. de 50 c. à 1 f.
b. Spinosissima. *L.* C. G. de 1 à 2 f.
c. Multiplex. == *Rosier à feuill. de Pimp. double.* C. 2 à 4 f.
— Rubiginosa *L.* == R. eglanteria. *Tabern.* == R. suavifolia. *Lightfoot.* == R. Pseudo-rubiginosa. *Lejeune.* == *Rosier rouillé.* == *Eglantier rouge.* == *R. à odeur de reinette.* C. G. de 50 à 75 c.
b. Multiplex. == Var. *à fleurs doubles.* C. de 2 à 4 f.
— Semperflorens. *Curtis.* == R. diversifolia. *Vent.* == R. Bengalensis. *Pers.* == *R. du Bengale.* G. C. † de 50 c à 3 f.
b. Centifolia. == *R. du Beng. à fleurs doubles.* † C. 2 à 4 f.
c. Alba. == *R. du Beng. à fleurs blanches.* † C. de 1 à 2 f.
d. Purpurea. == *R. du Beng. cramoisi.* † C. * de 1 à 2 f.
e. Persicœfolia. == *R. du Beng. à feuill. de pêcher.* † 1 à 2 f.
f. Pumila. == *R. du Bengale nain, pompon.* C. † 2 à 4 f.
— Sempervirens. *L.* == R. scandens. *Mill.* == *Rosier toujours vert.* §. † G. de 50 à 1 f.

Rosa. *b.* Balearica. *Desf.* = R. atrovirens. *Viviani.* = R. ovoidea. = *Rosier de Mahon.* §. † G. de 2 à 3 f.
c. Microphylla. *D C.* = *Rosier t. v. à petites feuilles.* §. † G. de 1 à 2 f.
— Sepium. *Thuill.* = R. agrestis. *Savi.* = *Rosier des haies.* C. G. de 50 à 75 f.
— Sulphurea. *Ait.* = R. glaucophylla. *Ehrh.* = *Rosier jaune.* C. de 75 à 2 f.
b. Nana. = *Rosier pompon jaune.* C. de 2 à 3 f.
— Turbinata. *Ait.* = R. campanulata. *Ehrh.* = R. francofurtensis. *Roess.* = *Rosier turbiné.* = *R. de Fracfort.* = *F. à gros cul.* C. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Villosa. *L.* = R. mollissima. *Willd.* = R. tomentosa. *Smith.* = R. pomifera. *Tournef.* = *Rosier velu.* = *R. à odeur de pomme reinette.* C. G. de 1 à 2 f.
Rosmarinus officinalis. *L.* = *Romarin commun.* † C. C. * 25 à 50 c.
Rubus canescens. *D C.* = *Ronce blanchâtre* §. de 50 c. à 1 f.
— Cœsius. *L.* = *Ronce bleuâtre.* = Pétavin. *Prov.* C. G. 15 c.
— Collinus. *D C.* = *Ronce de colline.* §. de 50 c. à 1 f.
— Fruticosus. *L.* = *Ronce commune.* §. 3 f. le °/o
b. Flore pleno. = *Ronce à fleurs doubles.* §. † ? 1 f. à 1 f. 50 c.
c. Inermis. *Willd.* = *Ronce sans épines.* §. de 1 à 2 f.
d. Laciniatus *Willd.* = *Ronce à feuilles découpées.* = *R. à feuilles de persil.* vulg. §. de 1 à 2 f.
— Hybridus. *Willd.* = R. glandulosus. *Bellardi.* = R. corylifolius. *b. Smith.* = *Ronce à feuilles de noisetier.* G. §. 50 c. à 1 f.
— Idœus. *L.* = *Framboisier.* (*vide pag.* 5) C. de 3 à 5 f. le °/o
— Odoratus. *L.* = *Ronce odorante.* = *Framboisier du Canada.* C. de 50 c. 1 f.
Ruscus aculeatus. *L.* = *Fragon épineux.* = *Fragon piquant.* = *Houx frélon.* † G. C. de 25 à 75 c.
— Hypoglossum. *L.* = *Fragon à folioles.* † C. de 50 à 75 c.
— Hypophyllum. *L.* = *Fragon sans folioles.* = *Laurier Alexandrin.* † C. de 50 c. à 1 f.
— Racemosus *L.* = Danae racemosa. *Pers.* = *Fragon à grappes.* † C. de 75 c. à 1 f. 50 c.
Ruta angustifolia. *Pers.* = R. chalepensis. *Mill.* = R. graveolens. *b. L.* = *Rue à feuilles étroites.* † C. G. * de 25 à 75 c.
— graveolens. *L.* = *Rue commune.* = *R. de jardins.* † G. 25 à 50 c.
— Montana. *Ait.* = R. legitima. *Jacq.* = R. sylvestris minor. *Mill.* = *Rue de montagne.* † C. de 25 à 75 c.
Salicornia fruticosa. *L.* = *Salicorne ligneuse.* † C. de 50 à 75 c.
Salix acuminata. *Smith.* = *Saule acuminé.* B. 50 c.
b. Variegata = *Saule panaché.* B. 75 c.
— Alaternoïdes. *Schl.* = *Saule à feuille d'Alaterne.* B. 50 c.
— Alba *L.* = *Saule blanc.* A. (*L'on fournit des plantards de cette espèce en bon choix, d'environ 8 pieds de hauteur au prix de* 150 *à* 300 *francs le millier.*)
— Amygdalina. *Dum. Cours.* — *Saule amandier.* = *Osier brun.* B. 50 c.
— Aquatica. *Smith.* = *Saule aquatique.* B. 50 c.
b. Humilis. *Schl.* 50 c.
— Arenaria. *L.* = S. Helvetica. *Vill.* = *Saule des sables.* B. 50 c.
— Aurita. *L.* = S. ulmifolia. *Vill.* = *Petit saule marceau.* = *saule oreillé.* B. 50 c.
— Babylonica. *L.* = *Saule pleureur.* = *Saule de Babylonne.* = *Saule parassol.* A. de 75 c. à 2 f.
— Bicolor. *Bourgs.* = Salix laurina ? *Smith.* = *Saule à deux couleurs.* B. de 1 à 2 f.
— Caprœa. *L.* = S. sphacellata. *Smith.* = S. lanata. *Lightf.* = *Saule marceau.* A. de 50 c. à 1 f.
— Carpinifolia. *Schl.* = *Saule à feuille de charme.* A. 50 à 75 c.
— Corformis. *Schl.* B. 50 c.
— Dura. *Schl.* B. 50 c.
— Fissa. *Hoff.* = S. rubra. *Smith.* = Salix virescens. *Vill.* B. de 50 à 75 c.
— Fusca *L.* = *Saule brun.* C. de 75 c. à 1 f.
— Glauca *L.* = *Saule glauque.* B. de 75 c. à 1 f.
— Glaucophylla. *Schl.* B. 50 c.
— Incubacea. *Willd.* = Salix angustifolia. *Wulfen.* = *Saule nicheur.* B. 50 c.
— Monandra. *Hoff.* = S. purpurea. *L.* = S. helix. *Sm.* = S. monostemum. *Hall.* = *Osier rouge des vignes.* = *Saule à tête écailleuse.* = *Saule hélice.* B. de 25 à 50 c.
— Myrtilloïdes. *L.* = S. cœsia. *Vill.* = *Saule myrtillin.* B. 50 c.

Salix Pentandra. *L.* = *Saule à feuilles de laurier.* = *S. odorant.* = *Saule pentandrique.* A. de 50 c. à 1 f.
— Persicœfolia. *Schl.* = *Saule à feuilles de pêcher.* A. 50 à 75 c.
— Populifolia. *Schl.* = *Saule à feuilles de peuplier.* B. 50 à 75 c.
— Retusa. *L.* = *Saule émoussé.* B. 50 c.
— Riparia. *Schl.* = S. incana. *Schr.* = S. lavendulœfolia. *Lapey.* = Salix rosmarinifolia. *Host.* = S. viminalis. *Vill.* = *Saule des rivages.* B. 50 c.
— Triandra. *L.* = *Saule triandrique.* B. 50 c.
— Ulmifolia. *Hoff.* = S. aquatica. *Lam.* = *Saule à feuilles d'orme.* B. 50 c.
— Villarsiana. *Flug.* = S. triandra. *Vill.* B. 50 c.
— Viminalis. *L.* = S. longifolia. *Lam.* = *Saule osier* B. 25 à 50 c.
— Vitellina. *L.* = *Saule osier jaune* = *Amarinier.* de 25 à 30 c.
Salvia aurea. *L.* = *Sauge dorée.* † * C. de 1 à 3 f.
— Grandiflora. *Etling.* = S. tomentosa. *Mill.* = *Sauge à grandes fleurs.* † C. G. de 50 à 75 c.
b. Alba. = *Sauge à grandes fl. blanches.* C. † 75 c. à 1 f.
— Officinalis. *L.* = *Sauge commune.* C. † de 10 à 25 c.
b. Tricolor. = *Sauge tricolore.* † C. de 20 à 50 c.
c. Variegata. = *Sauge panachée.* † C. de 25 à 50 c.
— Pomifera. *L.* = *Sauge pomifère.* C † de 75 c. à 1 f.
Sambucus canadensis. *L.* = *Sureau du Canada.* B. G. 75 c. à 1 f.
— Nigra. *L.* = *Sureau commun.* B. G. » 10 f. le °/o
b. Variegata. = *Sureau panaché.* B. G. 1 à 2 f.
c. Monstruosa. = *Sureau à tiges plates.* B.
d. Laciniata. = *Sureau à feuilles laciniées.* B. G. 75 c. à 1 f.
— Racemosa. *L.* = S. montana *Camer.* = S. cervina. *Taber.* = *Sureau à grapes.* B. G. 50 c. à 1 f. 50 c.
Santolina incana. *Lam.* = S. chamae-cyparissys ? *L.* = *Garde robe.* = *Petit cyprès.* C. † 5 à 10 f. le °/o
— Rosmarinifolia. *L.* = *Santoline à feuilles de romarin.* † C.
b. Viridis. *Willd.* = *Santoline verte.* † C. 15 à 25 c.
— Squarrosa. *Willd.* = S. tomentosa. *H. P.* † C. 40 à 75 c.
Sapium sebiferum. = Croton sebiferum. *L.* = Stillingia sebifera ? *Mich.* = *Gluttier porte suif.* * A. 3 à 6 f.
Scabiosa cretica. *L.* = *Scabieuse frutescente.* † C. G. * 75 c. à 1 f.
Smilax aspera. *L.* = *Smilax rude.* * §. † G. 50 c. à 1 f.
— China. *L.* = *Smilax de la chine.* * §. † 1 à 2 f.
— Salsaparilla. *L.* = *S. salsepareille.* §. † 3 à 4 f
Solanum auriculatum. *Lam.* = *Morelle à oreilles.* * † B. 75 c. à 2 f.
— Bonariense. *L.* = S. arborescens. *Mœnch.* = Morelle de Buenos-ayres. * B. 50 c. à 1 f.
— Dulcamara. = *Morelle grimpante* = *Douce amère.* = *Vigne de Judée.* §. 25 c.
b. Alba. = Var. *à corolle blanche.* §. 75 c. à 2 f.
— Pseudo-capsicum. *L.* = *Cerisier d'Inde.* = *Morelle cerisette.* = *Amome des jardiniers.* * † C. de 50 à 1 f
Sophora japonica. *L.* = *Sophora du Japon.* A. G. de 1 à 2 f. 50 c.
— Microphylla. *Ait.* = *Sophora à petites feuilles.* * † C. 2 à 3 f.
Sorbus americana. *Willd.* = S. canadensis. *Hortul.* = *Sorbier d'Amérique.* A. de 1 à 3 f
— Aucuparia. *L.* = *Sorbier des oiseleurs.* = *Cochesne.* = *Arbre à grives.* G. A. de 75 c. à 2 f.
— Domestica. *L.* = *Sorbier cultivé.* = *Cornier.* (*vide pag.* 11) A. de 50 c. à 2 f.
— Hybrida. *L.* = Pyrus pinnatifida. *Ehrh.* = *Sorbier hybride.* = *S. de Laponie.* A. de 1 à 3 f.
Spirœa alpina. *Pall.* = *Spirée des Alpes.* C. de 1 à 2 f.
— Chamœdrifolia. *Willd.* = *Spirée à feuilles de germandrée.* C. de 1 à 2 f.
— Crenata *L.* = *Spirée à feuilles crénelées.* C. 50 c. à 1 f. 50 c.
— Hypericifolia. *L.* = *Spirée à feuilles de mille pertuis.* C. de 50 c. à 1 f.
b. Crenata. = Var. *à feuilles crénelées.* C. 50 c. à 1 f.
— Lœvigata. *L.* = S. altaica. *Pall.* = S. altaiensis. *Laxm.* = *Spirée lisse.* C. de 75 c. à 2 f.
— Opulifolia. *L.* = *Spirée à feuilles d'obier.* B. G. » 25 à 75 c.
— Salicifolia. *L.* = *Spirée à feuilles de saule.* C. de 40 c. à 1 f.
a. Rosea. = *Spirée à fleurs roses.* de 50 à 75 c.
b. Alba. *Ehrh.* = *Spirée à fleur blanche.* de 50 à 75 c.
c. Paniculata *Ait.* = *Spirée à fleurs paniculées.* de 50 à 1 f.
Sorbifolia. *L.* = *Spirée à feuille de sobier.* C. 50 c. à 1 f.
— Tomentosa. *L.* = *Spirée cotonneuse.* C. de 1 à 3 f.
— Triloba. *Pall.* = *Spirée trilobée.* C. de 1 à 3 f.

Spiræa Ulmifolia. *Scop.* = S. chamædrifolia. *Jacq.* = S. betulifolia. *Pall.* = S. carpinifolia. = *Spirée à feuille d'orme.* C. 1 à 2 f.
Staphylea pinnata. *L.* = Staphylodendrum. *Scop.* = Pistacia sylvestris. *Bauh.* = Nux vesicaria. *Dod.* = *Nez-coupé.* = *Faux-pistachier.* = *Patenôtrier.* B. G. de 75 c. à 2 f.
— Trifoliata. *L.* = S. virginiana. *Moriss.* = *Staphylea à feuilles ternées.* B. G. de 2 à 3 f.
Statice monopetala. *L.* = Limonium lignosum *Bocc.* = L. scabra. *Pers.* = *Statice frutescente.* = *S. monopetale.* † * C. de 50 c. à 2 f.
Sterculia platanifolia. *L.* = *Sterculier de la Chine.* = *S. à feuilles de platane.* = *Bupariti.* = *Parassol chinois.* A. * G. de 1 à 8 f.
Sthœhelina dubia *L.* = Serratula conica. *Fl. Franc.* = *Stéline à feuilles de romarin.* C. †
Styrax officinale *L.* = *Aliboufier officinal* = *Storax.* B. G. 1 à 4 f.
Symphoricarpos conglomerata. *Pers.* = S. parviflora *Dum. Cours.* = S. vulgaris. *Mich.* = Lonicera symphoricarpos. *L.* = *Chevre-feuille de Virginie.* = Symphoricarpos. C. G. 50 c.
Syringa dubia. *Pers.* = S. chinensis. *Willd.* = Lilac varina. *Dum. Cours.* = *Lilas varin.* B. de 75 c. à 1 f. 50 c.
b. Alba = *Lilas varin à fleurs blanches.* B. de 2 à 3 f.
— Persica. *L.* = *Lilas de Perse.*
a. Lanceolata. = S. ligustrina. = *Lilas à feuilles de Troëne.* B. de 1 à 3 f.
b. Laciniata. = *Lilas de Perse lacinié.* C. de 75 c. à 1 f.
— Rothomagensis. = Lilac media. = *Lilas de Marly.* B. 1 à 2 f.
— Vulgaris. *L.* = Lilac. *Lam.* = *Lilas commun* B. de 25 à 75 c.
Var. { *à fleurs violet-bleuâtre.* B. 50 c.
à fleur pourprée. B. 50 c.
à grandes fleurs. = *Lilas double.* vulg. B. 1 à 2 f. }
b. Alba. = *Lilas à fleurs blanches.* B. de 50 c. à 1 f.
Tamarix africana. *Desf.* = *Tamaris d'Afrique.* B. de 1 à 2 f.
— Gallica. *L.* = T. narbonensis. = *Tamaris pentandrique.* = *T. de Narbonne.* A. B. de 25 à 75 c.
— Germanica. *L.* = Myrica pannonica. *Clus.* = *Tamaris d'Allemagne.* C. de 50 à 75 c.
Taxus baccata. *L.* = *If. commun.* † G. A. B. de 1 à 4 f.
Teucrium betonicum. *l'Hérit.* = T. Maderense. *Lam.* = *Germandrée de Madère.* * † G. C. de 50 c. à 1 f.
— Flavum. *L.* = *Germandrée jaune.* † * G. C. de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Fruticans. *L.* = *Germandrée d'Espagne.* † * C. 50 c. à 1 f. 50 c.
— Marum. *L.* = *Germandrée maritime.* = *Herbe aux chats.* † C. * G. de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Massiliense. *L.* = *Germandrée à odeur de pomme.* † * C. 1 à 2 f.
Thuya occidentalis. *L.* = *Thuya d'Amérique.* B. † G. 75 c. à 3 f.
— Orientalis. *L.* = *Thuya de la Chine.* = *Arbre de vie.* B. † G. * de 75 c. à 1 f. 50 c.
Thymus mastichina. *An.* Thymus exserens ? *Ehrh.* = *Thym citré.* † C. * de 50 c. à 1 f.
— vulgaris. *L.* = *Thym commun.* † C. * 25 c.
b. Alba. = Var. *à fleurs blanches.* † C. * 1 f.
Tilia argentea. *H. P.* = T. rotundifolia. *Vent.* = T. alba. *Willd.* non. *Ait.* = T. tomentosa. *Mœnh.* = *Tilleul argenté.* A. G. de 1 à 3 f.
— Glabra. *Vent.* = T. americana. *L.* = *Tilleul d'Amérique.* A. G. de 2 à 4 f.
— Microphylla. *Vent.* = T. Europœa. *L.* = T. Europœa parvifolia. *Ait.* = T. ulmifolia. *Scop.* = T. sylvestris. *Desf.* = T. fœmina. *Bauh.* = *Tilleul des bois.* = *T. à petites feuilles.* A. G. de 75 c. à 2 f.
— Platiphyllos. *Vent.* = T. Europœa. *L.* = T. cordata. *Mill.* = T. Silesiaca. *Till.* = *Tilleul à grandes feuilles.* = *T. de Hollande.* A. G. de 1 à 2 f. 50 c.
— Pubescens. *Ait.* = T. Caroliniana. *Mill.* = *Tilleul pubescent.* A. de 2 à 3 f.
— Rubra. *DC.* = T. Corallina. *Ait.* = *Tilleul à bois rouge.* = *T. de Corinthe.* A. G. de 1 à 2 f. 50 c.
Ulex Europœus. *L.* = *Ajonc d'Europe.* = *Jonc marin.* † B. G. de 3 f. le $^{0}/_{0}$ à 1 f. pièce.
— Nanus. *Sm.* = *Ajonc nain.* C. G. † de 75 c. à 2 f.
— Provincialis. *Lois.* = *Ajonc de Provence.* C. G. † 75 c. à 1 f. 50 c.
Ulmus americana. *L.* = *Orme d'Amérique.* A. de 1 à 2 f. 50 c.
— Campestris. *L.* = *Orme commun.* A. G. 1 à 2 f. 25 c.
a. Vulgaris. = *Orme à feuilles larges et rudes.* A. G. de 1 à 2 f. 25 c.
Ulmus. *b.* Stricta. = *Orme à feuille étroites et rudes.* = *Ormille.* A. » de 1 à 2 f. 25 c.
c. Glabra. = *Orme a feuilles glabres.* A. 1 à 2 f. 25 c.
d. Latifolia. = *Orme à grandes feuilles.* A. G. de 1 à 3 f.
Var. Argenteo-maculata. = *Orme panaché.* A. 1 à 3 f.
e. Modiolina. = *Orme pyramidal.* = *Orme à moyeux.* A. G. de 1 à 2 f. 25 c.
f. Crispa. *F. B.* = *Orme à feuilles crépues.* A. de 1 à 3 f.
g. Rugosa. *N.* = *Orme d'Avignon.* Sp. nouv. A. G. de 2 à 3 f.
— Chinensis *Desf.* = U. pumila. *Hortul.* = *Orme de la Chine.* = *Thé de l'abbé Galois.* B. * de 2 à 4 f.
— Effusa. *Willd.* = U. octandra. *Schkuhr.* = U. hollandica. *Du Roi.* = U. glabra. *Mill.* = U. ciliata *Ehrh.* = U. montana. *Bauh.* = *Smith.* = U. pedunculata. *Lam.-Fougeroux.* = *Orme pédonculé.* = *Orme de Hollande.* A. G. 1 à 3 f.
— Suberosa *Willd.* = U. tetradra. *Schkuhr.* = U. sativa. *Du Roi.* = *Orme à liège.* A. G. de 1 à 2 f.
Vaccinium myrtillus. *L.* = *Airelle commune* C. G. de 50 c. à 1 f.
— Oxycoccos. *L.* = Oxycoccus Europœus. *Pers.* = *Airelle canneberge.* C. de 1 à 2 f.
— Vitis idœa. *L.* = V. punctatum. *Lam.* = *Airelle ponctuée.* C. †. de 1 à 3 f.
Verbena triphylla. *l'Hérit.* = V. citriodora. *Cav.* = Aloysia citriodora. *Orteg.* = *Verveine odorante.* = *V. à odeur de citron.* * B. de 75 c. à 3 f.
Viburnum cassinoïdes. *Mich.* = V. lœvigatum. *Ait.* = *Viorne cassinoïde.* B. † de 2 à 3 f.
— Dentatum. *Ait.* = *Viorne dentée.* B. de 2 à 3 f.
— Lantana. *L.* = *Viorne commune.* = *Mansienne.* B. G. 50 c. à 2 f.
b. Canadensis. = *Viorne du Canada.* B. G. 1 à 2 f. 25 c.
— Lentago. *Ait.* = *Viorne à manchette.* B. de 1 à 3 f.
— Nudum. *Ait.* = *Viorne nue.* B. de 2 à 3 f.
— Opulus. *L.* = *V. obier.* B. G. de 50 à 75 f.
b. Sterilis. = V. roseum. = *Boule de neige.* = *Rose de gueldres.* B. de 50 c. 1 f.
— Prunifolium. = *Viorne à feuilles de prunier.* B. 1 f. 50 c. à 3 f.
— Rugosum. *Pers.* = V. rigidum. *Vent.* = V. Strictum. *Hortul.* = *Viorne rugueuse.* B. * † de 2 à 4 f.
— Tinus. *L.* = *Viorne laurier-tin.* B. G. * † de 50 c. à 2 f.
b. Lucidum. = *Viorne luisante.* B. G. * † de 1 à 3 f.
Variegata. = *Viorne panachée.* B. * † de 2 à 3 f.
Vinca major. *L.* = *Grande pervenche.* † C. de 25 à 50 c.
b. Media. *Hort. Telon.* = *Pervenche moyenne.* † C. 50 c.
c. Variegata. = *Pervenche panachée.* † C. 75 c.
d. Alba. = *Pervenche à fleurs blanches* † C. de 1 à 2 f.
— Minor. *L.* = *Petite pervenche.* † C. 50 c.
b. Multiplex. = *Var. à fleurs doubles.* † C. de 75 c. à 1 f.
Vitex agnus castus. *L.* = *Gatillier faux poivrier.* B. G. 75 c. à 2 f.
b. Rosea. = *Gatillier à fleur rose.* B. G. de 1 à 2 f. 50 c.
— Negundo. *L.* = V. incisa. *Lam.* = *Gatillier à feuilles découpées.* C. G. de 2 à 3 f.
Vitis arborea. *L.* = V. pinnata. *Vahl.* = Ampelopsis bipinnata. *Mich.* = *Vigne en arbre* = *Vigne à feuilles de persil.* §. * de 2 à 3 f.
— Labrusca. *L.* = *Vigne d'Amérique.* = *Vigne cotonneuse.* §. de 1 à 3 f.
— Vinifera. *L.* = *Vigne cultivée.* (*vide* pag. 11) de 50 à 75 c.
a. Silvestris. = *Vigne sauvage.* = Lambrusquo. *Prov.* §.
b. Sterilis. *Hort. Telon.* = *Vigne stérile.* = *Vigne odorante.* §. de 75 c. à 2 f.
c. Apyrena. = V. Corinthiaca. *Bauh.* = *Raisin de Corinthe sans pepins* §. de 50 à 75 c.
d. Laciniosa. *L.* = *Vigne à feuilles laciniées.* = *Ciotat.* = *Raisin d'Autriche.* §. de 50 à 75 c.
— Vulpina. *L.* = V. acerifolia. *Raj* = *Vigne de renard.* §. 1 à 2 f.
Yucca aloëfolia. *L.* = *Yucca à feuilles d'aloës.* † B. G. * de 2 à 4 f.
— Gloriosa *L.* = Y. Canadensis. *Ald.* = *Yucca fastueux.* = *Y. à feuilles entières.* = *Y. rustique.* * † B. G. de 3 à 6 f.
Zanthorhiza apiifolia. *l'Hérit.* = *Zanthorhize à feuilles de persil.* C. de 1 à 3 f.
Zanthoxylum fraxineum. *Willd.* = Z. clava herculis. *L.* = Z. americanum. *Mill.* = Z. ramiflorum. *Mich.* = Fagara fraxinifolia. *Duh.* = *Clavalier à feuilles de frêne.* = *Frêne épineux.* B. de 1 à 3 f.

Ziziphus sinensis. *L.* == *Jujubier de la Chine.* B. G. de 1 à 2 f.
— Volubilis. *Willd.* == Rhamnus volubilis. *L.* == OEnoplia volubilis. *Pers.* == *Jujubier sarmenteux.* §. de 2 à 3 f.

Ziziphus Vulgaris. *Lam.* == Z. sativa. *Desf.* == Rhamnus ziziphus. *L.* == *Jujubier commun.* == *J. cultivé* == Chinchourlier. *Prov.* B. de .75 c. à 1 f. 50 c.

ARBRES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Abrus precatorius. *L.* == *Abrus à chapelet.* == *Fausse reglisse.* *s. ch.* §. 5 à 6 f.
Acacia cornigera. *Willd.* == Mimosa cornigera. *Jacq.* == *Acacie porte-corne. or.* de 8 à 15 f.
— Dodonæifolia. *H. P.* † *or.* de 3 à 7 f.
— Eburnea. *L.* == Mimosa leucacantha. *Jacq.* == *Acacie à épines d'ivoire.* ♉ de 1 à 4 f.
— Farnesiana. *Willd.* == *Acacie de farnèse* == *fleur de cassis. vulg.* ♉ de 50 c. à 3 f.
— Glaucescens. *Balbis.* == Mimosa binervia ? *Wendl.* † or. de 2 à 6 f.
— Heterophylla. *Lam.* == *Acacie hétérophylle.* † *or.* de 3 à 4 f.
b. Simplicifolia. *L.* == Mimosa latifolia ? *Hortul.* † *or.* 3 à 4 f.
— Lebbeck. *Willd.* == *Acacie du Malabar. s. ch.* de 3 à 6 f.
— Leucocephala. *Lam.* == *Acacie à tête blanche.* de 2 à 3 f.
— Longifolia. *Willd.* = *Andrew.* == Mimosa ensifolia. *Smith.* == M. falcata. *H. P.* == *Acacie à longues feuilles.* † *or.* 3 à 5 f.
— Lophantha. *Willd.* == Mimosa distachya. *Vent.* == *Acacie en panache. s. ch.* de 2 à 4 f.
— Paradoxa. *D C.* † 6 f.
— Strombulifera. *Willd.* == *Acacie tire-bouchon. or.* de 4 à 6 f.
— Suaveolens. *Willd.* == Mimosa stricta. *Andrew.* == *Acacie odorante.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Undulata. == Mimosa undulata. *Hortul.* † de 6 à 8 f.
Achania malvaviscus *Ait.* == Malvaviscus coccineus. == M. arboreus. *Lam.* == Hibiscus frutescens. *Brown.* == H. malvaviscus. *L.* == *Mauvisque écarlate. or.* de 2 à 3 f.
— Mollis. *Ait.* == *Mauvisque cotonneux. or.* de 2 à 3 f.
Adianthum reniforme. *L. s. ch.* de 3 à 4 f.
Ægiphylla martinicensis. *L.* == *Ægiphylle de la Martinique.* == *Bois de fer.* == *Bois cabril. s. ch.* de 6 à 8 f.
Agave fœtida. *L.* == Furcrea gigantea. *Vent.* == F. fœtida. *Pers.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
— Mexicana *L.* == A. lurida ? *Jacq.* == *Agavé du Mexique.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Spicata. == *Agavé à épis.* == *H. madr.* † *s. ch.* de 4 à 6 f.
— Vivipara. *L.* == *A. vivipare. s. ch.* † de 3 à 8 f.
Aloe arachnoïdea. *L.* == *Aloès patte d'araignée.* † *s. ch.* de 1 à 3 f.
— Atrovirens. *D C.* == A. arachnoïdea. *b. Thumb.* == *Aloès vert-livide.* † *s. ch.* de 1 à 3 f.
— Carinata. *D C.* == *A. tuberculeux.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
— Cymbœfolia. *Jacq* == *Aloès en nacelle.* de 1 à 3 f.
— Disticha. *L.* == A. lingua. == A. linguœformis. *Hortul.* == *Aloès bec-de-canne.* †.
b. Triangularis. Var. { *Triangulaire* de 1 à 3 f.
c. Latifolia. Var. { *à larges feuilles.* de 1 à 2 f.
— Fruticosa. *Lam.* == A. arborescens. *D C.* == *Aloès corne de belier.* † de 1 à 3 f.
— Humilis. *L.* == *Aloès nain.* † de 1 à 3 f.
— Maculata. == A. picta. *D C.* == *Aloès moucheté.* † 2 à 3 f.
— Margaritifera. *L.* == *Aloès perlé.* † de 50 c. à 2 f.
b. Minor. *D C.* † de 1 à 2 f.
— Mitræformis. *Lam.* == A. umbellata ? *D C.* † 2 à 4 f.
— Perfoliata. *L.* == A. umbellata ? *D C.* == A. maculosa. *Lam.* == A. saponaria. *Dill.* == *Aloès hépatique.* † de 1 à 3 f.
— Plicatilis. *L.* == *Aloès évantail.* † *s. ch.* de 1 à 2 f.
— Pulchra. *Hortul.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
— Retusa. *L.* == *Aloès pouce écrasé.* † *s. ch.* de 1 à 2 f.
— Rigida. *D C.* == *Aloès piquant.* † *s. ch.* de 1 à 3 f.
— Rubescens. *D C.* == A. vera. † *s. ch.* de 1 à 3 f.
— Spiralis. *L.* == *Aloès en spirale.* † *s. ch.* de 1 à 2 f.
— Succotrina. *L.* == A. perfoliata, succotrina. *Ait.* == *Aloès succotrin.* † *s. ch.* de 1 à 2 f.
Aloe. Variegata. *L.* == *Aloès Perroquet.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
— Viscosa. *L.* == *Aloès visqueux.* == *A. triangulaire.* † *or.* 1 à 2 f.
— Vulgaris. *Lam.* == A. flava. == A. Barbadensis. *Mill.* == *Aloès commun.* † *s. ch.* de 1 à 2 f.
Amirola nitida. *Pers.* == Lagunœa nitida. *Ruiz et Pav.* † *or.* 3 à 5 f.
Anacamperos telephiastrum. *D C.* == Talinum anacampseros. *id.* == Portulaca anacampseros. *L.* == Rülingia anacampseros. *Ehrh.* † *s. ch.* de 1 à 2 f.
Anagalis fruticosa. *Vent.* == A. grandiflora. *Andrews.* == *Mouron frutescent.* † *s. ch.* de 1 à 3 f.
Anagyris glauca. *Hort. Mass.* == A. indica. *Hort. Tel.* ♉ de 3 à 6 f.
Andropogon citratum. *D C.* == *Barbon odorant.* † *s. ch.* 2 à 3 f.
Anthericum frutescens. *L.* == *Anthéric frutescent.* † *s. ch.* 1 à 2 f.
Anthospermum OEthiopicum. *L.* == Ambraria heisteri. *Fabric.* == *Arbrisseau ambré.* == *Anthosperme d'Ethiopie. or.* 3 à 5 f.
Anthyllis cretica. *Lam.* == Ebenus cretica. *L.* == *Anthyllide de créte.* ♉ de 2 à 3 f.
Antidesma alexiteria. *L. s. ch.* de 5 à 10 f.
Aralia pubescens. *D C.* == *Aralie pubescente. or.* de 3 à 5 f.
Arctotis grandiflora. *Jacq.* == *Arctotis à grandes fleurs.* † *s. ch.* 1 à 3 f.
Aristolochia glauca *Willd.* == A. subglauca. *Lam.* == *Aristoloche glauque.* † *or.* §. de 2 à 3 f.
— Trilobata *L.* == A. trifida *Lam.* == *Aristoloche trilobée.* §. † *or.* de 2 à 4 f.
Artemisia arborescens. *Ait.* == *Armoise arborescente.* == *Absinthe du Portugal.* ♉ † de 1 à 3 f.
— Judaïca *L.* == Semen-contra. *Pharm.* == *Armoise de Judée.* † *or.* de 1 à 2 f.
Asclepias carnosa. *L.* == Hoya carnosa. *Hort. Angl.* == *Asclépiade charnue. s. ch.* † §. de 2 à 6 f.
— Curassavica *L.* == *Asclépiade de Curaçao. or.* de 1 à 3 f.
— Virgata. *Hort. Lugd.* == *Asclépiade effilée. or.* de 2 à 3 f.
Asparagus aphyllus. *L.* == A. phyllacanthus. *Lam.* == *Asperge à feuilles en épines.* ♉ *or.* de 3 à 4 f.
— Sarmentosus *L.* == *Asperge sarmenteuse.* ♉ §. de 3 à 4 f.
Atragene indica. *Desf.* == A. Florida. *Pers.* == Clematis Florida. *Willd.* == *Atragené à grandes fleurs.* §. *or.* de 2 à 4 f.
Atropa arborescens == Cestrum campanulatum. *Lam. or.* de 3 à 5 f.
— Frutescens *L.* == Physalis suberosa ? *Cav.* == *Belle-dame d'Espagne. or.* de 1 à 3 f.
Baccharis dioïca. *Vahl.* == Molina dioïca *Pers.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Nereifolia. *L.* == Conyza nereifolia. *H. P.* == *Bacchante à feuilles de laurose. or.* de 2 à 4 f.
Banksia dentata. — B. procumbens. *Hortul.* == B. repens ? *Hort. Angl.* == Hakea prostrata ? *id.* == Banksia prostrata ? *Forster.* == Pimelia prostrata ? *W.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Premorsa. *Andrews* == *Banksie tronquée.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Serrata. *L. F.* == B. conchifera. *Gært.* † *or.* de 3 à 6 f.
Begonia dichotoma. *Jacq.* == *Bégonne fourchue.* † *s. ch.* de 2 à 4 f.
— Discolor. *Hortul.* == *Bégone à deux couleurs.* † *s. ch.* 3 à 5 f.
— Oblique. *l'Hérit.* == B. nitida. *Pers.* == B. minor. *Jacq.* == B. purpurea. *Swartz.* == *Begone à feuilles luisantes.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
Bignonia grandiflora. *Thumb.* == B. sinensis. *Lam.* == Tecoma sinensis. == *Bignone à grandes fleurs.* §. *or.* de 3 à 4 f.
— Pandorea. *Andrews.* == B. australis. *Brow.* == *Bignone de Norfolck.* §. *or.* de 2 à 3 f.
— Stans. *L.* == Tecoma stans. == *Bignone à feuilles de frêne.* §. *or.* de 5 à 6 f.
Bocconia frutescens. *L.* == *Boccone frutescente. s. ch.* de 2 à 4 f.
Boerhaavia arborescens *Cav.* ♉ de 1 à 2 f.
— Erecta. *L.* == B. diandra. *Brum.* de 1 à 2 f.
— Scandens. *L.* == B. sarmentosa. *Brouw.* de 2 à 3 f.

Bontia daphnoïdes. *L.* == *Daphnot des antilles.* == *Olivier bâtard* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
Bosea yervamora. *L.* == *Bosé à feuilles de lilas.* ♉ de 75 c. à 2 f.
Bromelia ananas. *L.* == B. ovata. *Mill.* == *Ananas couronné.* † *s. ch.* de 2 à 12 f.
b. Viridis. == *Ananas vert.* † *s. ch.* de 4 à 15 f.
Brunia lanuginosa. *L.* == *Brunie à feuilles sétacées.* † *or.* de 2 à 4 f.
Bryonia laciniosa. *L.* == *Bryone laciniée.* §. *s. ch.* de 3 à 5 f.
Bubon roseum. == B. glabrum. *Hortul.* == *Bubon rose.* † *or.* 3 à 4 f.
Budleja salicifolia. *Vahl.* == *Budlèje à feuilles de saule.* † *or.* 1 à 2 f.
— Salvifolia. *Ait.* == Lantana salvifolia. *L.* == *Budlèje à feuilles de sauge.* † ♉ de 1 à 2 f.
Cacalia anteuphorbium. *L.* == *Cacalie à feuilles ovales. s. ch.* 1 à 2 f.
— Articulata. *L.* == C. laciniata. *Jacq.* == C. runcinata. *Lam.* == *Cacalie laciniée. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Ficoïdes. *L.* == *Cacalie ficoïde. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Kleinia. *L.* == C. porophyllum. *Willd.* == *Cacalie à feuilles de laurose. s. ch.* de 1 à 3 f.
Cactus cochenillifer. *Hor. Madr.* = *Cactier à cochenilles. s. ch.* 1 à 2 f.
— Curassavicus. *L.* == *Cactier de Curaçao. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Cylindricus. *L.* == *Cactier cylindrique. s. ch.* de 2 à 3 f.
— Flagelliformis. *L.* == *Cactier queue de souris.* == *C. serpentaire.* == *Discipline de religieuse.* vulg. *or.* de 75 c. à 2 f.
— Grandiflorus. *L.* == *Cactier à grandes fleurs. s. ch.* 2 à 6 f.
— Hexagonus. *L.* == *C. hexagone.* == *C. de surinam. s. ch.* 2 à 3 f.
— Lanuginosus. *L.* == *Cactier lanugineux. s. ch.* de 2 à 3 f.
— Mammillaris. *L.* == *Cactier à mamelons. s. ch.* de 1 à 4 f.
— Opuntia. *D C.* == *Cactier raquette.* == *Figue d'Inde. or.* ♉ 1 à 3 f.
a. Vulgaris. *Mill.* == *C. commun.*
b. Ficus indica. *L.* == *C. à feuilles oblongues.*
c. Tuna. *L.* == *C. tuna.*
d. Inermis. *D C.* == *C. inerme.*
e. Polyanthos. *D C.*
f. Cruciformis. *Malm.*
— Pendulus. *Swartz.* == *Cactier pendant. s. ch.* de 2 à 4 f.
— Pereskia. *L.* == *Cactier à feuilles.* == *Groseillier des Barbades. s. ch.* de 3 à 6 f.
— Peruvianus. *L.* == *Cierge du Pérou.* == *Cierge épineux.* ♉ de 2 à 5 f.
b. Monstrosus. == *Cierge monstrueux.* ♉ *or.* de 2 à 6 f.
— Phyllanthoïdes. *D C.* == C. phyllanthus. *Dum. Cours.* == C. alatus. *Pers.* == *Cactier à feuilles de scolopendre. s. ch.* 2 à 4 f.
— Serpentinus. *Cav.* == C. Brasiliensis ? == *Cactier serpentin. s. ch.* de 1 à 3 f.
— Speciosus. *Cav.* == C. pitayaya ? *s. ch.* de 2 à 6 f.
— Spinosissimus. *Lam.* == *Cactier cruciforme ?* == *Croix de Lorraine. s. ch.* de 2 à 3 f.
— Tetragonus. *L.* == *Cactier tetragone. s. ch.* de 1 à 3 f.
— Triangularis. *Hortul.* == C. compressus. *Mill. s. ch.* de 2 à 5 f.
Cæsalpinia pectinata. *Cav.* = C. Cassioïdes ? *Willd. s. ch.* de 3 à 6 f.
— Sappan ? == *Bresillet des Indes.* == *Bois de sappan. s. ch.* 4 à 6 f.
Cajanus bicolor. *D C.* == Cytisus pseudo-cajan. *Jacq.* == C. cajan. *Lam.* †. de 1 à 3 f.
— Flavus. *D C.* == Cytisus cajan. *L.* == *Pois de Congo.* == *P. d'Angole.* == *P. de Pigeon.* == *Ambrevade.* † *s. ch.* de 1 f. 50 c. à 3 f.
Calendula fruticosa. *L.* == *Souci frutescent.* † §. ♉ de 1 à 3 f.
Calla Æthiopica. *L.* == Arum Æthiopicum. == *Calle d'Ethiopie.* == *Pied de veau d'Afrique.* ♉ de 1 à 2 f.
Callicarpa tomentosa. *L.* == C. lanata. *Valh.* == Tomex tomentosa. *or.* de 3 à 5 f.
Camellia japonica. *L.* == *Camellia du Japon.* == *Rose du Japon. or.* † de 8 à 25 f.
b. Variegata. == *Camellia panaché.* † *or.* de 10 à 25 f.
c. Flore albo pleno. == *Camellia à fl. blanche doubl.* 10 à 25 f.
Capraria biflora *L.* == C. curassavica. *Herm.* == *Thé d'Amérique.* † *or.* de 1 à 3 f.
Capsicum baccatum. *L.* == *Piment à baies. or.* de 1 à 1 f. 50 c.
— Cerasiforme. *Willd.* == *Piment cerise. or.* de 75 c. à 1 f.
— Frutescens. *L.* == *Piment en arbrisseau. or.* de 1 à 2 f.
— Violaceum. *Hort. Madr.* == C. bicolor. *Jacq* == C. nigrum. *Willd. or.* de 1 à 3 f.
Carthamus salicifolius. *L. F.* == Carlowisia salicifolia. *D C.* == *Carthame à feuilles de saule.* † ♉ de 1 à 3 f.
Cassia bicapsularis. *Hortul.* == *Casse bicapsulaire. or.* de 1 à 3 f.
Cassia lævigata. *Willd.* == *s. ch.* de 1 à 3 f.
— Tomentosa. *L.* == C. multiglandulosa. *Jacq.* == *Casse tomenteuse.* † ♉ *or.* de 1 à 2 f.
Casuarina equisetifolia. *L. F.* == *Filao à feuill. de prêle.* †. *or.* 3 à 4 f.
— Torulosa. *Ait.* == *Filao à cordonnet.* † *or.* de 3 à 4 f.
Ceanothus africanus. *L.* == *Céanothe d'Afrique.* † *or.* de 2 à 3 f.
Celastrus lucidus. *Willd.* == Cassine concava. *Lam.* == *Célastre à feuilles luisantes.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Octogonus. *l'Hérit.* = *Célastre à feuilles anguleuses.* † *or.* 3 à 4 f.
Centaurea Ragusina. *L.* == Cyanus Ragusina. *Pers.* == *Centaurée de Raguse.* † ♉ de 50 c. à 1 f. 50 c.
Ceratonia siliqua. *L.* == *Carroubier à siliques.* † ♉ de 2 à 6 f.
Cestrum alaternoïdes. *Desf.* == *Castreau à feuilles d'alaterne. s. ch.* † de 3 à 4 f.
— Diurnum. *L.* == *Galant de jour.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Laurifolium. *l'Hérit.* == C. venetum. *Lam.* = C. macrophyllum ? *id* == *Cestreau à feuilles de laurier.* † *s. ch.* de 3 à 5 f.
— Vespertinum. *l'Hérit.* == C. confertum. *Mill.* == *Galant du soir.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
Cheirostemum platanoïdes. *Humb. et Bompl.* == Cheiranthodendrum. Cervantesii. *Larreat.* de 20 à 50 f.
Chironia baccifera. *L.* == *Chironie baccifère.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Frutescens. *L.* == *Chironie arbrisseau.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Linoïdes. *L.* == *Chironie à feuilles de lin.* † *or.* de 2 à 3 f.
Chrysanthemum frutescens. *L.* == *Chrysanthème frutescente.* † *or.* de 1 à 2 f.
Cineraria amelloïdes. *L.* == *Cineraire à fleurs bleues.* † *or.* 1 à 2 f.
— Cruenta. *l'Hérit.* == C. aurita. *Andrew.* == *Cineraire pourpre. or.* de 2 à 3 f.
Cissampelos pareira. *L.* == *Pareire à feuilles ombiliquées.* de 3 à 4 f.
Cissus acida. *Mill.* == Sicyos trifoliata. == Irsiola triphylla. *Brown.* de 2 à 3 f.
— Antarticus. *Vent.* == Vitis kangaruh. *Hortul.* == *Achit atlantique.* † de 4 à 5 f.
— Sicyoïdes. *Mill.* == Irsiola scandens. *Brown.* == *Achit à larges feuilles.* == *A. à feuilles en cœur.* † de 2 à 4 f.
Citrus aurantium. *L.* == *Oranger.* (*vide pag.* 6) † ♉
b. Cruentum. == Aur. hierocunthicum. *Duh. ed. nov.* == *Orange rouge.* == *O. de Grenade.* == *O. de Malthe.* † ♉ de 3 à 100 f.
c. Bigaradia. == *Oranger bigarrade.* † ♉ de 8 à 25 f.
d. Sinensis. == *Oranger Chinois.* † ♉ de 1 à 15 f.
e. Myrtifolia. == *Chinois-mirthe.* vulg. † ♉ de 1 à 15 f.
— Decumana. *L.* == *Oranger pampelmous.* == *Schaddeck.* 3 à 15 f.
— Histrix. *D C.* == *Oranger hérisson.* † *or.* de 20 à 100 f.
— Medica. *L.* == *Citronnier limonier.* de 1 f. 50 c. à 15 f.
Citharexylum caudatum. == *Cotelet à longues grappes.* de 2 à 3 f.
— Pentandrum. *Vent.* == *Cotelet à cinq etamines.* de 2 à 3 f.
— Quadrangulare. *L.* == *Bois de guitare.* == *Cotelet quadrangulaire.* de 2 à 4 f.
Claytonia portulacaria. == Portulacaria afra. *Jacq.* == *Claytone à feuilles de pourpier.*
Cleome gigantea. *L.* == *Mozambé géante.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
Clerodendrum fortunatum. *L.* == *Péragut à feuilles entières.* † 3 à 5 f.
— Phlomoïdes ? *Vahl.* == C. violaceum. *Cels.* == Volkameria multiflora ? *Burmann.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
— Viscosum. *Vent.* == C. infortunatum. *L.* == *Péragut visqueux.* de 3 à 6 f.
Clethra arborea. *Ait.* == C. maderiensis. *Hortul.* == *Clethra en arbre.* † ♉ *or.* de 3 à 5 f.
Clitoria ternatea. *L.* == *Clitore de ternate.* §. *s. ch.* de 2 à 3 f.
Clutia pulchella. *Willd.* == *Clutelle élégante. or.* de 1 à 2 f.
Cobœa scandens. *Cav.* == *Cobée grimpante.* §. ♉ *or.* de 2 à 3 f.
Coffœa arabica. *L.* == *Caffever de l'Arabie.* † *s. ch.* de 3 à 15 f.
Colutea frutescens. *L.* == *Baguenaudier d'Ethiopie.* † *or.* de 1 à 2 f.
Convolvulus cneorum. *L.* == C. argenteus. *Desrouss* == *Liseron argenté.* † ♉ de 1 à 3 f.
Conyza glutinosa. *L.* == Psiadia glutinosa. *Jacq.* == Erigeron viscosum. *H. P.* † *or.* de 1 à 2 f.
Convolvulus scoparius. *Ait.* == Lignum Rhodium. == *Liseron effilé.* == *Bois de Rhodes.* Brouss. de 2 à 4 f.
Cornutia pyramidata. *L. s. ch.* de 3 à 6 f.
Correa alba. *Smith.* == *Correa blanc.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Viridiflora. *Andr.* == Mazeutoxeron. *Labill.* == *Correa à fleurs vertes.* † *or.* de 3 à 5 f.

Cotyledon coccinea. *Cav.* == *Cotylet écarlate.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Hemisphœrica. *L.* == *Cotylet hemisphérique.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Orbiculata. *L.* == *Cotylet orbiculé.* † *or.* de 1 à 2 f.
Crassula cordata. *L. F.* == *Crassule en cœur. s. ch.* 1 f.
— Cotyledon. *Jacq.* == C. arborescens. *Pers.* == *Crassule à feuilles rondes.* §. † de 1 à 2 f.
— Cultrata. == *Crassule à feuilles tranchantes. s.* † de 1 à 2 f.
— Imbricata. *Ait.* == C. lycopodioïdes. *Lam.* == C. muscosa. *Thunb.* == *Crassule imbriquée.* §. † de 1 à 2 f.
— Lactea. *Ait.* == *Crassule à fleurs blanches. s.* † de 1 à 2 f.
— Pellucida. *Thunb.* == *Crassule transparente. s.* † de 1 à 2 f.
— Perfilata. *Pers.* == C. perfossa. *Lam.* == C. punctata. *L.* == *Crassule enfilée.* == *Brochette.* vulg. *s.* † de 1 à 3 f.
— Perfoliata. *L.* == *Crassule perfoliée. s.* † de 1 à 2 f.
— portulacea. *Lam.* == C. obliqua. *Ait.* == *Crassule portulacée.* §. † de 1 à 2 f.
— Spathulata. *Ait.* == C. lucida. *Lam.* == *Crassule spatulée.* §. † de 1 à 2 f.
— Tetragona. *L.* == *Crassule tétragone. s.* † de 1 à 2 f.
Cratægus glabra. *Thunb.* == *Alisier toujours vert.* † ♉ de 5 à 10 f.
Curcuma longa. *L.* == *Curcuma long. s. ch.* de 6 à 8 f.
Cycas revoluta. *Willd.* == *Cycas du Japon.* † *s. ch.* de 10 à 15 f.
Cyperus papyrus. *L.* == *Souchet à papier.* ♉ de 2 à 4 f.
Cytisus albidus. *D C.* == *Cytise blanc. or.* de 3 à 6 f.
Daphne odora. *l'Hérit.* == D. sinensis. == D. Indica. *L.* == *Lauréole de la Chine.* == *Daphné odorant.* † *or.* de 2 à 7 f.
b. Marginata. † *or.* de 2 à 4 f.
— Oleoïdes. *Smith.* == D. salicifolia. *Lam.* == *Lauréole à feuilles d'olivier.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Pontica. *L.* == *Lauréole du levant.* † ♉ *or.* de 3 à 5 f.
Datura arborea. *L.* == Brugmansia candida. *Pers.* == *Stramoine en arbre.* ♉ *or.* de 1 à 3 f.
— Sarmentosa. *Lam.* == Solandra grandiflora. *Swartz.* == *Stramoine sarmenteuse. or.* de 3 à 6 f.
Desmochœta flavescens. *D C.* == Achyranthes styracifolia. *Lam.* == A. lappacea. *L.* == A. echinata. *Retz.* == A. patula. *L. F.* *or.* de 1 à 3 f.
Diosma ciliata. *L.* == *Diosme ciliée.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Cupressina. *Thunb.* == D. dichotoma. *Berg.* == Brunia uniflora. *Lin.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Ericoïdes. *L.* == D. rubra? == *Diosme odorante.* † *or.* 2 à 4 f.
— Filiformis == D. scoparia. == *Diosme à balais.* == *D. filiforme.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Imbricata. *L.* == *Diosme imbriqué.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Purpurea. *Hortul.* == D. hirta. *Lam.* == *Diosme velu.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Uniflora. *Thunb.* == D. decussata. *Dum. Cours.* == Hartogia uniflora. *Berg.* † *or.* de 3 à 5 f.
Dodonœa angustifolia. *L. F.* == *Dodonée à feuilles étroites.* §. 2 à 3.
— Triquetra. *Wendl.* == *Dodonée triangulaire.* §. de 2 à 4 f.
— Viscosa. *L.* == Ptelea viscosa. *Mill.* == Cariophyllaster littoreus. *Rumph.* == Carpinus viscosa? *Burm.* == *Dodonée visqueuse.* ♉ *or.* de 2 à 3 f.
Dolichos lignosus. *L.* == *Dolic ligneux. or.* de 2 à 3 f.
Dombeya ferruginea. *Lam. s. ch.* de 5 à 10 f.
Dracœna terminalis. *L.* == D. ferrea? *id.* == aletris chinensis. *Lam.* == *Dracèna de la Chine.* † *s. ch.* de 10 à 14 f.
Duranta ellisii. *L.* == *Durante à feuilles lanceolées. or.* de 3 à 4 f.
— Plumierii. *L.* == *Durante à feuilles ovales. or.* de 2 à 3 f.
a. Spinosa. Var. *épineuse. or.* de 2 à 3 f.
b. Inermis. Var. *sans épines. or.* de 2 à 4 f.
c. Microphylla. *H. P.* Var. *à petites feuilles. or.* de 2 à 4 f.
Echium bifrons. *D C.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Candicans. *Ait.* == *Vipérine blanchâtre.* † ♉ *or.* de 1 à 3 f.
— Giganteum. *L. F.* == *Vipérine gigantesque.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Simplex. *DC.* == *Vipérine pyramidale.* † *or.* de 1 à 4 f.
— Virescens. *DC.* == E. candicans. *Jacq.* † *or.* de 2 à 3 f.
Embotrium salicifolium. *Vent.* == Hakea saligna. *Dum. Cours.* == *Embotrium à feuilles de saule.* † ♉ *or.* de 4 à 8 f.
Eranthemum salsoloïdes. *L. F.* † *or.* de 2 à 3 f.
Erica abietina. *L.* == E. frondosa. *Salisb.* == E. coccinea. *Wendl.* E. archeria. *Andrews.* == *Bruyère à feuilles de sapin.* == *B. feuillée.* Dum. Cours. §. † de 2 à 3 f.
— Baccans. *L.* == E. bacciformis. *Salisb.* == *Bruyère bacciforme.* §. † de 2 à 3 f.
Erica Bullaris. *Salisb.* == E. granulata. *L.* == E. pilulifera. == E. multumbellifera. *Berg.* == *Bruyère à bulles. s.* † de 2 à 4 f.
— Caffra. *L.* == E. lamellaris. *Salisb.* == E. corifolia. == E. Aggregata? *Hortul.* == *Bruyère lamellée. s.* † de 2 à 4 f.
— Conspicua. *Willd.* == *Bruyère remarquable. s.* † de 2 à 4 f.
— Ignescens. *Andrews.* == E. cuspidigera. *Salisb.* == *Bruyère porte-dard.* † *s.* de 2 à 4 f.
— Laniflora. *Wendl.* == E. sordida. *Andrews.* == E. floccosa. *Salisb.* == E. procera? *Willd.* == *Bruyère laineuse.* † *s.* de 4 à 6 f.
— Lentiformis. *Salisb.* == E. umbellata. *L.* == *Bruyère lentiforme.* † *s.* de 3 à 5 f.
— Pendula. *Willd.* == E. cupressina. *Hortul.* == Erica turrigera. *Salisb.* == *Bruyère turrigére.* † *s* de 3 à 6 f.
— Pilulifera. *L.* == E. nudicaulis. *Berg.* == E. piluliformis. *Salisb.* == *Bruyère piluliforme.* † *s.* de 2 à 4 f.
— Pubescens. *L.* == E. p. pilosa. *Thunb.* == E. pallida. *Salisb.* == *Bruyère pâle.* † *s.* de 2 à 4 f.
— Polytrichifolia. *Salisb.* == *Bruyère à feuilles de polytric.* † *s.* de 4 à 6 f.
— Urceolaris. *Salisb.* == E. dura. *Soland.* == E. hirta. *Thunb.* == *Bruyère urceolée.* † *s.* de 3 à 5 f.
— Virgularis. *Sal.* == *Bruyère effilée.* † *s.* de 2 à 4 f.
Eriocephalus africanus. *L.* == *Eriocephale à corymbes.* † *or.* 1 à 3 f.
Erythrina corallodendrum. *L.* == E. spinosa. *Mill.* == *Erythrine des Antilles.* == *Bois immortel.* == *Arbre du corail. s. ch.* de 6 à 12 f.
Eucalyptus capitellata? *Smith.* † ♉ de 4 à 10 f.
— Robusta. *Smith.* == *Eucalyptus gigantesque.* † *or.* de 5 à 12 f.
Eugenia jambos. *L.* *Jambosier à larges feuilles.* == *Pomme rose.* † *s. ch.* de 4 à 8 f.
— Uniflora *Willd.* == E. michelii. *Lam.* == E. umbellata. *Hort. Angl.* == Myrtus Brasiliana. == Plinia rubra. *Mant.* == P. pendunculata. *L.* == *Jambosier uniflore.* † *s. ch.* de 5 à 8 f.
Euphorbia antiquorum. *L.* == *Euphorbe des anciens.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Atropurpurea. *Brouss.* == *Euphorbe à fleurs pourpres.* † *or.* 3 à 5 f.
— Canariensis. *L.* == *Euphorbe des Canaries.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Caput-medusœ. *L.* == *Euphorbe tête de Méduse. or.* de 1 à 2 f.
— Clava. *Ait.* == E. canaliculata. *Lam.* == *Euphorbe en massue.*
— Loricata. *L.* == E. histrix. *Jacq.* == *Euphorbe cuirassée. or.* de 2 à 4 f.
— Neriifolia. *L.* == *Euphorbe à feuilles de laurose. or.* 2 à 3 f.
— Officinarum. *L.* == *Euphorbe officinale. or.* de 2 à 4 f.
— Tirucalli. *L.* == *Effilée. or.* de 1 à 3 f.
— Tridentata. *Lam.* == E. anacantha. *Ait.* == *Euphorbe à trois dents. or.* de 1 à 2 f.
Fabricia lœvigata. *Smith.* == *Fabricia glabre.* † *or.* de 3 à 5 f.
Ficus Benghalensis. *L.* == *Figuier du Bengale.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
— Benjamina *L.* == F. microcarpa. *L. F.* == *Figuier benjamin.* † *s. ch.* de 2 à 4 f.
— Populifolia. *Desf.* == *Figuier à feuilles de peuplier.* † *s. ch.* de 3 à 5 f.
— Racemosa. *L.* == *Figuier à grappes.* † *s. ch.* de 5 à 8 f.
— Religiosa. *L.* == *Figuier des pagodes.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
— Rubiginosa, *Desf.* == F. australis. *Willd.* == F. novœ Walliœ == F. botany-bay. *Hort. Lond.* † *s. ch.* de 2 à 4 f.
— Stipulata. *Ait.* == *Figuier rampant.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
Fischeria scandens. *D C. An* Gonolobium? *Mich. s. ch.* 3 à 4 f.
Franseria ambrosioïdes. *Cav.* == Xanthium fruticosum. *L. F.* == Ambrosia arborescens. *Lam.* = *Franseria en arbre. or.* 2 à 3 f.
Fuchsia coccinea. *Ait.* == F. Magellanica. *Lam.* == F. triphylla. *L.* == *Fuchsie écarlate.* † ♉ de 1 à 4 f.
Garcinia mangoustana. *L.* == *Mangoustan cultivé.* † *s. ch.* 80 à 100 f.
Gardenia florida. *L.* == Jasminum capense. *Mill.* == *Gardenie à larges fleurs.* † *s. ch.* de 2 à 4 f.
b. Flore pleno. Var. *à fleurs doubles.* † *s. ch.* de 2 à 5 f.
c. Multiflora. Var. *Multiflore.* † *s. ch.* de 3 à 5 f.
— Radicans. *Thumb.* == *Gardène rampante.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
Geranium acetosum. L. (Pelargonium. *Willd.*) *Geranion acide.* † 1 à 2 f.
== Alchemilloïdes. *L.* == *G. pied de Lion.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Anemonœfolium. *l'Hérit.* == G. palmatum. *Cav.* == G. rutilans. *Ehrh.* ♉ *or.* de 1 à 3 f.
— Bicolor. == *G. bicolore.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Capitatum. *L.* == *G. à odeur de rose.* † *or.* de 1 à 3 f.

Geranium Cordifolium. *Cav.* = G. cordatum. *Ait.* = *G. feuilles en cœur.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Crispum. *L.* = G. hermanniæfolium. *Cav.* = G. citriodorum? *Cav.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Cucullatum. *L.* = *G. en entonnoir.* † *or.* ♉ de 2 à 3 f.
— Echinatum. *Curt.* = G. hamatum. *Jacq.* = *G. à crochets.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Elegans. *Andrews.* = *G. élégant.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Exstipulatum. *Cav.* = G. suave. *Hort. Angl.* = *G. sans stipules.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Fragrans. *Hort. Angl.* = G. africanum. *Cav.* = *G. d'Afrique.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Fulgidum. *L.* = *G. éclatant.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Gibbosum. *L.* = *G. goutteux.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Glutinosum. *l'Hérit.* = G. cratægifolium. *Roth.* = G. viscosum. *Cav.* = *G. glutineux.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Hybridum. *L.* = G. roseum. *Ehrh.* = G. igneum. *Hortul.* = *Géranion hybride.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Inquinans. *L.* = *G. tachant.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Marginatum. *Cav.* = *G. bordé.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Odoratissimum. *L.* = *G. très odorant.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Papilionaceum. *L.* = *G. papillonacé.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Peltatum. *L.* = *G. ombiliqué.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Quercifolium. *L.* = *G. à feuilles de chêne.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Radula. *Cav.* = G. revolutum. *Jacq.* † *or.* de 1 à 2 f.
 b. Rosea. † *or.* de 1 à 3 f.
— Terebinthinaceum. *Cav.* = G. graveolens. *l'Hérit.* † *or.* 1 à 2 f.
— Tetragonum. *l'Hérit.* = *G. tetragone.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Tomentosum. *Jacq.* = G. fragrans. *Hort. Angl.* † *or.* 1 à 3 f.
— Tricolor. *Curtis.* = G. violarum. *Jacq.* = *G. tricolore.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Vitifolium. *L.* = *G. à odeur de mélisse.* † ♉ *or.* de 1 à 2 f.
— Zonale. *L.* = *G. à zones.* † *or.* de 1 à 2 f.
 b. Sanguineum. Var. { *à fleurs sanguines.* † *or.* 1 à 2 f.
 c. Variegatum. Var. { *à feuilles panachées.* † *or* 1 à 2 f.
Glycine cariboea. *Jacq.* = *Glycine rampante.* §. *or.* de 1 à 5 f.
— Rubicunda. *Willd.* = Kenedia rubicunda. *Vent.* = *Glycine rouge.* §. *or.* de 3 à 5 f.
Gnaphalium orientale. *L.* = *Immortelle jaune.* † *or.* de 75 c. à 3 f.
Gnidia simplex. *L.* = G. viridis. *Berg.* = Nectandra. *Juss.* = *Gnidienne à feuilles de lin.* † *or.* de 2 à 3 f.
Gorteria ringens *L.* = *Gortérie à grandes fleurs.* *or.* de 1 à 3 f.
Gossypium arboreum. *L.* = *Cotonnier de Fernambouc.* † *or.* 2 à 3 f.
Gouania integrifolia. *Lam.* = *Gouane à feuill. entières.* *s. ch.* 3 à 5 f.
Grewia flava. *DC.* = *Greuvier à fleurs jaunes.* ♉ de 3 à 4 f.
Hakea dactyloïdes. *Cav.* = H. obliqua. *Hort. Angl.* = Conchium dactyloïdes. *Smith.* = Banksia dactyloïdes. *Gært.* = B. gibbosa? *White.* † *or.* de 4 à 10 f.
— Pugioniformis. *Cav.* = H. glabra. *Sert. Hannov.* = Conchium. *Smith.* † *or.* de 4 à 10 f.
Halleria lucida. *L.* = *Hallerie luisante.* *or.* de 2 à 3 f.
Haloragis cercodia. *Ait.* = H. tetragonia. *l'Hérit.* = H. alata. *Jacq.* = Cercodia erecta. *Murray.* = Tetragonia ivœfolia. *L.* = *Cercodée droite.* † ♉ de 1 . 3 f.
Hedysarum. paniculatum *L.* = *Sainfoin paniculé.* *or.* ♉ de 1 à 3 f.
Heliotropium grandiflorum. *Hort. Angl.* = *Héliotrope à grandes fleurs.* de 2 à 4 f.
— Peruvianum. *L.* = *Héliotrope à odeur de vanille.* = *H. du Pérou.* de 1 à 3 f.
Hermannia hyssoppifolia. *L.* = *Hermane à feuilles d'hysope.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Repens. *N.* = H. species-nova? *Hort. Monsp.* = *Hermanne rampante.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Scabra. *Willd.* = *Hermanne rude.* † *or.* de 1 à 3 f.
Hibiscus diversifolius. *Jacq.* = H. ficulneus? *Cav.* † *s. ch.* 2 à 4 f.
— Manihot. *L.* = *Ketmie à feuilles de manihot.* *or.* de 2 à 3 f.
— Præmorsus. = Pavonia cuneifolia. *Cav.* = P. præmorsa. *Willd.* *or.* de 1 à 2 f.
— Rosa-sinensis. *L.* = *Ketmie rose de la Chine.* *s. ch.*
 a. Flore simplici. Var. { *à fleurs simples.* 2 à 3 f.
 b. Flore pleno purp. Var. { *à fl. doubl. pourp.* 3 à 6 f.
 c. Flore pleno flavesc. Var. { *à fleurs jaunâtres.* 3 à 8 f.
— Spinifex. *L.* = Pavonia spinifex. *Cav.* *or.* de 1 à 2 f.
Houstonia coccinea. *Andrews.* = Ixora americana. *Jacq.* = Bouvardia triphylla? *Ait.* = *Salisb.* = *Houstonia écarlate.* *s. ch.*

Hypericum sinense. *L.* = H. monogynum. = *Mille pertuis de la Chine.* † *or.* de 2 à 3 f.
Illicium floridanum. *L.* = *Badiane de la floride* † *or.* de 3 à 8 f.
— Parviflorum. *Mich.* = I. anisatum. *Bartrams.* = *Badiane à petites fleurs.* † *or.* de 3 à 8 f.
Indigofera argentea. *L.* = *Indigot argenté.* *s ch.* de 2 à 4 f.
Ixora coccinea. *L.* = I. ternifolia. *Cav.* = Cerasus pavonina? *or.* 2 à 4 f.
Jasminum azoricum. *L.* = *Jasmin des açores.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Geniculatum. *Vent.* = *Jasmin genouillé.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Glaucum. *Thunb.* = J. ligustrifolium. *Lam.* = Nyctanthes glauca. *L. sup.* † *s. or.*
— Grandiflorum. *L.* = *Jasmin d'Espagne.* † ♉ *or.* 50 c. 2 f. 50 c.
— Multiflorum. *Hort. Angl.* = J. pubescens. *Willd.* = Mogorium multiflorum. *Lam.* = *Jasmin multiflore.* *s. ch.* 6 à 12 f.
— odoratissimum. *L.* = *Jasmin jonquille.* de 1 à 2 f. 50 c.
— Sambac. *L.* = Nyctanthes sambac. = Jasminum arabicum. *Rumph.* = *Jasmin d'Arabie.* *or.* de 50 c. à 2 f.
 b. Flor. multiplic. *Ait.* = *Jasmin d'Arabie à fleurs doubles.* *or.* de 2 à 3 f.
 c. Flor. plenis. *Ait.* = Nyctanthes etrusca. = *Jasmin du grand Duc.* = *J. de Toscane.* *or.* de 4 à 6 f.
Jatropha curcas. *L.* = Castiglionia lobata. *Ruiz et Pav.* = *Médecinier Cathartique.* *s. ch.* de 5 à 8 f.
Justicia adhatoda. *L.* = *Carmentine.* = *Noyer de ceylan.* ♉ *or.* de 2 à 3 f.
— Ecbolium. *Vahl.* = *Carmentine à crochet.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
— Formosa. *Willd.* — *Carmentine élégante.* *s. ch.* de 3 à 4 f.
— Hyssopifolia. *L.* = *Carmentine à feuill. d'hysope.* † *or.* 2 à 4 f.
— Nasuta. *Hortul.* = *Carmentine tubuleuse.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Oxyphilla. *Hortul.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
Kalanchoë OEgyptiaca. *DC.* = Cotyledon nudicaulis. *Murr.* = C. OEgyptiaca. *Lam.* = *Cotylet d'Egypte* † *or.* de 1 à 3 f.
Kiggelaria africana. *L.* = *Kiggellaire d'Afrique.* de 2 à 4 f.
Lantana aculeata. *L.* = *camara piquant.* *or.* de 1 à 3 f.
— Camara. *L.* = *Camara à fleurs variées.* *or.* de 2 à 3 f.
— Nivea. *Vent.* = *Camara à fleurs blanches.* *or.* de 2 à 4 f.
Laurus camphora. *L.* = *Laurier camphrier.* † *or.* de 8 à 15 f.
— Fœtens. *Ait.* = L. maderiensis. *Lam.* = *Laurier de madère.* † *or.* de 4 à 8 f.
— Glauca. *Thunb.* = *Laurier glauque.* † *or* de 5 à 8 f.
— Indica. *L.* = *Laurier des Indes.* = *L. Royal.* † *or.* 3 à 10 f.
Lavatera acerifolia. *Brouss.* = *Lavatère à feuilles d'érable.* † ♉ *or.* de 1 à 3 f.
Leptospermum acuminatum. *F. B.* = *Leptosperme cotonneux.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Juniperinum. *Smith.* = Melaleuca tenuifolia. *Wendl.* † *or.*
— Lanigerum. *Smith.* = L. tomentosum. *Hort.* = Philadelphus laniger. *Ait.* † *or.* de 2 à 4 f.
 b. Pubescens. *Willd.* † *or.* de 2 à 4 f.
 c. Rubicaule. † *or.* de 2 à 4 f.
— Scoparium. *Smith.* = Squarrosum. *Gært.* = Melaleuca scoparia. *Forst.* = Philadelphus scoparius. *Ait.* = P. floribundus. *Usteri.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Thea. *Willd.* = L. flavescens. *Smith.* = *Leptosperme thé.* † *or.* de 2 à 4 f.
Lespedeza fruticosa. *Pers.* = Hedysarum frutescens. *L.* = Medicago virginica. ♈ de 1 à 3 f.
Linum trigynum. *Hortul.* = *Lin à trois styles.* = *L. de la Chine.* *or.* de 2 à 4 f.
Lomandra longifolia. *Labill.* *or.* de 2 à 3 f.
Lonicera japonica. *Thunb.* = *Chevre-feuille du japon.* † §. *or.* de 2 f. 50 c. à 4 f.
Lopezia miniata. *DC.* † *or.* de 2 à 3 f.
Lotus jacobœus. *L.* = *Lotier de St. Jacques.* † *or.* de 1 à 2 f.
Loureira cuneifolia. *Cav.* = Monzinna spathulata. *Orteg.* *or.* 5 à 8 f.
Mahernia incisa. *Jacq.* = Hermannia incisa? *Willd.* † *or.* 2 à 3 f.
Malpighia glabra. *L.* = *Malpighie glabre.* = *Cerisier des antilles.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
— Macrophylla. *Desf.* = *Malp. à larg. feuill.* † *s. ch.* 10 à 15 f.
Malva abutiloïdes. *L.* = *Mauve abutiloïde.* † de 1 à 2 f.
— Miniata. *H. P.* = M. coccinea. *Ait.* = *Mauve écarlate.* ♉ *or.* de 2 à 3 f.
— Umbellata. *Cav.* = *Mauve ombellée.* *or.* de 1 f. 50 c. à 3 f.
Melaleuca armillaris. *Smith.* = M. ericœfolia. *Vent.* † *or.* 3 à 4 f.
— Citrina. *Hortul.* = M. alba? † *or.* de 3 à 4 f.

Melaleuca diosmæfolia. *F. B.* == *Melaleuque à feuilles de diosma.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Ericæfolia. *Smith.* == *M. à feuilles de bruyère.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Hypericifolia. *Smith.* == Metrosideros myrtifolia. *Hortul.* == *Mel. à feuilles de mille pertuis.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Styphelioïdes. *Smith.* == M. obliqua. == *Mel. à feuilles contournées.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Thymifolia. *Smith.* == M. gnidiœfolia. *Vent.* == M. coronata. *Andrews.* == Metrosideros calycina. *Cav.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Trinervia? *Hort. Angl.* † *or.* de 4 à 8 f.
Melissa fruticosa. *Hort.* == *Melisse frutescente.* † *or.* 1 f. 50 c. à 2 f.
Mentzelia aspera. *Cav.* == M. hispida. *Willd.* == *Mentzelie rude.* *or.* de 2 à 4 f.
Mesembrianthemum. acinaciforme. *L.* == *Ficoïde à feuill. en sabre.* *or.* de 50 c. à 2 f.
— Barbatum. *L.* == *Ficoïde barbu. or.* de 50 c. à 2 f.
— Calamiforme. *L.* == *Ficoïde calamiforme. or.* de 1 à 3 f.
— Cordifolium. *L.* == *Ficoïde à feuilles en cœur. or.* 50 c. à 1 f.
— Deltoïdes. *L.* == *Ficoïde deltoïde. or.* de 50 c. à 2 f.
— Dolabriforme. *L.* == *Ficoïde en doloire. or.* de 50 c. à 2 f.
— Echinatum. *Ait.* == *Ficoïde hérissé. or.* de 50 c. à 2 f.
Mesembrianthemum linguiforme. *L.* == *Ficoïde linguiforme. or.* de 50 c. à 1 f. 50 c.

b. Obliquum. *Haw.* Var. *à feuill. étroites. or.* 50 c. à 1 f. 50 c.
c. Latum. *Haw.* Var. *à feuilles larges. or.* de 1 à 2 f.
d. Scalpratum. Var. *à angles tranchants. or.* 50 c. à 1 f. 50 c.

— Noctiflorum. *L.* — M. stramineum. *Haworth.* == *Ficoïde noctiflore. or.* de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Runcinatum. *Hort. or.* de 50 c à 1 f. 50 c.
— Spinosum. *L.* == *Ficoïde épinenx. or.* de 1 à 2 f.
— Tenuifolium. *L.* == *Ficoïde à feuill. menue. or.* de 50 c. à 2 f.
— Uncinatum. *L. or.* de 50 c. à 1 f. 50 c.
Messerschmidia fruticosa. *L.* == *Arguse frutescente. or.* 1 à 3 f.
Metrosideros acuminata? *Dum. Cours.* == M. scabra. *Hortul.* † *or.* de 2 à 5 f.
— Angustifolia? *Smith.* == Myrtus angustifolia. *L.* == *Met. à feuilles étroites.* † *or.* de 2 à 5 f.
— Lanceolata. *Smith.* == M. citrina. *Curtis.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Laurifolia. *Hort.* == M. floribunda. *Smith.* == M. connata? *Desf.* == *M. multiflore.* == *M. à feuilles de laurier.* † *or.* de 4 à 8 f.
— Linearis. *Smith.* == *Met. à feuilles linéaires.* † *or.* de 2 à 5 f.
— Lophantha. *Vent.* == *Met. à panaches.* † *or.* de 1 à 5 f.
b Angustifolia. † *or.* de 2 à 5 f.
c. Crassifolia. *Hort. Angl.* † *or.* de 2 à 5 f.
— Marginata. *Cav.* == M. latifolia. *Hortul.* == *Met. bordé.* † *or.* de 5 à 8 f.
— Myrtifolia. *Hort.* == M. ciliata? *Smith.* == M. buxifolia. *Dum. Cours.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Saligna. *Smith.* == *Met. à feuilles de saule.* † *or.* de 2 à 5 f.
— Viminalis? == M. lucida. *N. An.* Melaleuca trinervia? † *or.* de 3 à 10 f.
Mimosa asperata. *L.* == M. pigra. *Lam.* == M. irritabilis. *Dum. Cours. s. ch.* de 3 à 5 f.
— Pudica. *L.* == *Mimeuse pudique.* == *Sensitive commune. s. ch.* de 1 à 3 f.
— Sensitiva. *L.* == *Sensitive grimpante. s. ch.* de 4 à 8 f.
Mimulus glutinosus. *Willd.* == M. aurantiacus. *Curtis.* == *Mimule glutineuse.* == *M. orangée.* † ♉ *or.* de 2 à 3 f.
— Guttatus. *D C.* == *Mimule ponctuée.* ♉ *or.* de 2 à 3 f.
Murraya exotica. *L.* == Chalcas paniculata? *Mant.* == C. cammubenh? *Burm.* == Marsana buxifolia. *Sonnerat.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
Myrica banksiæfolia. *Vendl.* == M. serrata. *Lam.* == *Galet à feuill. dentées.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Cordifolia. *L.* == *Galet à feuilles en cœur.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Laciniata. *Wendl.* == *Galet à feuilles découpées.* † *or.* 2 à 4 f.
— Quercifolia. *L.* == *Galet à feuilles de chêne.* † *or.* de 3 à 4 f.
Myrtus com. et variet. (*vide* pag. 19.)
— Pimenta. *L.* == M. citrifolia. *Poir.* == Caryophyllus pimenta. *Mill.* == *Mirthe piment.* == *M. toute épice.* == *Piment de la Jamaïque.* † *s. ch.* de 10 à 30 f.
Nerium dubium. *Balbis.* == N. flavescens. *Spin.* == N. luteum. *Targ.* == *Laurier rose jaune.* † *or.* de 2 à 4 f.

Nerium odorum. *Willd.* == *Laurier rose odorant à fleurs doubles.* † *or.* de 1 à 3 f.
Nissolia fruticosa. *Jacq.* == *Nissole frutiqueuse.* §. *or. s. ch.* 3 à 4 f.
Ocymum gratissimum. *L.* == O. zeylanicum. *Burm.* == *Basilic de Ceylan.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
Œdera prolifera. *Thunb.* == Buphthalmum capense. *L* == *Œdère prolifère.* † *or.* de 2 à 4 f.
Olea americana. *L.* == *Olivier d'Amérique. or.* de 3 à 6 f.
— Capensis. *L.* == O. coriacea. *Ait.* == *Olivier du Cap.* † *or.* de 4 à 8 f.
— Fragrans. *Thunb.* == Osmanthus fragrans. *Loureiro.* == *Olivier odorant.* † *or.* de 3 à 5 f.
Origanum dictamus. *L.* == *Dictame de crète.* † *or.*, de 1 à 2 f.
Orontium japonicum. *L.* == *Oronce du Japon. s.* de 2 à 3 f.
Osteospermum moniliferum. *L.* == *Ostéosperme - Porte-collier.* † *or.* de 2 à 3 f.
Pœonia moutan. *Bompl.* == P. arborea. *Hort. Cantabrig.* == P. suffruticosa. == P. papaveracea. *Andrews.* == *Pivoine moutan.* == *Pivoine en arbre. or.* de 20 à 45 f.
Pallasia grandiflora. *Willd.* == Encelia hallmifolia. *Cav.* † *s. ch.* de 3 à 5 f.
Panax aculeatum. *l'Hérit.* == Zanthoxylum trifoliatum. *L.* == *Ginseng à aiguillons.* † *or.* de 2 à 3 f.
Parkinsonia aculeata. *L. s.* de 4 à 10 f.
Passerina filiformis. *L.* † *or.* de 2 à 4 f.
Passiflora alata. *Ait.* == *Grenadille ailée.* † §. *s. ch.* de 3 à 8 f.
— Angustifolia? *Swartz.* == P. heterophylla. *Jacq.* == P longifolia. *Lam.* §. *s. ch.* de 2 à 4 f.
— Holosericea. *L.* == *Grenadille soyeuse.* §. † *s. ch.* de 3 à 6 f.
— Murucuja. *L.* == P. plicata? == P. lunata. *Biroli.* de 3 à 5 f.
— Laurifolia. *Willd.* == *Grenadille à feuilles de laurier.* 5 à 8 f.
— Suberosa. *Cav.* == *Grenadille à écorce subéreuse.* de 2 à 3 f.
Pelargonium. (*vide* Geranium.)
Petiveria alliacea. *L.* == *Pétivier à odeur d'ail.* † *s.* de 3 à 4 f.
Phaseolus caracalla. *L.* == *Haricot à grandes fleurs.* == *Caracolle.* §. ♉ *or.* de 1 à 6 f.
Phœnix dactylifera. *L.* == P. excelsior. *Cav.* == *Dattier commun.* == *Palmier.* † ♉ *or.* de 1 à 10 f.
Phylica buxifolia. *L.* == P. ledifolia? *Hort. Monsp.* == *Philice à feuilles de buis.* † *or.* de 3 à 4 f.
b. Cordifolia? † *or.* de 3 à 4 f.
— Cylindrica. *Pers.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Ericoïdes. *L.* == *Phylice à feuilles de bruyère.* == *Bruyère du Cap.* vulg. † *or.* de 1 à 3 f.
b. Acerosa. *F. B.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Nitida. *Lam.* == P. eriophoros. *Ait.* == P. horizontalis. *Hortul.* == *Phylice luisante.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Plumosa. == *Phylice plumeuse.* † *or.* de 3 à 5 f.
— Rosmarinifolia. *Hortul.* == *Phylice à feuilles de romarin.* † *or.* de 3 à 4 f.
— Spicata. *L.* == *Phylice en épi.* † *or.* de 2 à 4 f.
Phyllis nobla. *L.* == *Phyllis des Canaries.* † *s.* de 1 à 3 f.
Physalis somnifera. *L. or.* de 1 à 3 f.
Piper blandum. *L.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
— Magnoliœfolium. *Jacq.* == *Poivre à feuilles de magnolier.* † *s. ch.* de 2 à 3 f.
— Medium. *L. s. ch.* de 4 à 6 f.
— Nigrum. *L.* == P. aromaticum. *Lam.* == *Poivre aromatique.* *s. ch.* de 5 à 8 f.
— Obtusifolium. *Willd.* † de 2 à 3 f.
Piscidia punicea. *Cav.* == Œschinomene miniata. *Orteg.* == *Piscidie écarlate.*
Pittosporum undulatum. *Vent.* † de 3 à 5 f.
Plectranthus fruticosus. *l'Hérit.* == Germanea urticœfolia. *Lam.* † *s.* de 1 à 2 f.
Plumbago rosea. *L.* == *Dentelaire à fleurs roses. s. ch.* de 3 à 4 f.
— Scandens. *L.* == *Dentelaire sarmenteuse. or.* de 1 à 3 f.
b. Zeylanica. == *Dentelaire de Ceylan. or.* de 1 à 3 f.
Plumeria alba. *L.* == *Franchipanier à fleurs blanches. s. ch.* 10 à 20 f.
Podalyria aurea. *Willd.* == Sophora aurea. *Ait.* == Virgilia. *Lam.* == Robinia subdecandra. *l'Hérit. or.* de 3 à 6 f.
Poterium caudatum. *Ait.* == *Pimprenelle en arbre. or.* de 3 à 5 f.
Protœa caudata? *Thunb.* == P. hirta. *Hortul.* == *Protée à queue.* † *or.* de 10 à 12 f.
— Cinerea. *Ait.* == P. prostrata. *Thunb.* † *or.* de 3 à 6 f.

Protea cinerea Hirta. == *Protée velu.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Conifera. *Thumb.* == *Protée conifère* † *or.* de 5 à 6 f.
— Divaricata? *Hortul.* † *or.* de 4 à 6 f.
— Imbricata. *Thumb.* == *Protée imbriqué.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Pallens. *Thumb.* == P. glauca. *Hortul.* == P. conifera mas. == *Protée pâle.* † *or.* de 3 à 6 f.
— Pinifolia? *Thumb.* == *Protée à feuilles de pin.* † *or.*
— Saligna. *L.* == *Protée à feuilles de saule.* † *or.* de 4 à 6 f.
Psidium montanum. *Swartz.* == P. aromaticum. *Vitmann.* == *Goyavier de montagne. s. ch.* de 4 à 6 f.
— Pyriferum. *L.* == Guaiava pyriformis. *Gært.* == *Goyavier commun. or.* de 3 à 5 f.
Psoralea bracteata. *L.* == P. cuneifolia. *Dum. Cours.* == Ononis trifoliata? == Trifolium fruticans? *L.* == *Psoralée à épis ovales* † *or* de 2 à 3 f.
Rauwolfia glabra. *Cav.* == Vallesia cymbæfolia. *Orteg.* † *or.* 3 à 6 f.
— Lycioïdes. *Cav. or.* de 3 à 5 f.
Rhus lævigatum. *L.* == *Sumac lisse.* † *or.* de 2 à 4 f.
— Lucidum. *L.* == *Sumac luisant.* † *or.* de 1 à 4 f.
— Oxiacanthoïdes. *Dum. Cours.* == *Sumac à feuilles d'aubépine. or.* de 3 à 5 f.
— Suaveolens. *Ait.* == Toxicodendrum. *Mill.* == Myrica trifoliata. *L.* == *Sumac odorant. or.* de 5 à 8 f.
Ricinus lividus. *Jacq.* == *Ricin livide.* == *Palma christi. s. ch.* 2 à 3 f.
Rivina humilis. *L.* == Piercea tomentosa. *Mill.* == *Rivine cotonneuse.* † *or.* de 1 à 3 f.
b. Canescens. de 2 à 3 f.
— Lœvis. *L.* == *Rivine glabre.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Purpurascens. *Schrad.* == *Rivine pourprée* de 2 à 4 f.
Rochea coccinea. *DC.* == Larochea. *Pers.* == Crassula coccinea. † *or.* de 2 à 3 f.
— Falcata. *DC.* == Crassula retroflexa. *Meerb.* == C. obliqua. *Andrew.* == C. falcata. *Dum. Cours.* † *or.* de 2 à 3 f.
Rondeletia americana. *L.* == *Rondelet d'Amérique. s. ch.* 5 à 8 f.
Ruellia varians. *Vent.* == Eranthemum pulchellum. *Andr.* == Justicia pulchella. == Justicia nervosa? *Hort. Angl.* † *s.* 2 à 3 f.
Rumex lunaria. *L.* == *Oseille des Canaries.* == *O. en arbre.* † ♉ *or.* de 1 à 2 f.
Ruta pinnata. *Ait.* == *Rue à feuilles ailées.* de 2 à 4 f.
Saccharum officinarum. *L.* == S. cannamella. *Lam.* == *Sucre officinal.* == *Canne à sucre.* † ♉ *or.* de 2 à 4 f.
Salmea eupatoria. *DC.* == Bidens scandens. *Swartz.* == Mikania? *Pers.* == Eupatorium gouani. *Hortul. s. ch.* de 3 à 4 f.
Salvia canariensis. *L.* == *Sauge des Canaries.* † ♀ *or* de 2 à 3 f.
— Chamædrifolia. *Cav.* == *Sauge à feuill. de marum.* † *or* 1 à 2 f.
— Coccinea. *L. F.* == *Sauge écarlate.* ♀ *or.* de 1 à 3 f.
— Formosa. *l'Hérit.* == S. nodosa. *Flor. Peruv.* == S. leonuroïdes. *Glox.* == *Sauge élégante.* † *s.* de 3 à 5 f.
— Mexicana. *Cav.* == *Sauge du Mexique.* † *or.* de 2 à 3 f.
— Pseudo-coccinea. *Willd.* == *Sauge fausse écarlate. or.* 1 à 3 f.
Schinus molle. *L.* == *Poivrier du Pérou.* † *or.* ♀ de 2 à 5 f.
Sempervivum arboreum. *L.* == *Joubarbe arborescente* † *or.* 2 à 3 f.
— Glutinosum. *Ait.* == *Joubarbe glutineuse.* † *or.* de 2 à 3 f.
Senecio elegans. *L.* == *Seneçon élégant.* == *S. d'Afrique. s.* de 50 c. à 2 f.
b. Flore pleno. == *Seneçon élégant à fleurs doubles. s.* de 1 à 3 f.
Serissa fœtida. *Willd.* == S. buxifolia. *Dum. Cours.* == Buchozia coprosmoïdes. *l'Hérit.* == Disodia fasciculata. *Lour.* == Spermacoce fruticosa. *H. P.* == Lycium japonicum. *Thumb.* == *L.* fœtidum. *L. F.* == *L.* indicum. *Retz.* == *Serissa à feuilles de buis.* == Austella, *en chine.* † de 1 à 2 f.
b. Flore pleno. † de 2 à 5 f.
Sida carpinifolia. *L.* == S. planicaulis. *Cav.* == *Sida à feuilles de charme.* † *or.* de 75 c. à 1 f.
— Mollissima. *Cav.* == S. cistiflora. *l'Hérit.* == *Sida velouté.* † *or.* de 1 à 2 f.
Sideritis canariensis. *L.* == *Crapaudine des Canaries.* † *or.* 1 à 2 f.
Sideroxylon inerme? † *or.* de 4 à 6 f.
Solanum balbisii. *Dun.* == S. viscosum. *DC.* == S. decurrens. *Balbis.* † *or.* de 75 c. à 1 f.
— Betaceum. *Cav.* == S. crassifolium. † *or.* de 1 à 2 f.
— Coccineum. *Jacq.* or. de 1 à 2 f.
— Diphyllum. *L.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Igneum. *L.* † *or.* de 1 à 2 f.
b. Subarmatum. *Willd.* † *or.* de 1 à 2 f.
Solanum laciniatum. *Ait.* == S. pinnatifidum. *Lam.* == S. reclinatum. *l'Hérit.* † *or.* de 1 à 3 f.
— Lanceolatum. *Cav.* † *or.* de 1 à 2 f.
— Lycioïdes. *L. or.* de 1 à 3 f.
— Macrophyllum. *L.* == S. oporinum. *Wlld.* == S. grandiflorum. *Desf.* == S. cymosum. *Orteg.* ♉ *or.* de 1 à 3 f.
— Marginatum. *L. F.* == S. niveum. *Allioni.* == S. abyssinicum. *Jacq.* de 75 c. à 1 f.
— Pyracanthum. *Dun.* == S. pyracanthos. *Lam.* == S. pyracantha. *Smith.* == S. runcinatum? *Wendl.* † de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Radicans *L. F.* † ♈ de 50 c. à 1 f.
— Tomentosum. *L.* † *or.* de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Vespertilio. *Ait.* == Nycterium cordifolium. *Vent.* † *or.* de 2 à 3 f.
Sonchus fruticosus. *l'Hérit* == *Laitron arbrisseau.* † *or.* de 1 à 3 f.
Sophora tetraptera. *Ait.* == *Soph. à quatre ailes.* ♈ *or.* de 2 à 4 f.
Sparmannia africana. *L.* == *Sparmanne d'Afrique.* † *s. ch.* 1 à 4 f.
Stachytarpheta mutabilis. *Pers.* == Verbena mutabilis. *Jacq. s. ch.* de 2 à 3 f.
Stapelia ciliata. *Stapele ciliée s. ch.* de 1 à 2 f.
— Hirsuta. *L.* == *Stapele velue. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Hirtella. *H. Monsp. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Multiflora. *DC.* == *Stapele multiflore. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Picta. *Hort. Monsp. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Revoluta. *Mass.* == *Stapele roulée. s. ch.* de 1 à 2 f.
— Variegata. *L.* == *Stapele variée.* == *Fleur de crapaud. or.* de 50 c. à 1 f. 50 c.
Statice crispa. *Hortul.* == S. mucronata. *L. F.* † ♈ de 1 à 2 f. 50 c.
Stevia purpurea. *Pers.* == S. Eupatoria? *Willd.* == Mustelia eupatoria. *Spreng.* == *Stévia à fleurs pourpres.* ♈ *or.* de 50 c. à 3 f.
— Serrata. *Cav.* == Ageratum punctatum. *Orteg.* == *Stévie dentée.* ♈ *or* de 50 c. à 2 f.
Styphelia gnidium. *Vent.* == S. daphnoïdes? *DC.* == Leucopogon lanceolatum. *Brow.* == *Styphelie gnidienne.* † *s.* 2 à 4 f.
Tagetes lucida. *Cav.* == T. integrifolia. *Orteg. or.* de 1 à 2 f.
Tamarindus indica. *L.* == *Tamarin.* de 10 à 20 f.
Tarchonanthus camphoratus. *L.* == *Tarchonanthe camphré* † *or.* 2 à 4 f.
Taxus elongata. *Ait.* == T. capensis. *Thunb.* == Podocarpus elongata. *l'Hérit.* † ♈ de 3 à 6 f.
Thea bohea. *L.* == T. stricta. *Ait.* == *Thé à feuilles étroites.* == *T. bout.* † ♈ *or.* de 5 à 10 f.
— Viridis. *L.* == T. laxa. *Ait.* == *Thé à larges feuilles.* == *Thé vert.* † ♈ de 6 à 12 f.
Thymus filiformis. *Ait.* == *Thym filiforme.* † ♈ de 50 c. à 1 f. 50 c.
Tournefortia volubilis. *Lam.* == *Pittonne grimpante* §. *s. ch.* 2 à 4 f.
Tradescantia discolor. *Smith.* == T. spathacea. *Swartz.* == *Ephemère à deux couleurs.* † *s. ch.* de 2 à 4 f.
Tropœolum majus *b.* Flore pleno. == *Capucine à fleurs doubles.* §. ♈ *or.* de 50 c. à 2 f.
— Peregrinum. *L.* == *Capucine laciniée.* == *Plante serin.* == *Canari.* Prov. §. *s. ch.* de 2 à 5 f.
Varronia alnifolia. *Cav.* == Cordia parviflora. *Orteg. or.* de 3 à 4 f.
Verbesina gigantea. *Jacq.* == V. fruticosa. *Hortul.* == *Verbesine gigantesque. or.* de 1 à 2 f.
Vinca rosa. *L.* == *Pervenche de Madagascar. or.* † 50 c. à 2 f. 50 c.
b. Alba. *Pervenche à fleurs blanches.* † *or.* 50 c. à 2 f.
Viola verticillata. *Orteg.* == Ionidium polygalæfolium. *Vent.* == *Violette verticillée.* † *or.* de 75 c. à 2 f.
Visnea mocanera. *L.* == Mocanera visnea. *Juss.* † *s. ch.* de 3 à 6 f.
Volkameria angustifolia. *Lour.* == V. ligustrina? *Jacq.* † *s. ch.* 3 à 4 f.
— Fragrans. *Vent.* == V. japonica. *Jacq.* == Clerodendrum fragrans. *Hortul.* † ♈ *or.* de 1 à 6 f.
— Inermis. *L.* == *Volkameria sans éguillons.* † *s. ch.* de 3 à 4 f.
Westeringia rosmarinacea. *Andew.* == Cunila fruticosa. *Willd.* † ♈ *or.* de 1 à 3 f.
Xylophylla falcata. *Ait.* == Phyllanthus epiphyllanthus. *L.* == *Xylophylle à feuilles étroites.* † *s. ch.* de 6 à 10 f.
— Latifolia. *L.* == *Xylophylle à feuil. larg.* == *Laurier maritime.*
Xeranthemum bracteatum. *Vent.* == Helichrysum chrysanthum. *Pers.* == H. bracteatum. *Will.* ♈ *or.* de 1 à 3 f.
— Fulgidum. *L.* == Helichrysum fulgidum. *Willd.* == Gnaphalium aureum? *or.* de 1 à 3 f.
Zapania odorata. *Pers.* == Z. lantanoïdes *Lam.* == Verbena globifera. *l'Hérit.* == V. odorata. *H. P.* † *or.* de 2 à 4 f.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

POUR L'ORNEMENT DES JARDINS.



ACACIA brachyloba. *Willd.* = Mimosa illinoensis. *Mich.* = M. Glomerata. *Hortul.* de 50 c. à 1 f. 50 c.
Acanthus mollis. *L.* = *Acanthe Branc-ursine.* de 25 c. à 50 c.
— Spinosus. *L.* = *Acanthe épineuse.* de 50 à 75 c.
Achillea ageratum. *L.* = *Achillée visqueuse.* = *Eupatoire de Mesué.* de 25 à 50 c.
— Millefolium. *L.* = *Achillée mille-feuille.* = *Herbe aux Charpentiers.* de 15 à 25 c.
b. Roseum. = *Achillée à fleurs pourpres.* de 25 à 40 c.
— Tomentosa. *L.* = *Achillée cotonneuse.* de 15 à 25 c.
Aconitum album. *Willd.* = *Aconit blanc.* de 1 à 2 f.
— Anthora. *L.* = *Aconit Salutifère.* 50 c. à 1 f.
— Cammarum. *L.* = *Aconit à grandes fleurs.* de 1 à 2 f.
— Lycoctonum. *L.* = *Aconit tue-loup.* de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Napellus. *L.* = *Aconit napel.* de 50 c. à 1 f.
— Tauricum. *Willd.* = *Aconit taurique.* de 1 à 2 f.
Acorus calamus. *L.* = *Acore odorant.* = *Jonc odorant.* 75 c. à 1 f.
— Gramineus. *Ait.* = *Acore graminé.* * de 1 à 2 f.
Actœa spicata. *L.* = *Actée à épi.* = *Chrystophoriane.* 50 c. à 1 f.
Adiantum capillus veneris. *L.* = A. coriandrifolium. *Lam.* = *Capillaire de Montpellier.* * de 40 c. à 1 f.
Adonis vernalis. *L.* = *Adonis printanier.* de 1 à 2 f.
Agrostemma coronaria. *L.* = *Coquelourde des jardins* 40 c.
b. Flore pleno. = *Coquel. à fleurs doubles.* 50 c. à 1 f.
Alcea rosea. *L.* = Althœa rosea. *Cav.* = *Alcée rose.* = *Passe-rose.* = *Rose trémière.* 25 c.
a. Flore pleno. = *Rose tremière à fleurs doubles variées en couleurs* de 40 à 75 c.
b. Sulphurea. = *Passe-rose jaune.* de 1 à 2 f.
c. Ficifolia. *L.* = *Alcée à feuill. de figuier.* 50 c. à 2 f.
Alchemilla alpina. *L.* = A. argentea. *Lam.* = *Alchemille des Alpes.* de 50 à 75 c.
Aletris uvaria. *L.* = Tritoma uvaria. *Gawler.* = Veltheimia. *Willd.* = *Aletris à longues feuilles.* * de 1 à 3 f.
Althæa cannabina. *L.* = *Guimauve à feuill. de chanvre* 40 à 75 c.
— Narbonensis. *Poirr.* = *Guimauve de Narbonne.* de 50 c. à 1 f.
Alyssum maritimum. *Lam.* = A. halimifolium. *Ait.* = Clypeola maritima. *L.* = *Alysse maritime.* de 15 à 50 c.
— Utriculatum. *L.* = Vesicaria. *Lam.* = *Alysse à fruit renflé* de 75 c. à 1 f. 50 c.
Amorpha pubescens. *Willd.* = A. herbacea. *Walt.* = A. pumila. *Mich.* = A. tomentosa. *Dum. Cours.* = *Amorpha tomenteux.* de 2 à 3 f.
Anemone hepatica. *L.* = Hepatica triloba. *Chaix.* 15 c.
b. Cœrula plena. = *Hépatique à fleur bleue doub.* 1 à 3 f.
c. Rosea plena. = *Hépatique à fleurs rouge doub.* 1 à 2 f.
— Virginiana. *L.* = *Anemone de Virginie.* de 50 à 75 c.
Anthemis grandiflora. *Ramat.* = A. artemisiœfolia. *Willd.* = A. stipulacea. *Moench.* = Chrysanthemum indicum. *L.* = Matricaria sinensis. *Rumph.* = *Chrysanthème des Indes.* = *Multipliante.* = *Renoncuiier* vulg.
a. Atropurpurea. *DC.* = Chrysanthemum purpureum *Pers.* de 30 à 50 c.
b. Varians. *DC.* Var. Crocea. — *Saffrané.* 75 c. à 1 f. ; Flava. — *Jaunâtre.* de 1 à 2 f. ; Rosea lilacina. — *Rose.* de 1 à 2 f.
— Nobilis. *L.* = *Camomille Romaine à fleurs doubles*
Antirhinum bellidifolium. *L.* = Anarhinum bellidifolium. *Desf.* = *Linaire à feuilles de paquerette.* de 50 c. à 1 f.
— Cymbalaria. *L.* = Linaria cymbalaria. *Mill.* = *Linaire lierrée.* de 15 à 40 c.
— Linaria. *L.* = Linaria vulgaris. *Desf.* = *Linaire commune.* de 25 à 50 c.

Antirhinum Majus. *L.* = Orontium majus. *Pers.* = *Mufle de veau.* = *Gueule de Lion.* de 40 à 60 c.
b. Flore albo. = *Mufle de veau à fleurs blanche.* 50 c. à 1 f.
— Monspessulanum. *L.* = Linaria galioïdes. *Lam.* 40 à 75 c.
— Latifolium. *Mill.* = *Mufle de veau de Vaucluse.* de 1 à 2 f.
Aphyllanthes monspeliensis. *L.* = *Bragalou de Montpellier.* = *Jonc fleuri.* * de 50 c. à 1 f.
Apocynum androsœmifolium. *L.* = A. canadense. *Boer.* = *Apocin gobe-mouche.* de 1 à 3 f.
— Cannabinum. *Ait.* = *Apocin à fleurs herbacées.* de 1 à 3 f.
— Venetum. *L.* = *Apocin de Venise.* de 1 à 2 f.
Aquilegia canadensis. *L.* = *Ancolie du Canada.* 50 c. 1 f. 50 c.
— Viridiflora. *Ait.* = *Ancolie à fleurs vertes.* de 1 à 2 f.
— Vulgaris. *L.* = *Ancolie commune.*
b. Grandiflora. = *A. à grandes fleurs.* ; *c.* Flore multiplici. = *A. à fl. doub.* ; *d.* Ecalcarata. *Vahl.* = Aquilegia stellata. *L.* — Var. *à fleurs doubles ou simples de couleurs variées.* 25 c. 1 f. 25 c.
Aristolochia longa. *L.* = *Aristoloche à longues racines.* de 1 à 2 f.
— Pistolochia. *L.* = *Aristoloche crénelée.* de 50 à 75 c.
— Rotunda. *L.* = *Aristoloche ronde.* de 50 à 75 c.
Arnopogon dalechampii. *Willd.* = Tragopogon. *L.* = Urospermum. *DC.* = *Barbouquine à grandes fleurs.* * 50 c. à 1 f.
Arundo colorata. *Ait.* = Phalaris arundinacea. *L.* = *Roseau coloré.* = *Ruban des jardins.* de 40 à 50 c.
— Tenax. *Vahl.* = A. mauritanica. *Poir.* * de 50 c. 1 f.
Asarum europœum. *L.* = *Cabaret.* = *Asaret d'Europe.* 75 c. 1 f. 50 c.
Asclepias amœna. *L.* = *Asclepiade élégante.* = *A. rose.* 1 à 2 f.
— Incarnata. *Mich.* = *Asclépiade carnée.* de 1 à 2 f.
— Nigra. *L.* = Vincetoxicum nigrum. *Pers.* = Cynanchum nigrum. *Brown.* = *Asclépiade noire.* de 50 c. à 1 f.
— Nivœa. *L.* = *Asclépiade à feuilles d'amandier.* Dum. Cours. = *A. blanche. fl. P.* de 1 à 2 f.
— Syriaca. *L.* = *Asclépiade de Syrie.* = *Herbe à la Ouatte.* de 75 c. à 1 f. 50 c.
— Vincetoxicum. *L.* = Vincetoxicum vulgare. *Pers.* = Cynanchum vixetoxicum. *Brown.* = *A. dompte venin.* 40 à 75 c.
Asplenium adianthum nigrum. *L.* de 40 à 60 c.
— Scolopendrium. *L.* = Scolopendrium officinale. *DC.* = *Doradille scolopendre.* de 30 à 50 c.
Aster acris. *L.* = *Aster âcre.* 50 c.
— Amygdalinus. *Mich.* = A. umbellatus. *Ait.* = *Aster à feuilles d'amandier.* 50 c.
— Cordifolius. *L.* = *Aster à feuilles en cœur.* 50 c.
— Dracunculoïdes. *Lam.* = *Aster à feuilles d'estragon.* 50 c.
— Corymbosus. *Ait.* = *Aster à corymbes.* 50 c.
— Ericoïdes. *L.* = *Aster à feuilles de bruyère.* 50 c.
— Grandiflorus. *Willd.* = *Aster à grandes fleurs.* 75 c.
— Miser. *Lam.* = *Aster à petites feuilles.* = *A. lupulin.* = *A. grêle.* 58 c.
— Novœ-angliœ. *L.* = *Aster de la nouvelle Angleterre.* 50 c.
— Novi-belgii. *Ait.* = A. paniculatus. *Lam.* = *Aster de la nouvelle Belgique.* 50 c.
— Spectabilis. *Ait.* = *Aster remarquable.* 75 c.
— Tripolium. *L.* = *Aster de tripoli.* 40 c.
— Vimineus. *Lam.* = *Aster flexible.* 75 c.
Astragalus alopecuroïdes. *L.* = *Astragale queue de Renard.* 50 à 75 c.
— Monspessulanus. *L.* = *Astragale de Montpellier.* * 40 à 60 c.
Atropa belladona. *L.* = *Belledone commune.* de 50 c. à 1 f.
— Mandragora. *L.* = Mandragora acaulis. *Gœrt.* = *Mandragore.*
Bellis perennis. *L.* = *Paquerete vivace.* = *Petite marguerite.* = *Margueritette.* ‡

Bellis. *b.* Flore roseo pleno. — Var. *à fleur rose double.* ‡ 25 c.
c. Flore albo pleno. — *à fleur blanche. double.* ‡ de 40 à 50 c.
d. Flore purpureo pleno. — *à fleur pourpre double.* de 30 à 50 c.
e. Flore prolifero. — *à fleurs polifères.* ‡ de 1 f. à 1 f. 50 c.
f. Flore variegato. — *à fleurs roses et blanches.* ‡ de 40 à 50 c.
Bidens sambucifolia. *Cav.* = Coreopsis sambucifolia. *Dum. Cours.* = *Bident à feuilles de sureau.* * de 75 c. à 1 f.
Boltonia asteroïdes. *Mich.* = Matricaria asteroïdes. *Dum. Cours.* = *Boltonia à feuilles d'aster.* 50 c.
Borrago orientalis. *L.* = *Bourache d'orient* 60 c.
Buphthalmum grandiflorum. *L.* 50 c.
Butomus umbellatus. *L.* = *Butome ombellifère.* 75 c.
Cacalia suaveolens. *L.* = *Cacalie à feuilles sagitées.* 50 c.
Caltha palustris. *L.* = *Populage.* = *Souci des marais.*
b. Flore pleno. = *Populage à fleurs doub.* 1 à 1 f. 50 c.
Campanula glomerata. *L.* (Flore pleno.) 50 c.
— Medium. *L.* = *Campanule à grosses fleurs.* 50 c.
b. Flore albo. = *Camp. à fleurs blanches.* 75 c.
— Persicœfolia. *L.* = C. decurrens ? *L.* = *Campanule à feuilles de pêcher.* = *Bâton de jacob.* vulg. ‡
b. Flore pleno pallide-cœruleo. ‡ 50 c.
c. Flore pleno albo. ‡ 50 c.
— Pyramidalis. *L.* = *Campanule pyramidale.* = *Violette pyramidale.* de 50 c. à 1 f.
— Rapunculoïdes. *L.* 50 c.
Cassia marylandica. *L.* = *Casse du maryland.* * 50 c.
Carlina corymbosa. *L.* = *Carline à corymbes.* 25 c.
Catananche cœrulea. *L.* = *Cupidone bleue* 50 c.
Centaurea atropurpurea. *Willd.* = Cyanus atropurpureus. *Pers.* = *Centaurée à fleurs pourpres.* 75 c.
— Collina. *L.* = *Centaurée des collines.* 50 c.
— Conifera. *L.* = Jacea conifera *Pers.* = Leuzea conifera. *DC.* * 75 c.
— Sonchifolia. *L.* 50 c.
Centranthus latifolius. *Duf.* = C. ruber. *DC.* = Valeriana rubra. *L.* = *Valeriane des parterres.* 40 c.
a. Ruber. — Var. *à fleurs rouges.*
b. Albus. — Var. *à fleurs blanches.*
— Angustifolius. *DC.* = *Valeriane à feuilles étroites.* 40 c.
Cerastium tomentosum. *L.* = *Ceraiste cotonneux* = *Oreille de souris.* ‡ 15 c.
Cerinthe minor. *L.* = *Melinet à feuilles pointues.* 75 c.
Cheiranthus incanus. *L.* = Hesperis violaria. *Lam.* = *Giroflée.* = *Violliet.* Prov. 25 c. 2 f.
b. Flore rubro pleno. — Var. *à fleurs doubles rouges.*
c. Flore roseo pleno. — Var. *à fleurs doubles roses.*
d. Flore albo pleno. — Var. *à fleurs blanches doubles.*
e. Flore violaceo pleno. — Var. *à fleurs doubles violettes.*
— Fenestralis. *L.* = *Giroflée des fenêtres.* 50 c.
— Tristis. *L.* = Hesperis angustifolia. *Lam.* 1 f.
Chelone barbata. *Cav.* = C. ruellioïdes. *Andrews.* = C. formosa. *Wend.* = *Galane barbue.* * 1 f.
— Campanulata. *Cav.* = C. foliosa. *Dum. Cours.* = Penstemon. campanulatum. *Willd.* = *Galane campanulée.* * 1 f. 25 c.
Chrysanthemum serotinum. *L.* 75 c.
— Macrophyllum. *Pers.* 1 f.
— Corymbosum. *L.* 25 c.
— Parthenium. *DC.* = Matricaria parthenium. *L.* = Pyretrum parthenium. *Willd.* 50 c.
Chrysocoma linosiris. *L.* * 50 c.
— Graminifolia. *L.* 1 f.
Cineraria maritima. *L.* = Jacobœa maritima. *Gært.* = *Cineraire maritime.* * 75 c.
Circea lutetiana. *L.* = *Circée pubescente.* 50 c.
Clematis integrifolia. *L.* = C. nutans. *Crantz.* = C. inclinata. *Scop.* = *Clematite à feuilles entières.* = *C. à feuilles simples.* 1 f. 50 c.
— Recta. *L.* = *Clematite droite.* 40 c.
b. Nana. 75 c.
Comarum palustre. *L.* = Potentilla comarum. *Neslt.* 50 c.
Convolvulus cantabrica. *L.* = *Liseron linéaire.* 25 c.
Convolvulus lineatus. *L.* 25 c.
— Reniformis. *L.* = *Liseron réniforme.* * 50 c.
— Sepium. *L.* = *Liseron des haies.* §. 15 c.
Coreopsis alternifolia. *Willd.* 50 à 75 c.
— Lanceolata. *L.* = *Coriope lanceolée.* 50 c.
— Tripteris. *L.* = *Coriope triptère.* 50 c.
— Verticillata. *L.* = C. delphinifolia. *Lam.* = *Coriope verticillée.* 50 c.
Coris monspeliensis. *L.* = *Coris de Montpellier.* * 40 c.
Cornus canadensis. *L.* = *Cornouiller du Canada.* 2 f.
— Suecica. *L.* = *Cornouiller de Suede.* 2 f.
Coronilla varia. *L.* = *Coronille variée.* 50 c.
Cynanchum acutum. *L.* = *Scamonée à feuilles pointues.* 1 à 1 f. 50 c.
Cynoglossum apenninum. *L.* = *Cynoglosse de l'apennin.* 75 c.
— Cheirifolium. *L.* = *Cynoglosse argentée.* de 50 à 75 c.
— Pictum. *Ait.* = C. creticum. *Vill.* = *Cynoglosse peinte.* 50 c.
Cyperus papyrus. *L.* = *Souchet à papier.* = *S. d'Egypte.* * 2 à 3 f.
Dactylis cynosuroïdes. *L.* = Limnetis cynosuroïdes. *Pers.* = Spartina cynosuroïdes. *Roth.* 50 c.
Datisca cannabina. *L.* = *Datisque à feuilles de chanvre.* 1 à 2 f.
Delphinium elatum. *Ait.* = *Dauphinelle élevée.* = *Pied d'alouette vivace.* de 50 c. à 1 f.
— Grandiflorum. *Pers.* = *Pied d'alouette à grandes fleurs.* 1 à 3 f.
Dianthus asper. *Willd.* 50 c.
— Atrorubens. *Allioni.* 50 c.
— Barbatus. *L.* = *OEillet barbu.* = *Bouquet-parfait.* = *OE. de Poëte.* = *Jalousie.*
a. Ruber. = *Bouquet-parfait à fleur rouge.* ‡ 25 c.
b. Albus. = *Bouquet-parfait à fleur blanche.* ‡ 25 c.
c. Variegatus. = *Bouquet-parfait à fleurs panachées.* ‡ 50 c.
— Bicolor. *Marsch.* 1 f.
— Cariophyllus. *L.* = *OEillet des fleuristes.* de 25 c. à 2 f.
Var. très nombreuses. — *à fleurs doubles rouge, jaune, fond blanc, bizarre, grenadin Flamand. etc.*
— Carthusianorum. *L.* = *OEillet des chartreux.* 50 c.
— Chinensis. *L.* = *OEillet de la Chine.* = *OE. de la Regence.* 25 c.
b. Flore pleno. = *OEillet de la Chine à fleurs doubles.* = *Mississipienne.* de 50 à 75 c.
— Collinus. *Pers.* = *OEillet des collines.* 40 c.
— Deltoïdes. *L.* = *OE. deltoïde.* = *OE. couché.* ‡ 25 c.
— Hispanicus. *Dum. Cours.* = *OEillet mignonette à fleur double.* ‡ 40 c.
— Moschatus. *Mayer.* = *OEillet mignardise.* ‡ 50 c.
— Plumarius. *L.* = *OEillet lacinié.* = *OE. à bordures.* = *OEillet plume.* ‡ 15 c.
b. Fimbriatus. *Lam.* = *OEillet fimbrié.* de 75 c. à 1 f. 25 c.
c. Coronarius. = *OEillet couronné.* 25 c.
d. Albus. 25 c.
— Serotinus. *Walld* et *Kit.* 50 c.
— Superbus. *L.* = *OEillet superbe.* 75 c.
Dictamnus albus. *L.* = D. Fraxinella. = *Fraxinelle d'Europe.* = *Dictame blanc.* de 1 à 2 f.
Digitalis lœvigata. *Pers.* = *Digitale à feuilles glabres.* de 1 à 2 f.
— Lutea *L.* = Digitalis parviflora. *Lam.* = *Digitale jaune.* de 75 c. à 1 f. 25 c.
— Purpurea. *L.* = *Digitale pourprée.* = *Gantelet de Nôtre-Dame.* de 50 c. à 1 f.
Dodartia orientalis. *L.* = *Dodart du levant.* de 75 c. à 1 f.
Doronicum pardalianches. *L.* = *Doronic à feuilles en cœur.* 50 c.
— Plantagineum. *L.* = *Doronic à feuilles de plantain.* 50 c.
Dracocephalum virginicum. *L.* = *Dracocéphale de Virginie.* 1 à 2 f.
Echinophora spinosa. *L.* = *Echinophore épineuse.* de 75 c. à 1 f.
Echinops ritro. *L.* = *Boulette azurée.* de 50 à 75 c.
Epilobium spicatum. *Lam.* = E. angustifolium. *L.* = *Epilobe à épi.* de 50 c. à 1 f.
b. Latifolium. *Gm.* = *Epilobe à feuill. larges.* de 1 à 2 f.
Erigeron viscosum. *L.* de 50 à 75 c.
Erodium hymenodes. *l'Hérit.* de 50 à 75 c.
Eryngium maritimum. *L.* = *Panicaut maritime* de 75 c. à 1 f.
— Planum. *L.* = *Panicaut plane* de 1 à 2 f.
Erysimum barbarea. *L.* = *Velar barbarée.* = *Herbe de Saint Barbe.*
b. Flore pleno. de 50 c. à 1 f.

Eupatorium altissimum. L. = Eupatoire géante. de 75 c. à 1 f.
— Purpureum. L. = Eupatoire pourpre. de 75 c. à 1 f.
Euphorbia paralias. L. = Euphorbe maritime. de 50 à 75 c.
Ferula glauca. L. = Férule glauque. de 1 à 2 f.
— Tingitana. L. = Férule de Tanger. de 1 à 2 f.
Galeobdolon luteum. Huds. = Galeopsis galeobdolon. L. 25 c.
Genista ovata. Willd. = Genêt à feuilles ovales. de 75 c. à 1 f.
Gentiana acaulis. L. = Gentiane à grandes fleurs. ✝ 1 à 2 f.
Geranium macrorhizon. L. = Géranion à grosses racines. 50 c.
— Nodosum. L. = Géranion noueux. 75 c.
— Phœum. L. = Géranion brun. = G. à fleurs noires. 75 c.
— Pratense. L. = Géranion des prés. 50 c.
— Sanguineum. L. = Géranion sanguin. 75 c.
Geum rivale. L. = G. nutans. Crantz. = Benoite aquatique. ✝ 50 c.
Globularia vulgaris. L. = Bellis cœrulea. Tabern. = Globulaire commune. ✝ 25 c.
Glycirrhiza echinata. L. = Réglisse hérissée. * 75 c.
— Glabra. L. = Liquiritia officinalis. Mœnch. = Réglisse commune. * 50 c.
Gnaphahalium margaritaceum. = Gnaphale des jardins. = Immortelle blanche. de 75 c. à 1 f.
Gypsophila altissima. L. = Gypsophile élevée. 1 f.
— Saxifraga. L. = Dianthus saxifragus. L. = D. filiformis. Lam. 50 c.
Hedysarum canadense. L. = Sainfoin du Canada. 1 f. 50 c.
— Coronarium. L. = Sainfoin d'Espagne. * de 25 à 50 c.
— Viridiflorum. L. = Sainfoin à fleurs vertes. * de 1 à 2 f.
Helenium autumnale. = Hélénie d'automne. 50 c.
Helianthus atrorubens. H. P. = H. lœtiflorus. Pers. = Hélianthe à feuilles rudes. de 50 c. à 1 f.
— Linearis. Cav. = Hélianthe à feuilles étroites. de 1 à 2 f.
— Lœvis. L. = Heliopsis lœvis. Pers. = Buphthalmum helianthoïdes. de 75 à 1 f.
— Macrophyllus. Willd. = Hélianthe à grand. feuill. 1 à 1 f. 50 c.
— Mollis. Willd. de 75 c. à 1 f.
— Multiflorus. L. = Hélianthe multiflore. 25 c.
b. Flore pleno. = Hel. multif. à fl. doubles. 25 à 50 c.
— Virgatus. Lam. = H. giganteus. = H. excelsus. Willd. de 75 c. à 1 f.
Helleborus fœtidus. L. = Héllebore fétide. = pied de griffon. 50 c.
— Lividus. Ait. = H. corsicus. Hortul. = Hellebore à feuilles dentées. 2 f.
— Niger. L. = Hellebore à fleurs roses. = Rose de noël. 1 à 2 f.
— Viridis. L. = Hellebore à fleurs vertes. de 75 c. à 1 f. 50 c.
Hesperis matronalis. L. = Julienne des jardins. ✝ de 25 c. à 1 f.
b. Flore purpureo pleno. Var. { à fleurs pourp. doub. 1 à 2 f.
c. Flore albo pleno. Var. { à fleurs blanches doub. 25 c. 1 f.
Hibiscus militaris. Willd. de 1 à 2 f.
— Palustris. L. = Ketmie des marais de 50 c. à 1 f. 50 c.
— Moscheutos. L. de 1 à 2 f.
— Speciosus. Ait. = H. coccineus. Walth. * de 1 à 3 f.
Hydrophyllum magellanicum. Lam. = Hydrophylle de magellan. * de 75 c. à 1 f.
Hypericum hirsutum. L. = Millepertuis velu. de 50 c. à 1 f.
Inula helenium. L. = I. campana. Pharm. = Aunée officinale. de 25 à 50 c.
— Montana. L. ✝ de 25 à 50 c.
— Squarrosa. L. = I. spirœifolia. Lam. = Inule rude. 25 à 50 c.
Kittaibelia vitifolia. Willd. = Kitt. à feuilles de vigne 50 à 75 c.
Lactuca perennis. L. = Laitue à fleurs bleues. * de 50 à 75 c.
Lamium album. L. = Ortie blanche. 25 c.
— Garganicum. L. = Lamier d'Italie. de 50 à 75 c.
Lathyrus latifolius. L. = Gesse à larges feuilles. de 40 à 75 c.
— Sylvestris. L. = Gesse des bois. de 40 à 75 c.
Leonurus crispus. L. = Agripaume à feuilles crêpues. de 40 à 75 c.
Linum campanulatum. Lam. = L. flavum. L. = Lin campanulé. *
— Maritimum. L. = L. maritime. de 25 à 50 c.
— Narbonense. L. = Lin de Narbonne. = Lin à grandes fleurs bleues. * de 50 à 75 c.
Lithospermum purpureo-ceruleum. L. de 50 à 75 c.
Lobelia cardinalis. L. = Lobelie cardinale. de 75 c. à 1 f.
— Fulgens. Willd. = L. éclatante. de 1 à 2 f.
— Siphilitica. L. = Lobélie siphilitique. de 50 c. à 1 f.
Lomandra longifolia. Labill. = Lomandra à longues feuilles. * de 2 à 3 f.

Lotus cytisoïdes. L. = Lotier cotonneux. * de 50 à 75 c.
Lunaria rediviva. L. = Lunaria perennis. Mill. = Lunaire vivace. de 1 à 2 f.
Lupinus perennis. L. = L. nortianus? Hortul. = Lupin vivace.
Lychnis chalcedonica. L. = Lychnide de calcedoine. = Croix de Jérusalem. = croix de Malte. 25 c.
b. Flore albo. Var. { à fleurs blanches. de 2 à 3 f.
c. Flore roseo. Var. { à fleurs roses. de 1 à 1 f. 50 c.
d. Flore pleno. Var. { à fleurs doubles. de 1 à 2 f.
— Flos cuculi. L. = Lychnide laciniée. = Veronique des jardiniers. = Palamour.
b. Flore pleno. de 15 à 25 c.
— Sylvestris. Hoppe. = L. dioïca. b. L. = Jacée. = Robinet. = OEil de perdix.
b. Flore pleno. de 50 à 60 c.
— Viscaria. L. = Lychnide visqueuse. = Bourbonnaise des jardiniers de 50 à 60 c.
Lysimachia ephemerum. L. = L. salicifolia. Mill. de 50 à 75 c.
— Vulgaris. L. de 25 à 50 c.
Lythrum salicaria. L. = Salicaire commune. = S. à épis 15 à 25 c.
Melissa grandiflora. = Mélisse à grandes fleurs 1 f. 50 c.
Menyanthes nymphoïdes. L. = Villarsia nymphoïdes. Vent. = Waldschmidia. Hayn. = Lymnanthemum. = Ményanthe flottant. * de 50 c. à 1 f.
— Trifoliata. L. = Trefle d'eau. de 50 à 75 c.
Monarda coccinea. Mich. = M. didyma. L. = M. purpurea. Lam. = Monarde écarlate. = Thé d'oswego. 1 f.
— Fistulosa. L. = Monarde fistuleuse. de 75 c. à 1 f.
Napœa lœvis. Ait. = N. hermaphrodita. L. = Sida napœa. Cav. = Napée lisse. de 50 à 75 c.
Nymphœa alba. L. = Nénuphar blanc. * de 1 à 2 f.
— Lutea. L. = Nenuphar jaune. * de 75 c. à 2 f.
OEnothera rosea. L. = OE. rubra. Cav. = Onagre rose. 75 c. à 1 f.
Ononis rotundifolia. L. = Bugrane à feuilles rondes. de 50 c. à 1 f.
Onosma echioïdes. L. = Anchusa lutea. Dalech. = Cerinthe echioïdes. = Onosme vipérine. * 50 c.
Pœonia albiflora. Pall. = Pivoine blanche. de 2 à 3 f.
— Corallina. Retz. = P. mascula. L. = Pivoine mâle. 50 à 75 c.
— Humilis. Retz. = P. villosa? = Pivoine velue. 75 c.
— Officinalis. Retz. = P. fœmina. L. Pivoine femelle.
b. Rubra plena. Var. { à fleur double ponceau. de 40 c. à 1 f.
c. Carnea plena. Var. { à fleur doub. couleur de chair. de 1 à 2 f.
— Lobata. Desf. = Pivoine lobée de 2 à 3 f.
— Tenuifolia. L. = Pivoine à feuilles menues. de 1 à 2 f.
Papaver orientale. L. = Pavot du levant. = P. de Tournefort. 1 à 2 f.
Pascalia glauca. Orteg. 50 c.
Passiflora incarnata. L. = Grenadille couleur de chair. § * 75 c. à 1 f.
— Lutea. L. = Grenadille jaune. §. * de 75 c. à 2 f.
Peganum harmala. L. = Hermale à feuille découp. = Rue sauvage. de 50 75 c.
Phlomis herba venti. L. = Phl. herbe du vent. de 50 à 75 c.
— Lychnitis. L. = Phlomide à mèche. de 25 à 40 c.
— Tuberosa. L. = Phlomide tubereuse. de 50 à 75 c.
Phlox carolina. L. = Phlox de la Caroline. de 75 c. à 1 f.
— Glaberrima. L. = Phlox glabre. de 1 à 2 f.
— Ovata. Mill. = Phlox à feuilles ovales. de 1 à 2 f.
— Paniculata. L. = Phlox paniculé. de 50 c. à 1 f.
— Pilosa. Mill. = P. aristata. id. = Phlox velu. 75 c. à 1 f. 50 c.
— Suaveolens. Ait. = P. candida. Pers. = Phlox blanc. 1 à 2 f.
— Subulata. L. = Phlox subulé. de 75 c. à 1 f.
— Suffruticosa. Willd. de 1 à 3 f.
Physalis alkekengi. L. = P. halicacabum. Scop. = Solanum vesicarium. Bauh. = Alkekenge. = Coqueret. 25 c.
Plumbago europœa. L. = Dentelaire Européenne. 25 c.
Polemonium cœruleum. L. = Polemoine à fleurs bleues. = valériane grecque. 50 c.
b. Album. Polemoine à fleurs blanches. 1 f. 25 c.
Polygala vulgaris. L. 25 c.
Polygonum bistorta. L. = Renouée bistorte. 25 c.
Polypodium filix femina. L. = Fougère femelle. de 75 c. à 1 f.
— Filix mas. L. = Fougère mâle. de 75 c. à 1 f.
— Vulgare. L. = Fougère commune. 75 c.
b. Cambricum. = Fougère laciniée. de 75 c. à 1 f.
Pontederia cordata. L. = Pontéderia en cœur. * de 1 à 2 f.

Potentilla anserina. *L.* == *Potentille anserine.* == *Argentine.* ♃ de 15 à 25 c.
Primula auricula. *L.* == *Oreille d'ours.* (*variétés nombreuses.*) ♃ de 25 c. à 1 f.
— Elatior. *L.* == *Primevère.* == *Primerole.* (*varietés nombreuses.*) de 20 à 80 c.
a. Inodora. *Hoff.* == *Primevère inodore.* ♃
b. Acaulis. *Jacq.* == *Primevère uniflore.* ♃
Id. Flore pleno.
c. Calycantha. *Betz.* == P. grandiflora ? *Lam.* ♃
d. Officinalis. *Jacq.* == P. veris. *L.* == *Primevère odorante.* ♃
— marginata. *Willd.* == P. crenata. *Lam.* de 1 à 1 f. 50 c.
Ranunculus aconitifolius. *L.* == *Renoncule à feuilles d'aconit.*
b. Flore pleno. == *Bouton d'argent.* de 50 c. à 1 f.
— Acris. *L.* == *Renoncule bassinet.* ♃
b. Flore pleno. == *Bouton d'or.* ♃ de 10 à 15 c.
Rhodiola rosea. *L.* == Sedum roseum. *Vill.* == S. rhodiola. *H. P.* == *Rhodiole odorante.* 1 f.
Rubia cordifolia. *Pall.* == *Garance à feuilles en cœur.* * 1 à 2 f.
Rubus saxatilis. *L.* == *Ronce des roches.* de 1 à 2 f.
Rudbeckia amplexicaulis. *Vahl.* 50 c.
— Atropurpurea. *L.* == *Rudbecque à fleurs pourpres.* de 50 à 75 c.
Ruellia strepens. *L.* == *Ruelle verticillée.* * de 1 à 1 f. 50 c.
Rumex sanguineus. *L.* == *Oseille sanguine.* de 25 à 50 c.
Saccharum ravennæ. == Andropogon ravennæ. *L.* == *Sucre de ravenne.* de 25 à 50 c.
Salvia glutinosa. *L.* == *Sauge glutineuse.* de 25 à 50 c.
— Pinnata. *L.* == *Sauge pinnée.* de 50 c. à 1 f.
— Pulchella. *D C.* == *Sauge élégante.* * de 1 à 2 f.
— Sclarea. *L.* == *Sauge sclarée.* de 10 à 20 c.
Sanseviera carnea. *Andrw.* == S. sessilis. *Hort. Angl.* == Aletris sessilis. *Sansevière couleur de chair.* * ♃ de 75 c. à 2 f.
Saponaria ocymoïdes. *L.* == *Saponaire rampante.* ♃ 50 à 50 c.
— Officinalis. *L.* == S. vulgaris. == Lychnis officinalis. *Neker.* == *Saponaire commune.* 15 c.
b. Flore pleno. == *Saponaire à fleurs doubles.* de 50 à 75 c.
Saxifraga cotyledon. *L.* == S. pyramidalis. *Lapey.* == Sedum. pyramidale. *Hortul.* == *Saxifrage pyramidale.* 50 c. à 1 f.
— Crassifolia. *L.* == *Saxifrage de sibérie.* de 75 c. à 1 f.
— Granulata. *L.* == *Saxifrage granulée.*
b. Flore pleno. de 75 c. à 1 f.
— Hirsuta. *L.* *An* Sax. punctata ? *L.* == *Saxifrage velue.* ♃ de 50 à 75 c.
— Hypnoïdes. *Lapey.* == S. gemmifera. == *Sax. mousseuse.* ♃ de 40 à 50 c.
— Sarmentosa. *L. F.* == S. stolonifera. *Jacq.* == *Saxifrage de la Chine.* == *S. stolonifère.* == *S. sarmenteuse.* 25 à 50 c.
— Umbrosa. *L.* == *Saxifrage mignonette.* == *S. amourette.* ♃ de 40 à 60 c.
Scabiosa gramuntia. *L.* == *Scabieuse à feuilles graminées.* 25 c.
— Leucantha *L.* == *Scabieuse blanche.* 50 c.
Scutellaria galericulata. *L.* == *Scutellaire toque.* 40 c.
Sedum telephium. *L.* == *Orpin commun.* ♃ 25 c.
Sempervivum arachnoïdeum. *L.* == *Joubarbe arachnoïde.* 50 c.
— globiferum ? == *Joubarbe globifère.* 75 c.
— Tectorum. *L.* == *Joubarbe des toits.* 25 c.
Senecio doronicum. *L.* == *Seneçon doronic.* 40 c.
Silene gigantea. *L.* == *Silène gigantesque.* * 50 c.
Silphium connatum. *L.* == *Silphie à feuilles réunies.* de 50 à 75 c.
— Laciniatum. *L.* == S. pinnatifidum. *Hortul.* == *Silphie laciniée.* de 75 c. à 1 f.
— Perfoliatum. *L.* == *S. perfoliée.* de 50 à 75 c.
— Terebinthinaceum. *L.* == *Silphie à feuilles en cœur.* 75 c. à 1 f.
— Trifoliatum. *L.* == *Silphie trifoliée.* de 75 c. à 1 f.
Sisyrinchium bermudiana. *L.* == *Bermudienne bleue.* * 50 à 75 c.
— Gramineum. *Curt.* == S. anceps. *Lam.* == *Bermudienne graminée.* * de 50 à 75 c.
— Palmifolium. *Willd.* == S. latifolium. *Ait.* == S. racemosum. *Pers.* == Moræa plicata ? *Curtis.* == M. Palmifolia ? *Jacq.* == Marica plicata ? *Curtis.* == *Bermudienne nerveuse.* * 75 c. à 1 f.
— Striatum. *Smith.* == S. spicatum. *Cav.* == S. reticulatum. *Dum. Cours.* == Moræa sertata. *Jacq.* == *Bermudienne striée.* * de 60 à 75 c.
Solidago bicolor. *L.* == *Verge d'or de deux couleurs.* 50 c.
Solidago flexicaulis. *L.* == S. latifolia. == *Verge d'or tortueuse.* 50 c.
— Mexicana. *L.* == *Verge d'or du Mexique.* de 50 à 75 c.
— Nutans. *Desf.* == *Verge d'or penchée.* 50 c.
— Procera. *Ait.* == *Verge d'or élevée.* 50 c.
— Sempervirens. *L.* == *Verge d'or toujours verte.* de 50 à 75 c.
— Virga aurea. *L.* == *Verge d'or commune.* de 40 à 50 c.
Sophora alopecuroïdes. *L.* == *Sophora queue de renard.* de 50 à 75 c.
— Australis. *L.* == Podalyria australis. *Willd.* == P. cœrulea. *Pers.* * de 1 à 2 f. 50 c.
Spigelia marilandica. *L.* == * de 2 à 3 f.
Spiræa aruncus. *L.* == *Spirée barbe de bouc.* de 1 f. 50 c. à 2 f.
— Filipendula. *L.* == *Spirée filipendule.* 25 c.
b Flore pleno. == *Filipendule à fleur double.* 50 c. à 1 f.
— Lobata *L.* == S. palmata. *Pall.* == *Spirée à feuil. lobées.* 1 à 2 f.
— Ulmaria. *L.* == *Spirée reine des prés.* 40 c.
Stachys cretica. *L.* == *Stachide de Crête.* de 20 à 50 c.
Statice armeria. *L.* == S. cæspitosa ? *Poir.* == S. montana. *Mill.* * 25 c.
— Bellidifolia. *Gouan.* * de 50 c à 1 f.
— Fasciculata. *Vent.* de 1 à 2 f.
— Limonium. *L.* == Limonium siculum. *Mill.* * de 40 à 50 c.
— Tartarica. *L.* == S. trigonoïdes. *Pall.* == Limonium tartaricum. *Mill.* * de 1 à 2 f.
Stellaria holostea. *L.* == *Stellaire holostée.* de 15 à 40 c.
Stevia hyssopifolia. *Cav.* == S. punctata. *Pers.* == Ageratum punctatum ? *Orteg.* == *Stevie à feuilles d'hysope.* * de 75 c. à 1 f. 50 c.
Stipa pennata. *L.* == *Stipe pennée.* * de 50 à 65 c.
Teucrium hircanicum. *L.* == *Germandrée d'Hircanie.* * 40 à 60 c.
Thalictrum aquilegifolium *L.* == T. atropurpureum. *Jacq.* 75 c. à 1 f.
— Discolor. *Hortul.* de 50 à 75 c.
— Flavum. *L.* == *Pigamon des prés.* 20 c.
— Fœtidum. *L.* == *Pigamon fétide.* 40 c.
— Speciosum. == *Pigamon élégant. H. P.* de 1 à 2 f.
Trachelium cœruleum. *L.* == *Trachelie bleue.* * de 75 c. à 2 f.
Tradescantia virginica. *L.* == *Ephemère de Virginie.* 40 à 50 c.
Thymus serpillum. *L.* == *Serpolet* 16 c.
Trollius europœus. *L.* == T. altissimus. *Crantz.* == *Trolle d'Europe.* == *Trolli.* de 1 à 2 f.
Tussilago fragrans. *Vill.* == *Tussilage odorant.* == *Héliotrope d'hiver.* de 25 à 40 c.
Uniola paniculata. *Hortul.* == U. latifolia. *Mich.* de 50 à 75 c.
Urtica nivea. *L.* == *Ortie de la Chine.* * de 1 à 1 f. 50 c.
— Canadensis. *L.* == *Ortie du Canada.* de 1 à 2 f.
Usteria scandens. *Cav.* == Maurandia semperflorens. *Cur.* == *Ustérie grimpante.* §. * de 1 à 2 f.
Valeriana officinalis. *L.* == *Valeriane officinale.* 25 c.
— Phu. *L.* == *Valeriane phu.* ♃ 20 c.
Valisneria spiralis. *L.* == *Valisnaire.* * 1 f. 25 c.
Verbena bonariense. *L.* == *Verveine de buenos-ayres.* * 50 à 75 c.
— Mexicana. *L.* == Priva mexicana. *Pers.* == Blaeria mexicana. *Gært.* == *Verveine du Mexique.* * de 1 à 2 f.
— Stricta. *Vent.* == V. ringens. *Mich.* == *Verveine fasciculée.* * de 75 c. à 1 f.
Vernonia novœboracensis. *Willd.* == Seratula. novœboracensis. *L.* == *Vernonia de Newyork.* de 75 c. à 1 f.
— Prealta. *Will.* == Serratula. *L.* == *V. gigantesque.* de 75 c. 1 f.
Veronica gentianoïdes. *Vahl.* de 40 à 50 c.
— Incana. *L.* == V. canescens. *Schr.* == V. neglecta. *Vahl.* 50 c.
— Laciniata. *Schr.* == *Véronique laciniée.* 05 c.
— Latifolia. *Ait.* == *Véronique à larges feuilles.* 60 c.
— Maritima. *L.* == *Véronique maritime.* 40 c.
— Media. *Schr.* == *Véronique moyenne.* 50 c.
— Spicata. *L.* == *Véronique à épi.* 50 c.
— Virginica. *L.* == *Véronique de Virginie.* de 75 c. à 1 f.
Vicia cracca. *L.* == *Vesse multiflore.* §. * 50 c.
Viola grandiflora. == *Violette à grandes fleurs.* == *Pensée vivace.* * de 1 à 3 f.
— Odorata. *L.* == *Violette odorante.* de 25 à 50 c.
Var.
b. Flore pleno albo. — *à fl. blanche doub.* 50 c.
c. Flore pleno roseo. — *à fl. rose double.* 50 c.
d. Flore pleno purpureo. — *à fl. pourpre doub.* 25 c.
e. Flore pleno pallide-cœruleo. — *à fl. cendrée doub.* 25 c.
— Palmata. *L.* == *Violette palmée.* de 1 à 2 f.
— Rothomagensis. *Desf.* de 50 à 75 c.
Zygophyllum fabago. *L.* == *Fabagelle commune.* * 1 à 1 f. 50 c.

PLANTES BULBEUSES ET OIGNONS A FLEURS.

AGAPANTHUS umbellatus. *l'Hérit.* == Crinum africanum. *L.* == Mauhlia africana. *Dahl.* == M. linearis. *Thunb.* == Tulbaghia heisteri? *Fabr.* == *Tubéreuse bleue.* == *Agapanthe ombellifère.* ♉ de 75 c. à 3 f.
b. Minor. *Var. petite.* ♉ de 1 à 3 f.
Albuca altissima? *Ait.* == *Albuca élevé. or* de 1 à 3 f.
— Major. *L.* == A. lutea. *Lam.* == *Albuca jaune. or.* de 1 à 2 f.
— Minor. *L.* == *Albuca petit. or.* de 1 à 2 f.
Allium baïcalense. *Willd.* == *Ail du lac Baïcal.* pl. t. 50 c. à 1 f.
— Chame-molly. *L.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Flavum. *L.* == *Ail jaune* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Fragrans. *Vent.* == *Ail odorant.* ♉ de 25 c. à 1 f.
— Moly. *L.* == A. aureum *L.* == *Ail doré.* pl. t. de 10 à 25 c.
— Monspessulanum. *Gou.* = A. multibulbosum. *Jacq.* = A. nigrum. *Willd.* pl. t. de 40 à 50 c.
— Roseum. *L.* == *Ail rose.* pl. t. de 25 à 50 c.
— Rubens. *Schrad.* pl. t. 50 c.
Alstrœmeria ligtu. *L.* == *Pélegrine à fleurs rayées. or.* de 2 à 3 f.
— Pelegrina. *L.* == *Lis des Incas.* == *Pélegrine tachetée. or.* de 2 à 3 f.
Amaryllis atamosco. *L.* == *Amaryllis de Virginie. or.* 1 f. 50 c. à 2 f.
— Aurea. *l'Hérit.* == *Amaryllis dorée.* == *Lis jaune doré. or.* de 3 à 6 f.
— Formosissima. *L.* == *Am. à fleurs en croix.* == *Lis de Saint-Jacques.* ♉ de 1 à 2 f.
— Lineata. *Lam.* == A. zeilanica. *l'Hérit.* == Crinum latifolium. *Mill.* == C. zeilanicum. *L.* == *Amaryllis rayée.* ♉ 1 à 4 f.
— Longifolia. *L.* == A. vivipara. *Lam.* == Crinum asiaticum. *Mill.* == *Amaryllis à longues feuilles. or.* de 3 à 5 f.
— Lutea. *L.* == *Amaryllis jaune.* pl. t. de 10 à 25 c.
— Punicea. *Lam.* == A. equestris. *Ait.* == A. dubia. *L.* == A. belladonna. *Mill.* == *Amaryllis écarlate. or.* de 3 à 6 f.
— Rosea. *Lam.* == A. belladonna. *Ait.* == A. reginæ. *Mill.* == *Amaryllis à fleurs roses.* == *Belladone. or.* de 3 à 6 f.
— Sarniensis. *L.* == *Amaryllis grénésienne. or.* de 3 à 4 f.
— Undulata. *L.* == *Amaryllis ondulée.* de 1 à 2 f.
Amomum granum paradisi? *Willd.* == *Amome à grappes. s. ch.* de 3 à 6 f.
— Zerumbet. *L.* == *Gingembre sauvage. or.* ♉ de 3 à 6 f.
— Zingiber. *L.* == *Amome des Indes.* == *Gingembre. or.* ♉ 5 à 6 f.
Anemone coronaria. *L.* == *Anemone des jardins.* == *A. des fleuristes Var. très nombreuses à fleurs doubles et de couleur variées.* pl. t. de 5 à 25 f. le °/o
— Hortensis. *L.* == A. stellata. *Lam.* == *Amemone étoilée. Var. doubles* et *simples de couleurs variées.* 25 c.
b. Pavonina. *Lam.* == *Anemone œuil de Paon.* pl. t. de 50 c. à 1 f. 50 c.
Anthericum aloïdes. *L.* == *Anthéric à feuilles d'aloès. or.* 1 à 2 f.
— Asphodeloïdes. *L.* == *Lis asphodèle. or.* de 1 à 2 f.
— Liliago. *L.* == Phalangium liliago. *Lam.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
Antholyza æthiopica. *L.* == *Antholyze d'Ethiopie. s ch* 40 à 75 c.
— Ringens. *L.* == *Antholyze à fleurs ringentes.* de 1 à 2 f.
Arthropodium pendulum. *D C.* == A. elongatum. *Hort. Monsp.* == Phalangium pendulum. *Red.* == Anthericum pendulum. *Hort. Hafn. or.* de 1 à 2 f.
Arum arisarum. *L.* == *Gouet à capuchon.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Bicolor. == Caladium bicolor. *Vent.* == *Gouet bicolore. s. ch.* de 3 à 4 f.
— Corsicum. *Lois.* == *Gouet de Corse.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Divaricatum. *L.* == A. proboscideum. *Hortul. s. ch.* 1 à 2 f.
— Dracunculus. *L.* == *Gouet serpentaire.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Esculentum. *L.* == Caladium esculentum. *Vent.* == *Gouet mangéable. s. ch.* de 3 à 4 f.
— Italicum. *Lam.* == *Gouet d'Italie.* pl. t. de 75 c. à 1 f.
a. Albo-variegatum. *D C* { *à feuill. panachées de blanc.*
b. Immaculatum. *D C.* { *à feuilles vertes.*
Arum vulgare. *Lam.* == A. maculatum. *L.* == *Gouet commun.* pl. t. de 25 à 50 c.
Arum. vulg. *a.* Nigro- maculatum. *D C.*
b. Immaculatum. *D C.*
Asparagus amarus. *D C.* == A. scaber? *Bring.* == *Asperge amère.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
Asphodelus fistulosus. *L.* == *Asphodèle fistuleux.* pl. t. 25 à 60 c.
— Luteus *L.* == *Asphodèle jaune.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Ramosus. *L.* == Hastula regia. *Hortul.* == *Asphodèle rameux.* == *A. blanc.* pl. t. de 25 à 50 c.
Belamcanda chinensis. *D C.* == Ixia chinensis. *Trew.* == Moræa sinensis. *L.* == Pardanthus. == *Iris tigré.* == *Morée de la Chine.* pl. t. de 25 à 50 c.
Bryonia dioïca. *Jacq.* == *Bryone dioïque.* == *B. couleuvrée.* == *Vigne blanche.* pl. t. §. de 40 à 60 c.
Canna glauca. *L.* == *Balisier glauque. or.* de 1 à 3 f.
— Flaccida. *Salisb. or.* de 3 à 5 f.
— Indica. *L.* == *Balisier d'Inde.* == *Plante à chapelet* ♉ de 50 c. à 2 f.
b. Coccinea. *Mill.* Var. ou Esp. { *à fleur écarlates* ♉ 1 à 3 f.
c. Lutea. *Ait.* { *à fleurs jaunes.* ♉ 1 à 2 f.
Colchicum autumnale. *L.* == *Colchique d'automne.* pl. t. 10 à 25 c.
— Montanum. *L.* == *Colchique de montagne.* de 40 à 60 c.
Convallaria japonica. *Thunb.* == Ophiopogon japonicum. *Bot. Mag.* == *Muguet du Japon.* pl. t. de 25 à 50 c.
— Majalis. *L.* == *Muguet de mai.* pl. t. de 10 à 25 c.
b. Flore pleno. Var. { *à fleurs doubles.* pl. t. 50 c. à 1 f.
c. Flore roseo. { *à fleurs roses.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Multiflora. *L.* (Polygonatum. *Desf.*) == *Sceau de Salomon multiflore.* pl. t. de 50 à 75 c.
— Polygonatum. *L.* == Polygonatum vulgare. == P. uniflorum. *Desf.* == *Sceau de salomon commun.* pl. t. de 10 à 20 c.
Crinum erubescens. *L. F.* == *Crinole rougeâtre. s. ch.* de 3 à 6 f.
Crocus sativus. *L.* == C. officinalis. *Smith.* == *Saffran cultivé.* == *S. des boutiques.* pl. t. de 3 à 6 f. le °/o
— Vernus *L.* == *Saffran printanier.* == *Saffran de Hollande.* (*25 variétés de couleurs différentes.*) pl. t. 3 à 10 f. le °/o
b. Luteus. *Lam.* pl. t.
Cyclamen europœum. *L.* == *Cyclamé d'Europe.* == *Pain de pourceau.* vulg. pl. t. de 75 c. à 2 f.
— Hederæfolium. *Ait.* == C. vernum. == *Cyclame à feuilles de lierre.* == *C. d'alep.* pl. t. de 3 à 4 f.
— Persicum. *Ait.* == C. indicum? *Hortul.* == *Cyclame de Perse.* ♉ de 1 à 3 f.
b. Limbo roso. Var. *à fleur rosée.* ♉ de 1 à 3 f.
Cyrilla pulchella. *l'Hérit.* == Gesneria pulchella. *Swartz.* == Columnea exerta. *Lam.* == Buchnera coccinea. *Scop.* == Achimenes coccinea. *Pers.* == A. minor. *Brown. s. ch.* 1 f. 50 c. 3 f.
Dianella cœrulea. *Red.* == *Dianelle bleue. or.* de 2 à 3 f.
— Nemorosa. *Lam.* == D. ensifolia. *D C.* == Dracena ensifolia. *L.* ♉ de 75 c. à 1 f.
Dodecatheon meadia. *L.* == *Gyroselle de Virginie.* pl. t. de 1 f. 50 c. à 3 f.
Eucomis punctata. *l'Hérit.* == Asphodelus comosus. *Houttuyn.* == Ornithogalum punctatum. *Thunb.* == *Eucomis tacheté. ro.* de 1 à 3 f.
— Regia. *Ait.* == Fritillaria regia. *Dill.* == Basilea coronata. *Lam.* == *Eucomis couronné. or.* de 1 à 2 f.
Ferraria undulata. *L.* == F. punctata. *Pers.* == *Ferrare onduléc. or.* de 1 f. 50 c. à 2 f.
Fritillaria imperialis *L.* == Ptilium. *L.* == Imperialis coronata *Dum. Cours.* == *Couronne impériale.* pl. t.
b. Flore pleno. *Plusieurs variétés dont les principal. sont:* { *double rouge.* pl. t. 1 f. 50 c. à 2 f.
c. Kroon-op-kroon. { *couronne sur couronne.* de 2 à 3 f.
d. Variegata. { *à feuil. panachées.* pl. t. 1 à 2 f.
e. Chinensis. { *de la Chine?* pl. t. 1 à 2 f.
f. Maxima. { *à grandes fleurs.* pl. t. 75 c. à 1 f.
g. Lutea. *Lam.* { *à fleur jaune.* pl. t. 75 c. à 1 f.
— Meleagris. *L.* == *Fritillaire panachée.* == *Meleâgre.* pl. t. de 4 à 6 f la douz.

Fritillaria persica. *L.* == *Fritillaire de Perse.* pl. t. de 1 à 2 f.
Fumaria bulbosa. *L.* == F. cava? *Ehrh.* == Corydalis bulbosa. *Pers.* == C. tuberosa. *Lam.* == *Fumeterre bulbeuse.* ♉ de 75 c. à 1 f.
Galanthus nivalis. *L.* == *Perce neige.* pl. t. 50 c.
Georgina frustranea. *D C.* == G. coccinea. *Will.* == Dahlia. *Cav.* pl. t. de 50 c. à 2 f.
a. Coccinea. *D C.* == *Dahlia ponceau.* pl. t.
b. Crocea. *D C.* *Dahlia couleur de feu.* pl. t.
c. Flava. *D C.* == *Dahlia jaune.* pl. t.
— Superflua. *D C.* == G. variabilis. *Willd.* pl. t. 50 c. à 2 f.
a. Rubra. *D C.* == G. purpurea. *Willd.* == *Dahlia mordoré.* pl. t.
b. Purpurea *D C.* == Dahlia pinnata. *Cav.* == *Dahlia pourpre.* Thouin. pl. t.
Id. Flore pleno. == *Dahlia à fleur double.* pl. t. de 2 à 5 f.
c. Lilacina. *D C.* Georgina rosea. *Willd.* == Dahlia rosea. *Cav.* == *Dahlia lilas.* pl. t.
d. Palida. *D C.* == *Dahlia pâle.* pl. t.
e, Flavescens. *D C.* == *Dahlia jaunâtre.* pl. t.
Geranium triste. *L.* == Pelargonium triste. *Willd.* == *G. à odeur de géroffle. or.* de 1 à 3 f.
— Tuberosum. *L.* == *Géranion tubéreux.* pl. t. 75 c. à 1 f. 50 c.
Gladiolus cardinalis. *Curt.* == G. iridiflorus *Willd.* == Watsonia iridiflora. *Jacq.* == *Glayeul écarlate. or.* de 2 à 3 f.
— Carneus. *Jacq.* == *Glayeul rose. or.* ed 1 f. 50 c. à 2 f.
— Coccineus? *Hort. Tel. or.* de 2 à 3 f.
— Communis. *L.* == *Glayeul commun.* pl. t. 1 f. la douz.
b. Albiflorus. *D C.* == G. major alb. *Gou.* pl. t. 3 f. la douz.
— Hyalinus. *Willd* == G. strictus. *Jacq. or.* de 2 à 3 f.
— Lineatus. *Curt.* == Ixia squalida. *Ait.* == *Glayeul jaunâtre. or.* de 1 à 2 f.
— Merianellus. *Willd.* == Watsonia humilis. *Mill.* == Antholiza merianella. *L. or.* de 1 f. 50 c. à 2 f.
b. Roseo-albus? *Hort. Tel. or.* de 2 à 3 f.
— Merianus. *Willd.* == Antholiza meriana *L.* == Watsonia meriana. *Mill.* == *Glayeul de mérian. or.* de 1 à 2 f.
— Plicatus *L.* == Lemonia. *Pers.* == Ixia plicata. *Lin. or.* 1 à 2 f.
b. Flore rubro. *or.* de 1 à 2 f.
— Securiger. *Ait.* == Ixia gladiolaris. *Lam.* == *Glayeul cuivré. or.* de 1 f. 50 c. à 2 f.
— Sulphureus. *Jacq.* == Lemonia. *Pers.* == *Glayeul jaunâtre.*
— Tristis. *L.* == *Glayeul bigarré. or.* de 2 à 3 f.
— Tubatus. *Jacq.* == Lemonia. *Pers.* == *Glayeul à long tube.*
— Variegatus. *Hort. Tel. or.* de 1 f. 50 c. à 2 f.
— Vittatus. *Jacq.*
Globba japonica? *Thunb.* == *Globbée du Japon. or.* de 3 à 5 f.
— Nutans. *Willd.* == Renealmia nutans. *Andrws.* == Zerumbet speciosum *Jacq.* == *Globbée pendante.* ♉ *s. ch.* 2 à 4 f.
Glycine apios. *L.* == *Glycine tubéreuse.* §. ♉ pl. t. de 1 à 2 f.
Hœmanthus coccineus. *L.* == *Hémanthe écarlate.* == *Tulipe du Cap. s. ch.* de 10 à 12 f.
— Puniceus. *Ait.* == *Hémanthe ponceau. s. ch.* de 4 à 6 f.
Hemerocallis alba. *Adrews.* == H. japonica. *Thunb.* == H. cordata? == H. plantaginea. *Lam.* == *Hémerocale du Japon.* ♉ 1 à 2 f.
— Cœrulea. *Andrews.* == Lilium cordifolium? *Willd.* == *Hémerocale bleue. or.* de 2 à 3 f.
— Flava. *L.* == *Hemerocale jaune.* == *H. odorate.* == *Lis jonquille.* pl. t. de 75 c. à 1 f.
b. Graminea. *Andrews.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Fulva. *L.* == *Hémerocale rouge.* pl. t. de 25 à 50 c.
Hoffmanseggia falcaria. *Cav.* == Larrea glauca. *Orteg.* pl. t. 50 c. 1 f.
Hyacinthus amethystinus. *L.* == H. hispanicus. *Lam.* pl. t. 1 f. 25 c.
— Botryoïdes *L.* == Muscari botryoïdes. *Mill.* == *jacinthe botrioïde.* pl. t. 25 c.
— Comosus. *L.* == Muscari comosum. *Mill.* == *Jacinthe à toupet.* == *Muscari chevelu.* pl. t. 25 c.
b. Monstrosus. *L.* == H. paniculatus. *Lam.* == Muscari monstrosum. *D C.* == *Muscari monstrueux.* == *Jacinthe paniculée.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Muscari. *L.* == H. suaveolens. *H. P.* == Muscari ambrosiaceum. *Mœnch.* == M. moschatum. *Willd.* == *Jacinthe musquée.* == *Muscari odorant.* pl. t. de 25 à 50 c.

Hyacinthus orientalis. *L.* == *Jacinthe orientale.* == *J. des fleuristes.* de 15 à 100 f. le °/o
a. Flore simplici. == *à fleurs simp.* } *rouge.* de 4 à 20 f. la douz. *rose et couleur de chair.* de 3 à 15 f. la douz. *blanche.* de 3 à 10 f. *id.* *id. centre violet, jaune rose et pourpre.* de 6 à 20 f. la douz.
Nombreuses variétés, de couleurs. } *jaune* de 9 à 24 f. *id.* *bleue.* de 3 à 10 f. *id.* *id. foncé et clair.* 4 à 10 f. la douz.
b. Flore pleno. == *à fleurs doub.* } *id. porcelaine et agathe.* de 4 à 10 f. *id.* *id. noirâtre.* 6 à 20 f. *id.*
— Racemosus. *L.* == H. juncifolius *Lam.* == Muscari racemosum. *D C.* pl. t. de 40 à 50 c.
— Serotinus. *L.* == H. lividus. *Pers.* == Coursetia serotina. *Destremx.* == Zuccagnia serotina. *Targ.* == Lachenalia serotina. *Willd.* == *Jacinthe rouillée.* pl. t. de 50 à 60 c.
Hypoxis villosa. *L.* == H. sobolifera. *Jacq.* == H erecta. *Var. Lam.* == *Hypoxis velue. or.* ♉ de 75 c. à 1 f.
Iris acuta. *F. B.* pl. t. de 75 c. à 1 f.
— Fimbriata. *Vent.* == I. chinensis. *Curtis.* == Moræa fimbriata. *Dum. Cours.* ♉ de 75 c. à 2 f.
— Florentina. *L.* == *Iris de florence.* pl. t. de 25 à 50 c.
b. Alba. *Savi* *id. à fleurs blanches.* ♉ de 1 à 2 f.
Iris fœtida. == J. fœtidissima. *L.* == *Iris fœtide.* == *Glayeul puant.* pl. t. 25 c.
b. Variegata. pl. t. 50 c.
— Germanica. *L.* == *Iris d'Allemagne.* pl. t. de 10 à 25 c.
b. Cœrulea. Var. { *bleu foncé.* pl. t. de 25 à 40 c.
c. Purpurea. Var. { *pourpre violet.* pl. t. de 40 à 50 c.
d. Pallida. *Lam.* == I. pallide-cerulea. *Willd.* == *Iris à fleurs pâles.* pl. t. de 50 à 60 c.
— Graminea. *L.* == *Iris graminée.* pl. t. de 50 à 60 c.
Lurida. *Ait* == *Iris pâle.* pl. t. de 75 c. à 1 f.
— Lutescens. *Lam.* == *Iris jaunâtre.* pl. t. de 25 à 50 c.
— Ochroleuca. *L.* pl. t. de 60 c. à 1 f.
— Pavonia. *Thunb.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Persica. *L.* == *Iris de Perse.* pl. t. de 25 à 60 c.
— Plicata. *Lam.* == *Iris plissée* pl. t. 50 à 60 c.
— Pseudacorus *L.* == I. paludosa. *Pers.* == *Iris des marais.* pl. t. de 15 à 25 c.
— Pumila. *L.* == *Iris naine.* pl. t.
a. Flore cœruleo. Var. { *à fleur bleue.* pl. t. de 25 à 50 c.
b. Flore albo. Var. { *à fleur blanche.* pl. t. 25 à 50 c.
— Sambucina. *L.* == *Iris à odeur de sureau.* pl. t. de 40 à 60 c.
— Squallens. *L.* == I. variegata. *Jacq.* == *Iris jaune sale.* pl. t. de 75 c. à 1 f.
— Sibirica. *L.* == I. pratensis. *Lam.* pl. t. de 50 à 60 c.
— Spatulata. *Lam.* == I. spuria. *L.* == *I. spatulée.* pl. t. 50 c. à 1 f.
— Swertii. *Lam.* == I. desertorum. *Balbis.* == *Iris de Hollande.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Suziana. *L.* == *Iris de Suse.* ♉ pl. t. de 75 c. à 1 f.
— versicolor. *L.* == *Iris variée.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Xiphium. *L.* == I. variabilis. *Jacq.* == Xiphium vulgare. *Mill.* *Iris bulbeuse.* == *I. chamolette.* == *I. d'Espage.* pl. t. *(varietées nuancées de violet, de bleu, jaune, panaché. etc.)* de 1 à 4 f. la douz.
— Xiphioïdes *L.* == I. xiphium. *Jacq.* == *Iris d'Angleterre.* pl. t. de 75 c. à 1 f.
Ixia bulbocodium. *L.* == I. europœa. *Pers.* pl. t. de 40 à 60 c.
— Crocata. *L.* == Gladiolus crocatus. *Wendl.* == *Ixia safrané. or.* de 40 à 60 c.
b. Coccinea. Var. { *écarlate. or.* de 1 à 2 f.
c. Rosea. Var. { *rose. or.* de 1 à 2 f.
d. Punicea. *Hort. Tel.* Var. { *ponceau. or.* de 1 à 2 f.
e. Acuta? *Hort. Tel.* Var. { *à corolle aigue. or.* de 1 à 2 f.
— Erisagan? *Hort. Tel. or.* de 1 à 2 f.
— Longiflora. *Jacq.* == Gladiolus. *Thunb.* == Lemonia. *Pers.* == *Ixia à longues fleurs. or.* de 1 à 2 f.
— Monadelphia major? *Hort. Tel. or.* de 1 à 2 f.
— Serotina? *Hort. Tel. or.* de 1 à 2 f.

Ixia zeylanica? *Hort. Tel. or.* de 1 à 2 f.
Lachenalia pendula. *Jacq.* = Phormium bulbiferum. *Cyrill.* = *Lachenalia à fleurs pendantes.* de 2 à 3 f.
b. Tricolor? *Jacq.* = *L. tricolore. or.* de 2 à 3 f.
Lathyrus tuberosus. *L.* = *Gesse tubéreuse.* §. pl. t. de 25 à 50 c.
Leucoium æstivum. *L.* = *Leucoïum d'été.* pl. t. de 20 à 50 c.
— Vernum. *L.* = *Leucoïum printanier.* pl. t. de 20 à 35 c.
Lilium bulbiferum. *L.* = L. philadelphicum? *Thunb.* = *Lis bulbifère.* pl. t. de 4 à 8 f. la douz.
b. Croceum. = L. aurantiacum. = *Lis orangé.* pl. t. 1 à 2 f.
c. Humile. *Mill.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Canadense. = L. penduliflorum. *DC.* = *Lis du Canada.* pl. t. de 2 à 3 f.
— Candidum. *L.* = *Lis blanc.* pl. t. de 15 à 25 c.
b. Flore pleno. = *Lis blanc à fleurs doubles.* pl. t. 1 à 3 f.
c. Sanguineum. = *Lis blanc rayé de rouge.* = *L. ensanglanté.* pl. t. de 2 à 3 f.
— Chalcedonicum. *L.* = *Lis hémérocale.* pl. t.
— Martagon. *L.* = *Lis martagon.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
b. Album. = *Martagon blanc.* pl. t. de 2 à 3 f.
— Pomponium. *L.* = *Lis turban.* pl. t. de 1 f. 50 c. à 3 f.
— Pyrenaïcum. *Gouan.* = *Lis des Pyrennées.* pl. t. de 1 à 2 f.
— Superbum. = *Lis superbe.* pl. t. de 3 à 4 f.
— Tigrinum. *Curtis.* = L. speciosum? *Andrews.* = L. sinense. = *Lis élégant.* = *L. tigré.* ♈ pl. t. de 3 à 5 f.
Limodorum purpureum. *Lam.* = *Limodre pourpre. s. ch.* 3 à 5 f.
— Tankervilliæ. *Ait.* = L. incarvillei. *Pers.* = Phajus grandiflorus. *Lour.* = *Limodore de la Chine. s. ch.* de 4 à 6 f.
Methonica superba. *Juss.* = Gloriosa superba. *L.* = *Superbe du Malabar.* §. *s. ch.*
Musa coccinea? *Andrews.* = *Bananier écarlate. s. ch.* 10 à 30 f.
— Paradisiaca. *L.* = *Bananier commun.* = *B. cultivé.* = *B. de Paradis.* = *Figuier d'Adam.* = *Culotte du père Adam.* = *Plantain.* = *Platanier. s. ch.* de 8 à 15 f.
— Sapientum? *L.* = *Bananier des sages.* = *Figue banane. s. ch.* de 9 à 18 f.
Narcissus bicolor. *L.* = N. sylvestris. *b. Lam.* = *Narcisse bicolore.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Biflorus. *Curtis.* = *Narcisse biflore.* pl. t. de 40 à 60 c.
— Bulbocodium. *L.* = *Narcisse bulbocode.* = *Trompette de méduse.* pl. t. de 20 à 50 c.
— Dubius. *Gouan.* = N. compressus. *Haw.* = N. pallidus. *Lam.* pl. t. de 20 à 50 c.
— Gouani. *Roth.* = N. odorus. *Gouan.* = N. incomparabilis. *Curt.* = *Narcisse de Gouan.* = *N. nonpareil.* pl. t. de 2 à 3 f. la douz.
b. Flore pleno. pl. t. de 3 à 4 f. la douz.
— Intermedius. *Lois.* = *Narcisse intermediaire.* pl. t. 25 à 50 c.
— Junquilla. *L.* = *N. jonquille.* pl. t. de 2 à 10 f. le °/₀
b. Flore pleno. = *jonquille double.* pl. t. 15 à 30 f. le °/₀
— Nivœus. *Lois* = *Narcisse blanc de neige.* pl. t. de 50 à 75 c.
— Ochroleucus. *Lois.* = *Narcisse jaune blanc.* pl. t. 50 à 60 c.
— Odorus. *L.* = N. lobatus. *Lam.* = *Narcisse odorant.* = *grande jonquille.* de 2 à 3 f. la douz.
— Patulus. *Lois.* pl. t. de 50 à 75 c.
— Poeticus. *L.* = N. angustifolius. *Curtis.* = *Narcisse des poëtes.* = *Jannette.* = *Genette.* pl. t. de 2 à 4 f. la douz.
b. Flore pleno. = *Narcisse des poëtes à fleurs doubles.* de 3 à 5 f. la douz.
— Polyanthos. *Lois.* = *Narcisse multiflore.* = *N. tout blanc.* pl. t. de 3 à 5 f. la douz.
— Pseudo-narcissus. *L. Narcisse faux narcisse.* = *N. sauvage.* = *N. des prés.* = *Porillon.* = *Aiault.* = *fleurs de coucou.* pl. t.
b. Flore pleno. pl. t. de 2 à 4 la douz.
— Tazeta. *L.* = N. multiflorus. *Lam.* = *Narcisse tazette.* (*Plusieurs variétés.*) pl. t. de 5 à 30 f. la °/₀
b. Aureus. = *Narcisse jaune d'or.* prov. pl. t. 10 à 25 f. le °/₀
Neottia spiralis. *Sw.* = Ophris spiralis. *L.* pl. t. 40 c.
Nyctago dichotoma. *DC.* = (Mirabilis. *L.*) = *Belle de nuit.* pl. t. 25 c.
— Jalapæ. *DC.* = N. hortensis. *Dum. Cours.* = Mirabilis. *L.* pl. t. 25 c.
Nyctago longiflora. *DC.* = (Mirabilis. *L.*) = M. mexicana. *Hern.* = *Admirable du Pérou.* * de 40 à 60 c.
Ophris insectifera. *L.* = *Ophris insecte.* pl. t. de 20 à 40 c.
b. Muscifera. *Hud.* = O. myodes. *Jacq.* = *O. mouche.* pl. t. de 20 à 40 c.
c. Apifera. *Sm.* = *Ophris abeille.* pl. t. de 20 à 40 c.
Orchis maculata. *L.* = *Orquis mâle.* pl. t. de 20 à 30 c.
— Morio. *L.* = *Orquis bouffon.* pl. t. de 20 à 50 c.
— Robertiana. *Lois.* = *Orquis de Robert.* pl. t. de 1 à 2 f.
Ornithogalum arabicum. *L.* = *Ornithogale d'Arabie.* pl. t. 50 c. à 1 f.
— Caudatum? *Ait.* = *Ornith. à queue. or.* 1 f.
— Longibracteatum. *Jacq.* = *Ornith. à longues bractées or.* 1 à 2 f.
— Luteum. *L.* = O. pratense. *Pers.* = Gangea lutea. *Curtis.* = *Ornith. jaune.* pl. t. 25 c.
— Narbonense. *L.* = *Ornith. de Narbonne.* pl. t. de 50 75 c.
— Nutans. *L.* = *Ornith. à fleurs penchées.* pl. t. de 50 à 75 c.
— Pyrenaïcum. *L.* = *Ornith. des Pyrenées.* pl. t. de 50 à 75 c.
— Umbellatum. *L.* = *Ornith. ombellifère.* = *Dame de 11 heures.* pl. t. 25 c.
Oxalis cernua. *Thunb.* = *Oxalide penchée. or.* de 20 à 50 c.
b. Maculata. *DC. or.*
c. Expansa. *DC. or.*
— Mutabilis. *DC.* = *Oxalide changeante. or.* de 50 c. à 1 f.
a. Purpurea. *Jacq.* = O. speciosa? *Willd.* = *Oxalide pourpre. or.*
b. Alba. *DC.* = *Ox. à fleurs blanches. or.*
— Polyphylla. *Jacq.* = *Ox. polyphylle. or.* de 50 c. à 1 f.
— Rubella. *Jacq.* = *Oxalide rouge. or.* de 50 c. à 1 f.
b Lilacina. *DC. or.* de 50 c. à 1 f.
— Tetraphylla. *Cav.* = *Oxalide à 4 folioles.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
— Variabilis. *Jacq.* = *Oxalide variable. or.* de 1 à 2 f.
Pœonia. (*vide* pag. 32)
Pancratium illyricum. *L.* = P. stellare. *Salisb.* = *Pancrais d'Illyrie.* pl. t. de 1 à 3 f.
— Maritimum. *L.* = P. verecundum? *Ait* = *Pancrais maritime. Lis de mathiole.* = *L. narcisse.* pl. t. de 25 à 75 c.
Phormium tenax. *Forster.* = Chlamydia tenacissima. *Gært.* = Lachenalia ramosa. *Lam.* = *Lin de la nouvelle Zélande* * 2 à 4 f.
Polianthes tuberosa. *L.* = *Tubéreuse des jardins.* *
b. Flore multiplici. = *Tubéreuse à fleurs multiples.* = *Tubéreuse quadruple.* vulg. * de 3 à 4 f. la douz.
Ranunculus asiaticus. *L.* = *Renoncule des jardins.* pl. t. 4 à 20 f. °/₀
Var. *à fleurs doubles ou semi doubles de toutes couleurs.* pl. t. de 4 à 20 f. le °/₀
Satyrion hircinum. *L.* = Orchis hircina. *Sw.* = *Satyrion bouquin.* pl. t. de 50 à 75 c.
Sanseviera guinensis. *Willd.* = S. thyrsiflora? *Thunb.* = Aletris guinensis. *Jacq.* = *Sanseviera de Guinée. or.* de 2 à 3 f.
— Zeylanica. *Willd.* = S. Æthiopica? *Thunb.* = Aletris chinensis. *Jacq.* = A. hyacinthoïdes. *L.* = Liriope spicata. *Lour.* = Salmea spicata. *Cav. or.* de 3 à 5 f.
Scilla amœna. *L.* = *Scille agréable.* pl. t. 25 c.
— Campanulata. *Ait.* = S. hyacinthoïdes. *Jacq.* = S. hispanica. *Mill.* pl. t. 50 c.
— Hyacinthoïdes. *L.* = *Scille jacinthe* pl. t. de 25 à 50 c.
— Maritima *L.* = Ornithogalum scilla. *Curtis.* = O. maritimum. *Lam.* = *Scille maritime.* = *S. marine.* pl. t. de 1 à 3 f.
— Peruviana. *L.* = *Scille du Pérou.* pl. t. de 25 à 75 c.
b. Alba. = *Scille à fleurs blanches.* pl. t. de 50 c. à 1 f.
Serapias latifolia. *L.* = Epipactis latifolia. *Willd.* pl. t. 50 c.
Tigridia pavonia. *Desf.* = Ferraria pavonia. *L.* = *Tigride à grandes fleurs.* * de 1 à 2 f.
Tulipa celsiana. *DC.* = *Tulipe de cels.* pl. t. de 25 à 50 c.
— Clusiana. *DC.* = *Tulipe de Perse.* = *Tulipe de l'Ecluse.* pl. t. de 20 à 30 c.
— Gesneriana. *L.* = *Tulipe des jardins.*
b. Acutiflora. = *Tulipe à pétales aigus.*
c. Flore pleno. = *Tulipe à fleur double.*
d. Precox. = *Tulipe hâtive.*
e. Monstrosa. = *Tulipe dragone.*
} *Nombreuses variétés.* de 1 f. pièce à 5 f. le °/₀
— Oculus-solis. *Saint. Am.* = T. agenensis. *DC.* = *Tulipe œuil de Soleil.* pl. t. de 25 à 50 c.
— Suaveolens. *Roth.* = *Tulipe odorante.* = *Duc de thol.* pl. t. de 15 à 25 f. le °/₀
— Sylvestris. *L.* = *Tulipe sauvage.* pl. t. de 5 à 10 f. le °/₀
Veltheimia capensis. = V. viridiflora. *Willd.* = Aletris capensis. *L.* = *Veltheimia du Cap. or.* de 1 à 2 f.

Tulipa

GRAINES DE PLANTES D'ORNEMENT.

⊙ et ♂

Adonis annua. *Gouan.* == A. aestivalis. *L.* == *Adonide annuelle.*
b. Miniata. *Jacq.* == *Adonide écarlate.*
Agrostemma cœlirosa. *L.* == Lychnis cœlirosa. *Lam.* == *Coquelourde caryophyllée.*
Alyssum clypeatum. *L.* == Draba clypeata. *Lam.* == Lunaria. *Tournef.* == *Alysse à fruit de lunaire.*
Amaranthus caudatus. *L.* == *Amaranthe à queue.* == *Cordon d'Évêque.* vulg.
— Lividus. *L.* == *Amaranthe livide.*
— Tricolor. *L.* == *Amaranthe tricolore.*
Argemone mexicana. *L.* == *Argemone du Mexique.* == *Pavot épineux.*
Aster chinensis. *L.* == *Aster de la Chine.* == *Reine marguerite.*

Flore albo pleno.	Var.	*à fleur bleue double.*
Flore purpureo pleno?		*à fleur pourpre double.*
Flore roseo pleno.		*à fleur rose double.*
Flore cœruleo pleno.		*à fleur bleue double.*
Flore violaceo pleno.		*à fleur violette double.*
Flore variegato pleno.		*à fleur panachée double.*
b. Paviflora. == *Reine marguerite pompon.*		*à petit disque.*

Blitum capitatum. *L.* == *Blètte effilée.*
— Virgatum. *L.* == *Epinard fraise*
Brassica oleracea variegata. == B. sabellica tricolor. == *Chou panaché.* == *Chou tricolore.*
b. Prolifera. == *Chou prolifère panaché de rouge.*
c. Pennata. == *Chou plûme.*
d. Quercifolia. == *Chou à feuilles de chêne.*
e. Cabousta. == *Chou frangé du nord.* == *C. de Sibérie.* == *C. en arbre.*
Briza media. *L.* == B. tremula == *Brize tramblante.*
Cacalia sonchifolia. *L.* == C. coccinea. *Curtis.*
Calendula officinalis. *L.* == *Souci des jardins.*
b. Flore aureo. == *Souci orangé.*
c. Flore luteo. == *Souci annemone.* == *Souci de la Reine.*
— Pluvialis. *L.* == *Souci pluvial.* == *S. hydromètre.*
Campanula speculum. *L.* == Prismatocarpus speculum. *l'Hérit.*
Cardiospermum halicacabum. *L.* == *Corinde glabre.* == *Lanterne de Panurge.*
Caucalis grandiflora. *L.* == *Caucalide à grandes fleurs:*
Celosia coccinea. *L.* == *Passe velours écarlate.*
— Cristata. *L.* == *Passe velours à crête.* == *Crête de coq.*
b. Lutea. == *Passe velours jaune.*
Celsia arturus. *L.* == *Celsie à longs pédoncules.*
Centaurea moschata. *L.* == Amberboa moschata. *Pers.* == *Centaurée musquée.* == *Ambrette.*
Cheiranthus annuus. *L.* == Hesperis aestiva. *Lam.* == *Giroflée annuelle.* (*vide pag.* 31)
Chelidonium corniculatum. *L.* == Glaucium phœniceum. *Smith.* == *Chelidoine à fleurs rouges.*
— Glaucium. *L.* == Glaucium luteum. *Smith.* == *Pavot cornu.*
Chenopodium scoparia. *L.* == *La belvédère*
Chironia centaurium. *Willd.* == *Chironie à fleurs rouges.* == *Petite centaurée.* vulg.
Chrysanthemum carinatum. *Schousb.* == C. tricolor. *Andrews.* == *Chrysanthême caréné.*
— Coronarium. *L.* == *Chrysanthême des jardins.* (*à fleurs blanches et fleurs orangées.*)
Cleome viscosa. *L.* == *Mozambé visqueuse.*
Coix lacrima jobi. *L.* == Lithagrostis. *Gært.* == *Larmile des Indes.* == *Larme de Job.*
Convolvulus tricolor. *L.* == *Liseron tricolore.* == *Belle de jour.*
Cosmos bipinnatus. *Cav.* == Cosmea. *Willd.* == *Cosmos bipinné.*
a. Purpureus. Var. { *à fleurs ponceau.*
b. Pallidus. { *à fleurs rose-pâle.*
Cucumis acutangulus. *L.* == *Concombre à angles tranchants.*
Cucurbita melopepo. *L.* == *Courge melopepon.* (*Voyez fruits légumiers.*)
b. Aurantiiformis. Var. { *en forme d'orange.*
c. Pyriformis. { *en forme de poire.*
Cuphea viscosissima. *Jacq.* == Lythrum cuphea. *L.* == *Cuphée visqueuse.*
Datura ceratocaula. *Jacq.* == D. macrocaulis. *Roth.* == *Stramoine cornue.*
— Fastuosa. *L.* == *Stramoine fastueuse.*
a. Purpurea. Var. { *à fleurs violettes.*
b. Flavo-albicans. { *à fleurs jaunâtres.*
— Ferox. *L.* == *Stramoine féroce.*
— Lœvis. *L.* == *Stramoine lisse.*
— Metel. *L.* == *Stramoine velue.*
— Stramonium. *L.* == *Stramoine commune.*
— Tatula. *L.* == *Stramoine à fleurs violettes.*

Delphinium ajacis. *L.* == *Pied d'alouette des jardins.*	Var.	*à fleurs doubles.*
b. Pyramidata. == *Pied d'alouette julienne.*		*de plusieurs couleurs.*

— Consolida. *L.* == *Dauphinelle des blés.* == *Pied d'alouette sauvage.*
— Staphys.gria. *L.* == *Staphysaigre.* == *Herbe aux poux.*
Dipsacus laciniatus. *L.* == *Cardère laciniée.*
Dolichos lablab. *L.* == *Dolic d'Egypte.*
— Purpureus. *L.* == *Dolic pourpre.*
— Sexquipedalis. *L.* — *Dolic du Japon.*
— Soja. *L.* == *Dolic velu.*
Echium plantagineum. *L.* == *Vipérine à feuilles de plantain.*
— Pyrenaicum. *L.* == *Vipérine des pyrenées.*
b. Italicum. *L.* == *Vipérine d'Italie.*
Euphrasia lutea. *L.* == *Euphraise jaune.*
Fumaria spicata. *L.* == *Fumeterre à épis.*
Gaura biennis. *L.* == *Gaura bisannuel.*
Gomphrena globosa. *L.* == *Amarantine globuleuse.*
a. Rubra. Var. { *à fleurs rouge.* == *Immortelle rouge.*
b. Alba. { *à fleurs blanches.* == *Immortelle blanche.*
Gypsophila elegans. *Hort. Noix.* == *Gypsophile élégante.*
Helianthus annuus. *L.* == *Hélianthe à grandes fleurs.* == *Soleil.* == *Tournesol.*
Hesperis maritima. *Lam.* == Cheiranthus maritimus. *L.* == *Giroflée.* == *Gaion de Mahon.* == *Julienne maritime.*
Hibiscus cannabinus. *L.* == *Ketmie à feuilles de chanvre.*
— Trionum. *L.* == *Ketmie trifoliée.*
Hippocrepis multisiliquosa. *L.* == *Hippocrèpis à plusieurs gousses.*
Iberis umbellata. *L.* == *Ibéride de crête.* == *Thlaspi des jardiniers.*
b. Flore albo. == *Var. à fleur blanche.*
Impatiens balsamina. *L.* == *Balsamine des jardins.* (*Nombreuses variétés à fleurs doubles et de couleurs variées et panachées.*)
Ipomœa coccinea. *L.* == *Ipomœa écarlate.* == *Jasmin d'Amérique.* §.
b. Luteola. *Jacq.* == J. angulata? *Orteg.* == *Liseron jaune.* §.
— Pillosa? *Cav.* == Convolvulus pentaphyllus? *L.* §.
— Purpurea. *Lam.* == Convolvulus purpureus. *L.* §.
b. Violacea. Var. { *à fleurs violettes.* §.
c. Rosea. { *à fleurs roses.* §.
d. Discolor. { *à fleurs rayées.* §.

Jpomœa quamoclit. *L.* = Convolvulus pennatus. *Lam.* §.
— Triloba. *L.* = *Quamoclit à trois lobes.*
Lathyrus odoratus. *L.* = *Gesse odorante.* = *Pois de senteur.* §.
a. Purpureo-violacea. Var. { *à fleurs violettes.* §.
b. Albo-rosea. { *à fleurs roses.* §.
Lopezia racemosa. *Cav.* = L. mexicana. *Jacq.* = *Lopézie à grappes.*
Lotus tetragonolobus. *L.* = *Lotier rouge.* = *Pois café?*
Lunaria annua. *L.* = L. bisannua. *Dum. Cours.* = *Bulbonach.* = *Médaille.* = *Satin blanc.*
Lupinus hirsutus. *L.* = *Lupin velu.*
— Luteus. *L.* = *Lupin jaune.*
— Varius. *L.* = L. semiverticillatus. *Lam.* = *Lupin varié.*
b. Cœruleus. Var. { *grand bleu.*
c. Roseus. { *rose.*
Martynia annua. *L.* = M. alternifolia. *Lam.* = M. proboscidea. *Glox.* = M. louisiana? *Mill.* = *Martynia de vera-crux.* = *Cornaret.*
Medicago elegans. = *Luzerne élégante.*
Mesembrianthemum chrystalinum. *L.* = *Ficoïde cristalin.* = *Glaciale.* vulg.
Molucella lœvis. *L.* = *Molucelle lisse.*
Momordica balsamina. *L.* = *Pomme de merveille.* §.
— Charantia. *L.* = *Momordique à feuilles de vigne.* §.
— Elaterium. *L.* = *Momordique piquante.* = *Giclet.* = *Concombre sauvage.* = *C. d'âne.* = *C. d'attrape.*
Myosotis annua. *Mœnch.* = *Oreille-de-rat à fleur bleue.*
Nicandra physalodes. *Adans.* = Atropa physaloïdes. *L.*
Nigella damascena. *L.* = *Nielle bleue.* = *Patte d'araignée.*
— Orientalis *L.* = *Nielle du levant.*
Nolana prostrata. *L.* = Walkeria. *Ehret.* = Zwingera. *Act. helv.* = Neudorffia peruviana. *Adans.* = Terganium procumbens. *Smith:*
Ocymum basilicum. *L.* = *Basilic commun.*
b. Nigrum. *DC.* Var. { *à grappes violettes.*
c. Valentinum. *DC.* { *à feuilles moyennes.*
d. Atropurpureum. *DC.* { *à feuilles pourpres.*
— Bullatum. *Lam.* = *Basilic à feuilles bullées.*
— Minimum. *L.* = *Basilic à petites feuilles.* = *B. fin.*
— Monachorum. *Hortul.* = *Basilic des moines.*
— Thyrsiflorum? *Murr.* = *Basilic à odeur de rue.*
Œnothera biennis. *L.* = *Onagre commune* = *Herbe aux ânes.*
— Grandiflora. *Ait.* = *Onagre à grandes fleurs.*
— Longiflora. *L.* = *Onagre longiflore.*
— Sinuata. *Mich.* = *Onagre sinuée.*
Œnothera tetraptera. *Cav.* = *Œ.* candida. *Dum. Cours.* = *Onagre blanche.*
Papaver rhœas *L.* = *Coquelicot à fleurs doubles variées en couleurs.*
— Somniferum. *L.* = *Pavot à fleurs doubles de toutes couleurs et mélangées.*
Parthenium histerophorus. *L.* = *Parthénium laciniè.*
Phaseolus multiflorus. *Lam.* = P. coccineus. *Ait.* = *Haricot d'Espagne.* = *H. écarlate.* §.
b. Albus. = *Haricot multiflore à fleurs blanches.*
— Semierectus. *L.* = *Haricot à fleurs pourpres.*
Polygonum orientale. *L.* = *Renouée du levant.* = *Grande persicaire.*
Rezeda odorata *L.* = *Rézeda odorant*
Scabiosa atropurpurea. *L.* = *Scabieuse des jardins.* = *fleur de veuve.*
b. Flore rubro. = *Scabieuse à fleurs rouges.*
— Stellata. *L.* = *Scabieuse étoilée.*
Silene armeria. *L.* = *Silène fasciculée.* = *Atrape-mouche.*
— Bipartita. *Desf.* = *Silène divisé.*
— Quinquevulnera. *L.* = *Silène panaché.*
Solanum ovigerum. *Dun.* = Melongena ovata *Mill.* = *Plante à œuf.*
Stewia pedata. *Cav.* = Ageratum pedatum. *Orteg.*
Tagetes erecta. *L.* = *Tagette droite.* = *Œillet d'Inde.*
b. Crocea. Var. { *à fleurs doubles orangées.*
c. Sulfurea. { *à fleurs jaune-pâle.*
— Patula. *L.* = *Tagette étalée.* = *Passe-velours.* Prov.
b. Crocea. Var. { *jaune*
c. Coccinea. { *ponceau.*
d. Variegata. { *panachée.*
Tropœolum majus. *L.* = *Capucine à grandes fleurs.*
b. Hybridum. = *Capucine hybride.*
Verbascum. *L.* (*Plusieurs espèces.*)
Verbena aubletia. *Ait.* = Buchnera canadensis. *L.*
Viola tricolor. *L.* = *Pensée.*
b. Grandiflora. Var. { *à grandes fleurs tricolores.*
c. Luteo-variegata. { *à fleurs jaunes panachées.*
Xeranthemum annuum. *L.* = *Immortelle annuelle.*
a. Alba. Var. { *à fleurs blanches.*
b. Purpurea. { *à fleurs pourpres.*
Zinnia elegans. *Jacq.* = Z. violacea. *Cav.* = *Zinnia élégantes.*
— Multiflora. *Cav.* = *Z. multiflore.*
— Pauciflora. *L.* = Z. lutea. *Gœrt.* = *Zinnia pauciflore.*
— Tenuiflora. *Jacq.* = Z. revoluta. *Cav.* = *Zinnia roulée.*

Nota: *Presque toutes les graines de plantes d'ornement se vendent au détail par paquets de 50 à 75 centimes.*

GRAINES DE PLANTES ECONOMIQUES.

1°. *LES CÉRÉALES.*

Avena sativa. *L.* = *Avoine cultivée.*
b. Mutica. = *Avoine sans barbe.*
Hordeum distichum. *L.* = *Orge à deux rangs.* = *O. pamelle.* = *O. Baillard.*
b. Nudum. = *Orge nue.* = *O. mondée.* = *O. bleue.*
id. æstivum. = *Orge nue d'été.*
id. sibiricum? = *Orge nue de Sibérie.*
— Hexastichum. *L.* = H. polystichum. = *Orge à six côtes.* = *Orge à six rangs.* = *O. escourgeon.* = *O. sucrion.* = *Orge d'hiver.* = *O. hexagône.*
Hordeum vulgare. *L.* = *Orge commune.*
b. Nanus. = H. precox. = *Orge naine.*
c. Serotinum. = *Orge tardive.* = *O. soumoule.* Prov.
d. Nigrum. = *Orge noire d'Amérique.*
e. Celeste. = *Orge celeste.* = *O. nue:*
id. Microsperma. = H. membranaceum.
f. Tortile. *Hort. Tel.* = *Orge à épis contournés.*
— Zeocritum. *L.* = *Orge faux-riz.* = *Faux riz de montagne.* = *Orge éventail.*

Mays zea. *Gart.* == **Zea mays.** *L.* == *Maïs cultivé.* == *Blé d'Inde.* == *B. de Turquie.* (*variétés à semences blanches, jaunes, dorées, bleues, violettes, pourpres, ardoisées, panachées. etc.*)
b. **Microstachya.** *D C.* == Zea precox. == *Maïs quarantin.*
Oryza sativa. *L.* == *Riz cultivé.*
b. **Mutica.** == *Riz sans barbe.*
Panicum italicum. *L.* == *Panis d'Italie.* == *Millet.*
— **Milliaceum.** *L.* == *Millet commun.*
Pennisetum thyphoïdeum. *Pers.* == Holcus spicatus. *L.* == Penicillaria spicata? *Willd.*
Polygonum fagopyrum. *L.* == *Sarrazin.* == *Blé noir.* == *Bucail.* == *Carabin.*
— **Tartaricum.** *L.* == *Sarrazin de tartarie.*
Secale cereale. == *Seigle cultivé.*
Sorghum nigricans. *Hortul.* == *Sorgho à graines noirâtres.*
— **Rubens.** *Willd.* == *Sorgho rougeâtre.*
— **Vulgare.** *Willd.* == Holcus sorghum. *L.* == *Gros millet.* == *Millet à balais.*
Triticum monococcum. *L.* == *Froment locular.* == *Petit épautre.* == *Engrain.*
— **Polonicum.** *L.* == *Froment de Pologne.* == *Seigle de Pologne.* vulg.

Triticum sativum. *Lam.* == *Froment cultivé.* == *Blé.*
Var. { *Seisette de Provence.* / id. *rousse.* / id. *noire.* / *Blé paulard.* }
b. **Touzelle.** == *Froment touzelle.*
Var. { *à tige rouge.* / *blanche de pertuis.* == *Froment de Provence.* / *Blé blancrée.* }
c. **Compositum.** == *Blé de miracles.* == *Froment à épis rameux.* == *Blé de Smyrne.*
d. **Hybernum.** == *Blé lamnas.* == *B. Anglais.* == *B. d'Ardennes.* == *Chicot-rouge.* == *Blé rouge de Saint-Pierre.*
e. **Œstivum.** == T. siculum. == *Blé de Sicile.* == *Blé de printems.* == *Blé de trois mois.*
Var. { *Blé rouge.* == *Blé de Sicile rouge.* / *Blé barbe noire.* / *Blé de Tangarok.* }
f. **Turgidum.** *L.* == *Blé velu à barbes.* == *Pétanielle.*
Var. { *à épis blancs.* == *Gros blé blanc.* / *à épis gris.* == *Blé de Barbarie.* / *à épis rouge.* == *Blé rouge velu.* }
— **Spelta.** *L.* == *Froment épautre.*

2.° LES PLANTES POTAGÈRES.

RACINES NOURRISSANTES.



Allium ascalonicum. *L.* == *Echalo e.*
— **Cepa.** *L.* == Cepa vulgaris. *Tournef.* == *Oignon.* == *Cébou.* Prov.
Var. { *rouge de Montfrin.* au °/o / *rouge foncé.* / *rouge pâle.* *id.* / *blanc.* *id.* / id. *petit de Florence.* }
b. **Pyriformis.** == *Oignon pyriforme.*
Var. { *Oignon de Bellegarde.* == *O. d'Espagne?* / *Oignon jaune.* == *O. paille.* }
c. **Vivipara.** *Walt.* == *Oignon d'Egypte.* == *Oignon de Wurtemberg.* == *O. bulbifère.* == *O. prolifère.*
— **Nigrum.** *L.* == Monspessulanum. *Gouan.* == A. multibulbosum. *Jacq.* == A. magicum. *L.* == *Gros ail.*
— **Porrum.** *L.* == *Poirreau.* au °/o
b. **Major.** == *Poirreau grosse espèce.* *id.*
— **Sativum.** *L.* == *Ail cultivé.*
— **Schœnoprasum.** *L.* == *Ail civette.*
— **Scorodoprasum.** *L.* == *Ail rocambolle.*
Apium dulce tuberosum. == *Céleri navet.* == *Céleri à grosses racines.* au °/o
— **Petroselinum tuberosum.** == *Persil à grosses racines.*
Beta cicla. *L.* == *Betterave.* au °/o
b. **Alba.** *Betterave. blanche longue.*
c. **Lutea.** *id. jaune longue.*
id. id. *courte de Castelnaudary.*
d. **Sanguinea.** *id. rouge longue.*
id. id. *de Castelnaudary.*
e. **Precox.** *id.* id. *ronde hâtive.*
f. **Exterrà.** *Thouin.* *id. racine de Disette.* == *B. champêtre.*

Brassica ol. gongylodes. *Desf.* == *Chou rave.*
a. **Alba.** == *Chou-rave blanc.* == *Chou de Siam.*
id. Precox. == *Chou-rave blanc hâtif.*
b. **Violacea.** == *Chou-rave violet.*
c. **Crispa.** == *Chou-rave frisé de Naples.*
— **Rapa.** *L.* == Sinapis tuberosa. *Lam.* == *Chou turneps.* == *Rabioule.*
— **Napus.** *L.* == *Navet.*
Var. { *de Belleville.* / *blanc rond.* / *de Freneuse.* / *jaune rond de Hollande.* / *long de campagne.* == *Gros navet de Berlin.* / *long gris de Provence.* au °/o / *noir.* }
— **Napo-brassica.** == *Chou navet blanc.*
b. **Rutabaga.** == B. napus hybrida. == *Navet de Suède.* == *Rutabaga.*
c. **Rubra.** == *Chou navet rouge.*
Bunium bulbocastanum. *L.* == *Terre-noix bulbeuse.* == *Noix de terre.*
Campanula rapunculus. *L.* == *Raiponse des jardins.*
Convolvulus batatas. *L.* == *Patate d'Amérique.*
Cyperus esculentus. *L.* == *Souchet comestible.*
Daucus carota *L.* == *Carotte cultivée.* == *Pastenade.* au °/o
Var. { *jaune longue.* / id. *courte.* / *rouge longue.* / id. *courte.* / *blanche, violette. etc.* }
Lathyrus tuberosus. *L.* == *Gesse tubéreuse.* == *Macuson.*
Helianthus tuberosus. *L.* == *Topinambour.* == *Poire-de-terre.*

Pastinaca sativa. *L.* = *Panais cultivé.*
b. Turbinata. *Hortul.* = *Panais rond de Metz.*
Raphanus sativus. *L.* = *Raifort cultivé.* au °/o

b. Longus. *Rave.* { *blanche longue.* / id. *hâtive.* / *tortillée du mans.* / *grosse blanche d'Augsbourg.* / *violette.* / *rose saumonée.* / *noire.* }

c. Rotundus. *Radis.* { *blanc hâtif* / *rose saumoné.* / *violet.* / *noir.* / *jaune d'Egypte.* }

Scorzonera hispanica. *L.* = *Scorsonère cultivée.* = *Salsifix noir.*

Sium sisarum. *L.* = *Chervi.* = *Berle des potagers.* = *Girole!*
Solanum tuberosum. *L.* = *Pomme de terre.* = *Parmentière.* = *Morelle truffe.* = *Rabace.* Prov. = *Tuffères.* Lang.

Variétés. { *grosse blanche.* = *Pomme de terre d'Howard.* / *banche longue.* = *Blanche Irlandaise.* / *rouge longue marbrée.* / *rouge ronde.* / id. *ronde hâtive.* = *Truffe d'août.* *Pelure d'oignon.* = *Langue de bœuf.* / *rouge longue.* / *petite rouge longue.* / *patraque rouge.* / *patraque jaune.* / *violette Holandaise.* / *cornichon de Hollande jaune.* / *vitelotte ou cornichon rouge.* }

Tragopogum porrifolium. *L.* = *Salsifix commun.*

HERBAGES LÉGUMIERS:

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES FEUILLES.

Apium graveolens. *L.* = *Céleri.*

b. Dulce *Mill.* *Var.* { *Céleri creux:* au °/o / *Céleri à couper.* = *Petit céleri.* / *Céleri plein blanc.* au °/o / *Céleri rouge ou rose.* id. / *Céleri Turc ou de Prusse.* }

— Petroselinum. *L.* = *Persil commun.* au °/o
b. Crispum. = *Persil frisé.*
Asparagus officinalis. *L.* = A. sativus. = *Asperge commune.* = *Asperge cultivée.*

b. Albus. / c. Amethystinus. / d. Viridis. Var. { *blanche de Hollande.* / *violette d'Ulm.* / *verte d'Ulm.* }

Atriplex hortensis. *L.* = *Arroche-bonne-dame.* = *Folette.*
a. Rosea. = *Arroche rouge.*
Brassica oleracea. *L.* = *Chou commun.*
b. Capitata. = *Chou pommé.* = *Chou pomme.*

Var. { *petit cabage.* (Precox.) / *cabus du Puis-de-Dôme.* / *cabus d'Uzès.* au °/o / *blanc d'Alsace.* / *d'Yorck.* / *tardif d'Allemagne.* = *Chou quintal.* / *de Saint Denis.* = *Chou d'Aubervilliers.* / *royal hâtif.* / *americain hâtif.* / *cœur de bœuf.* / *blanc hâtif de bonneuil.* / *de battersea hâtif.* / *pain de sucre.* (Pyramidalis.) }

c. Rubra. Var. { *rouge d'Allemagne.* / *petit rouge d'Utrecht.* / *blanc de Hollande.* / *de Brounswich.* / *des vertus.* }

e. Sabellica. = B. sabauda. = *Chou pommé frisé.* = *Chou de Milan.*

Var. { *milan d'été.* au °/o / *milan petit hâtif.* / *milan doré.* = *Chou de Savoie.* / *milan trapu.* = *Chou frisé court.* / *milan tête longue.* = *Chou frisé tête longue.* / *frisé d'Allemagne tardif.* / *frisé de Saint Denis.* = *Milan d'automne.* / *milan tardif.* au °/o / *milan moyen.* / *milan gros.* au °/o / *chou frisé du mans.* }

Brassica ol. d. Viridis. *Chou frangé.* = *C. frisé d'Allemagne.* = *Chou à rejets du Brabant.* = *Spruitjes.*
e. Perennis. *Thouin.* = *Chou vivace de Daubenton.*

f. Selenisia. { *Chou de Touraine.* = *Chou pancalier.* / *Chou branchu.* = *C. mille-têtes de Poitou.* }

{ *Chou de Bauvais grosse côte.* / *Chou vert à larges côtes.* / *Chou blond à larges côtes.* }

Choux fleurs et brocolis. (*Voyez* Fleurs legumières.)
Nota: *Plusieurs sortes de choux aux plantes fourragères et quelques-unes aux graines de plantes d'ornement.*
Beta vulgaris. *L* = B. hortensis. *Mill.* = *Poirée.* = *Bette.*

Varietés. { *à couper verte.* / *à couper blonde.* / *à carde blanche.* / *à carde blonde.* / *à carde verte.* }

Chenopodium bonus henricus. *L.* = *Bon henri.* = *Epinard sauvage.*
Crambe maritima: *L.* = *Chou marin.*
Crithmum maritimum. *L.* = *Perce-pierre.* = *Bacille maritime.* = *Fenouil marin*
Cynara cardunculus. *L.* = *Cordon d'Espagne.* = *Carde.*

a. Spinosa. / b. Inermis. / id. plena. Var. { *Épineux.* / *Inerme.* / *Plein inerme.* }

Laitues et chicorées à cuire. (*Voyez* La serie des salades.)
Portulaca oleracea. *L.* = *Pourpier des jardins.*
b. Aurea. = *Pourpié doré.*
Rumex acetosa. *L.* = *Oseille commune.*
— Montanus. *H. P.* = R. arifolius. *Allioni.* = *Oseille Vierge.*
— Scutatus. *L.* = *Oseille à écusson.*
— Tuberosus *L.* = *Oseille ronde.*
Spinacia oleracea. *L.* = *Epinard potager.*
b. Lævis. *H. P.* *Epinard rond.* = *Epinard de Hollande.*
Id. Latifolia. = *Var. à larges feuilles.*

FLEURS LEGUMIÈRES.

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES FLEURS.

Brassica oleracea botrytis. = *Chou-fleur.*
Var. { *dur d'Angleterre.* / *de Hollande.* / *de Malte.* / *mi-dur de Paris.* }
b. Brocolis. = *Chou-brocoli.*
Var. { *blanc.* / *cendré.* / *tardif.* / *vert* ou *commun.* / *violet* ou *de Malte.* / id. *très hâtif.* }

Cynara scolymus. *L.* = *Artichaut.*
b. Viridis. / *c.* Inermis. / *d.* Rubra. / Violacea. Var. { *le vert.* / *le blanc.* / *le rouge.* / *le violet.* }

Nota : *On mange aussi les fleurs des variétés, de la capucine commune que je placerai page 43 aux fournitures de salades.*

FRUITS LÉGUMIERS.

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES FRUITS.

Capsicum annuum. *L.* = *Piment annuel.* = *Poivron.*
— Grossum. *L.* = *Piment à fruit en cœur.*
b. Cydoniforme. = *Piment doux.* = *Poivron d'Espagne.*
— Longum. *D C.* = *Piment allongé.* = *Corail des jardins.*
Cucumis melo. *L.* = *Melon.* = *Concombre réticulé.*
a. Saccharinus. = *Melon brodé.* (*Plusieurs variétés.*) *Melon de Cavaillon.*
b. Cantalou. = *Melon cantalou.* (*Plusieurs variétés.*)
c. Viridis. = *Melon vert.* = *M. de Morée.* = *M. de Candie.* = *M. de Malte.* = *M. d'hiver.*
— Flexuosus *L.* = *Concombre serpent.*
— Sativus. *L.* = *Concombre commun.*
Var. { *blanc.* / *blanc hâtif.* / *jaune.* }
b. Minor. *H. P.* { *à cornichons.* }
Cucurbita citrullus. *L.* = *Pasteque.* = *Citre.* Prov.
b. Sativus. = *Melon d'eau.*
— Leucantha. *Duch.* = *Courge à fleurs blanches.*
b. Lagenaria. *H. P.* / *c.* Latior. *H. P.* / *d.* Pyrotecha. *H. P.* / *c.* Longa. *H. P.* Var. { *Cougourde.* / *Gourde.* / *Poire à poudre.* / *Calebasse.* }
— Melopepo. *L.* = *Courge mélopepon.*
b. Verrucosus. *H. P.* / *c.* Aurantiiformis. *H. P.* / *d.* Pyriformis. *H. P.* / *e.* Clypeatus. *H. P.* Var. { *Tuberculeux.* / *Orange.* / *Pyriforme.* / *Bonnet d'electeur.* = *Patisson.* }
— Pepo. *L.* = *Courge potiron.* = *Citrouille.*
b. Viridis. *H. P.* { *vert commun.* / *gros vert de Barbarie de deux quintaux.* }
c. Luteus. *H. P.* { *jaune rond.* / *jaune musqué.* = *Courge musquée.* }
Fragaria ananassa. *Duch.* = F. grandiflora. *Ehr.* = *Fraisier ananas* = *Quoimio de Harlem.*
— Chiloensis. *Ehr.* = *Fraisier du Chili.* = *Frutiller.*
— Sylvestris. *Duch.* = *Fraisier des bois.* = *F. commun.*

Fragaria. *b.* Abortiva. *Duch.* = *Fraisier coucou.* = *Breslingue-coucou.*
c. Bifera. *Duch.* = F. cœsalpini. = *Fraisier de Bargemon.* = *Majaufe. de Provence.*
d. Calyculata. *Duch.* = *Fraisier de bath.* = *Quoimio de Bath.*
e. Dubia. *Duch.* = *Fraisier vineux.* = *Majaufe de champagne.*
f. Efflagellis. *Duch.* = *Fraisier buisson.* = *F. sans courant.*
g. Hortensis. *Duch.* = *Fraisier fressant.* = *F. de Montreuil.* = *Caperon.* vulg.
h Minor. *Duch.* = *Fraisier d'Angleterre.* = *F. à chassis.*
i. Monophylla. *Duch.* = *Fraisier de Versailles.* = *F. à feuilles simples.*
j. Moschata. *Duch.* = F. pratensis. = F. elatior. *Willd.* = *Fraisier de Bruxelles.* = *Caperonnier royal.*
k. Moschata dioïca. *Duch.* = *Faisier abricot.* = *F. framboise.* = *Caperonnier uni-sexuel.*
l. Nigra. *Duch.* = *Fraisier breslingue.* = *Breslingue d'Allemagne.*
m. Semperflorens. *Duch.* = *Fraisier des Alpes.* = *F. des mois.* = *F. perpetuel.*
Id. Alba. = *Fraisier perpetuel à fruit blanc.*
n. Viridis. *Duch.* = *Fraisier vert.* = *Breslingue d'Angleterre.*
o. Vulgaris flore semi-pleno. *Duch.* = *Fraisier double* = *F. couronné.* = *F. Trochet.*
p. Carolinensis. *Duch.* = *Fraisier de Caroline.* = *Quoimio de Caroline.*
q. Virginiana. *l'Hérit.* = *Fraisier écarlate.* = *Quoimio de Virginie.*
Hibiscus esculentus *L.* = H. ficifolius. *Mill.* = *Ketmie gombaud.*
Lycopersicum cerasiforme. *Dun.* = Solanum pseudo-lycopersicum. *Jacq.* = S. spurium. *Gm.* = *Tomate ronde.*
— Esculentum. *Mill.* = Solanum lycopersicum. *L.* = *Pomme d'amour.* = *Tomate.*
— Humboltii. *Dun.* = Solanum humboltii. *Willd.* = *Petite tomatte ronde.*

Lycopersicum pyriforme. *Dun.* == Solanum pomiferum. *Cav.* == *Tomatte-poire.*
Phyzalis edulis. *Cyr.* == P. pubescens. == P. Barbadensis ? == *Kinkingari.* Ital. == *Alkekenge.* == *Coqueret.* == *Groseille du Chili.* vulg.

Solanum esculentum. *Dun.* == S. melongena. *L.* == *Melongène.* == *Aubergine.* == *Viedaze.* Lang.
a. Oblonga. == *Aubergine longue violette.*
b. Rotunda. == *Aubergine ronde violette.*
Trapa natans. *L.* == *Macre flotante.* == *Chataigne d'eau.*

SEMENCES LEGUMIÈRES:

OU PLANTES POTAGÈRES DONT ON MANGE LES GRAINES.

Cicer arietinum. *L.* == *Pois ciches.* == *P. pointu.* == *Sèze.* Prov.
Dolichos sinensis. *L.* == *Dolic de la Chine.* == *Haricot escloupet.* Lang.
Ervum lens. *L.* == *Lentille.* == *Ers.*
Var. { *à la reine.* == *Lentille grise.*
id. id. *rougeâtre.*
de Soisson. == *Lentille large blonde.* }
Fava vulgaris. *Manch.* == Vicia faba *L.* == *Fève cultivée.* == *F. des jardins.*
b. Minor. == *Fève julienne.*
c. Major. *H. P.* == *Fève de marais.* == *F. Picarde.*
d. Viridis. *H. P.* == *Fève verte.*
e. Nana. == *Fève naine d'Angleterre.*
f. Longissiliqua. == *Fève à longues cosses.*
g. Rotunda. == *Fève de windsor.*
h. Equina. == F. minor. *H. P.* == *Fève des champs.* ==
Lathyrus sativus. *L.* == *Gesse cultivée.* == *Lentille d'Espagne.*
Phaseolus. *L.* == *Haricot.*

Variétés à graines elliptiques, reniformes, un peu applaties tiges grimpantes.

— Multiflorus. *Willd.* Dolichos coccineus. *Lam.* == *Haricot rouge d'Espagne.*
Haricot blanc d'Espagne.
— Ceratonoïdes. *Balbis.* *Haricot sabre.*
— Cylindricus ? *DC.* *Haricot cylindrique.*
— Vulgaris. *L.* *Haricot de Soisson.*
Haricot rognon de coq.
Haricot blanc commun.
Haricot blanc à rames sans parchemin.
Domingensis. *Haricot de Saint Domingue.*

Variétés à graines presque cylindrique, subreniforme tiges non grimpantes.

Haricot blanc de Picardie dit flageolet.
— Jnamœnus. *Balbis.* *Haricot à fleurs verdâtres.*
Haricot Suisse gris.
Haricot Suisse barriolé dit dent de vieille.
Haricot Suisse rouge.
Haicot Suisse panaché.
Haricot Suisse rose.
Haricot Suisse blanc.
— Tridentatus. *Haricot tridenté.*
Haricot jaune clair.

Variétés à graines ovales ou *presque rondes sans échancrures.*

Haricot rouge d'Orléans.
Haricot rouge de Pragues.
Haricot de sienne.
Haricot de sienne foncé.
Haricot petit coco brun.

Phaseolus vulgaris. *Haricot coco barriolé à cosses rouges.*
Haricot nankin rond pâle.
Haricot bicolor ovale.
Haricot bicolor rond.
Haricot coco rose.
Haricot gros coco violet.
Haricot gros coco rouge.
Haricot Sophie.
Haricot bleu.
Haricot barraquet rayé
Haricot nankin pâle.
Haricot jaune.
— Incarnatus. *Haricot couleur de chair.*
— Abyssinicus. *Haricot d'abyssinie.*
— Aureus. *Hort. Monsp.* *Haricot doré.* == *Jaune quarantain.*
Haricot de la Cochinchine. }
Haricot nain biche. }
Haricot blanc hâtif de Hollande. }
Haricot quarantain blanc. }
Haricot rond blanc.
Haricot riz.
Haricot coco blanc nain.
Haricot œil de Perdrix.
— Pictactus. *Balbis.* *Haricot peint.*
— Subrotundus. *Haricot pois.*
— Exoticus. *Haricot exotique.*

Pisum sativum. *L.* == *Pois cultivé.*
Pois baron.
Quadratum. { *Pois carré blanc.*
Pois carré vert. }
Pois à cul noir. == *Pois fève.*
Pois clamart. == *P. carré-fin.*
Pois dominé.
Pois à longue cosses dit gouvigny.
Pois marly.
Pois michaut de Hollande. == *P. de Francfort.*
Pois michaut ordinaire. == *P. quarantain.*

Humile. { *Pois nain vert.*
Pois nain à bouquet.
Pois nain sans parchemin.
Pois nain de Barbentane. }

Pois sans pareil.

Excorticatum. { *Pois sans parchemin.*
Pois rouge sans parchemin. == *P. œil de Perdrix.* }

Pois vert gros Normand.
Vicia sativa alba == *Vesce blanche.* == *Lentille du Canada.*

LES SALADES:

Cichorium intybus. L. = *Chicorée sauvage.* = *Barbe de Capucin.* = *Cheveux de paysan.* vulg.
b. Maculata. = *Chicorée panachée.*
— Indivia. L. = *Chicorée cultivée.* = *C. frisée.* = *Endive.* vulg.
b. Angustifolia. = *Chicorée toujours blanche.*
c. Italica. = *Chicorée fine d'Italie.* = *C. à la régence*
d. Latifolia. = *Chicorée scarrolle.*
Hybrida. = *Scarole blonde ou hybride.*
e. Crispa. = *Chicorée. frisée.* au °/o
Var. { *de Meaux.* / *grosse frisée.*

Lactuca sativa. L. = *Laitue cultivée.* au °/o
a. Quercina. L. = *Laitue à feuilles de chêne.*
b. Capitata. = *Laitue pommée.* au °/o
Laitue bapaume.
Laitue batavia.
Brassicata. *Laitue batavia brune.* = *Laitue chou.*
Laitue de Berg-op-zoon.
Laitue de Berlin.
Laitue cocasse.
Laitue coquille. = *L. d'hiver.*
Crispa. *Laitue crêpe.* = *L. petite noire.*
Laitue dauphine. = *L. de printemps.*
Sang. vari. *Laitue flagellée.* = *L. sanguine.*
Laitue de Gênes verte.
Laitue george.
Laitue gotte. = *L. gau.*
Laitue grosse rouge.
Laitue de Hambourg.

Latuca capitata. *Laitue de Hollande.* = *L. grosse brune.*
Germanica. *Laitue impériale.* = *L. grosse Allemande.*
Italica. *Laitue d'Italie.*
Laitue mousserone.
Laitue palatine.
Laitue paresseuse.
Laitue passion d'hiver
Laitue perpignane. = *L. à grosses côtes.*
Laitue pomée rose. = *Rougette.* Prov.
Regia. *Laitue royale.*
Laitue sans pareille.
Laitue Turque.
Laitue de Versailles.
Viridis. *Laitue. verte* = *L. hâtive de Hollande.*
c. Longa. *Thouin.* = *L.* romana. *H. P.* = *L. romaine.* = *Chicon.*
Macrophylla. *Romaine alphange.*
Romaine blanche. au °/o
Romaine blonde.
Obscura. *Romaine grise ou brune.*
Variegata. *Romaine panachée.*
Rubra. *Romaine rouge.*
Viridis. *Romaine verte.* au °/o

Valerianella olitoria. *Willd.* = V. locusta. *L.* = Fedia olitoria. *Vahl.* = *Mâche.* = *Doucette.* = *Blanchette.*
b. Italica. = *Mâche d'Italie.*

Nota: Les Salades auraient du se trouver avec les herbages legumiers, mais en raison de leur usage j'ai cru devoir en faire un groupe particulier que j'ai placé à la fin des plantes potagères.

FOURNITURES DE SALADES.

Allium fissile. *L.* = *Ciboule.*
— Schœnoprasum. *L.* = *Civette.* = *Cive.* = *Ciboulette.* = *Appétit.*
Artemisia dracunculus. *L.* = *Estragon.*
Brassica eruca. *L.* = *Roquette cultivée.*
Cardamine fontana. *Lam.* = Sisymbrium nasturtium. *L.* = *Crésson de fontaine.*
— Hirsuta. *L.* = *Crésson velu.*
Lepidium sativum. *L.* = Thlaspi sativum. *H. P.* = *Cresson alenois.* = *Nasitor.*
b. Latifolia. Var. { *à larges feuilles.*
c. Crispa. { *à feuilles crépues.*

Plantago coronopus. *L.* = *Plantain corne de cerf.*
Poterium sanguisorba. *L.* = *Petite pimprenelle.*
Scandix cerefolium. *L.* = *Cerfeuil cultivé.*
— Crispum. *L.* = *Cerfeuil crêpu.*
Scorpiurus echinata. *Lam.* = *Chenille herissée.*
— Vermiculata. *L.* = *Chenille vermiculée.*
Tropœolum majus. *L.* = *Grande capucine.*
b. minus = *Petite Capucine.*

Nota: *Le Pourpier; l'Ail; l'Oignon; le Céleri; l'Échalotte etc. sont aussi employés pour fournitures de salades.*

3.° PLANTES AROMATIQUES.



Anethum dulce. *DC.* = *Fenouil doux d'Italie.* = *F. de Florence.* au °/o
— Fœniculum. *L.* = *Fenouil usuel.*
Angelica archangelica. *L.* = *Angélique.*
Ammi majus. *L.* = *Ammi commun.*
Artemisia absinthium. *L.* = *Absinthe commune.*
Chenopodium ambrosioides. *L.* = *Ambroisie.* = *Thé du Mexique.*

Chenopodium botrys. *L.* = *Anserine botride.*
Coriandrum sativum. *L.* = *Coriandre cultivé.* au °/o
Cuminum siminum. *L.* = *Cumin officinal.* au °/o
Dracocephalum maldovica. *L.* = *Thé maldovie.*
Erigeron graveolens. *L.* = Inula graveolens. *H. P.* = Solidago. *Lam.* = *Vergerole odorante.*
Hyssopus officinalis. *L.* = *Hysope officinale.*

Lavandula. (*vide* pag. 17.) *Obs.* Lavandula angustifolia. *N. est* L. vera. *D C. Supp. fl. fr.*
Lepidium latifolium. *L.* == *Grande passe-rage.*
Ligusticum levisticum. *L.* == Angelica paludapifolia. *Lam.* == *Livêche.* == *Ache de montagne.*
Melissa hortensis. == M. officinalis. *L.* == *Citronelle.* == *Melisse.*
Mentha cervina. *L.* == Pulegium cervinum. *Mill.* == *Menthe cervine.*
— Gentillis. *L.* == M. rubra. *Sole.* == M. pratensis ? == *Baume.* == *Menthe des jardins.*
— Piperita. *L.* == *Menthe poivrée.*
— Sativa. *L.* == *menthe cultivée.*
Nigelle sativa. *L.* == *Nielle de Crète.* == *Toute-épice.*
Ocymum basilicum. *L.* == *Basilic commun.* (*vide* pag. 38.) au °/o

Origanum creticum. *Mill.* == *Origan de Crète.*
— Majoranoïdes. *Willd.* == *Marjolaine.* au °/o
— Vulgare. *L.* == *Origan commun.*
Pimpinella anisum *L.* == Anisum vulgare. *Gart.* == *Anis.* au °/o
Spilanthus oleracea. *L.* == *Cresson de para.*
Satureja hortensis. *L.* == *Sariete des jardins.* == *Savourée. Sadrée.*
— Montana. *L.* == Thymus montanus. *Dum. Cours* == *Sariette vivace.* == *S. de montagne.*
Scandix odorata. *L.* == Myrrhis odorata. *Pers.* == Cherophyllum. *Lam.* == *Cerfeuil musqué.* == *C. d'Espagne.* == *Myrhide. odorante.* Dum. Cours. == *Fourgère musquée.*

Nota : *La Camomille ; les Sauges ; le Serpolet ; le Romarin ; le Tym et autres plantes que j'ai indiquées ailleurs, devroient être comprises dans la série des plantes aromatiques.*

4.° PLANTES OLEIFÈRES.

ARACHIS hypogæa. *L.* == *Arachide.* == *Cacachuate.* == *Pistache de terre.* *
Brassica arvensis. == B. campestris: == *Chou colza.*
— Napus sylvestris. == *Navet sauvage.* == *Navette.*
Myagrum sativum. *L.* == *Cameline.*
Papaver somniferum. *L.* == *Pavot oliette.* == *OEillette.*
Ricinus africanus. *Mill.* == R. Communis. *Desf.* == *Ricin de Barbarie.* * au °/o
— Communis. *L.* == *Ricin commun.* == *Palma-Christi.* au °/o (1)
— Inermis. *Jacq.* == *Ricin inerme.* *

Ricinus lividus *L.* == R. communis. *Thunb.* == *an* R. rutilans *H. P.* == *Ricin pourpre.*
— Viridis ? *Willd.* == *Ricin verdâtre.*
Sinapis alba. *L.* == *Moutarde blanche.*
— Nigra. *L.* == *Moutarde noire.*

On obtient encore de l'huile par expression. { *du Lin, du Sésame, du Chanvre, du Hêtre, des Noix, des Amandes, des Pignons, de l'Oliver, de l'Azedarach, du Laurier, etc.*

5°. PLANTES TEXTILLES.

ÆSCHINOMENE sesban *L.* == Sesbania ægyptiaca. *Pers.* == *Lézard d'Egypte.* vulg. *
Agave americana. *L.* == *Agavé d'Amérique.* *
Asclepias syriaca. *L.* == *Ouate de syrie.*
— Fruticosa. *L.* == *Asclépias à feuilles de saule.* *
Broussonetia papyrifera. *l'Hérit.* == *Mûrier à papier de la Chine.* (*vide* pag. 13.)
Cannabis sativa. *L.* == *Chanvre cultivé.*
b. Gigantea. == *Chanvre de Piémont.* == *C. gigantesque.*
Gossypium herbaceum. *L.* == *Cotonnier herbacé.* == *C. de Malte.* *
— Peruvianum. *Cav.* == *Cotonnier d'Iviça.* *
— Religiosum ? *L.* == G. tricuspidatum ? *Lam.* == G. siamense. *Lasteyrie.* == *Cotonnier de Siam.* *
b. Fulva. == *Cotonnier nankin.* *
Hibiscus mutabilis. *L.* == *Ketmie changeante.* * (*vide* pag. 16.)
Linum perenne. *L.* == *Lin vivace.* == *Lin de Sibérie.* == *L. de Riga.*

Linum usitatissimum. *L.* == *Lin usuel.*
Lygeum spartum. *L.* == *Sparte à feuilles de jonc.*
Phormium tenax. *Forster.* == *Lin de la nouvelle Zélandé* (*vide* pag. 36.)
Stipa tenacissima. *L.* == *Stipe sparte.*
Trachynotia cynosuroïdes. *Mich.* == Limnetis cynosuroïdes. *Pers.* == Dactylis. *L.*
Urtica cannabina. *L.* == *Ortie de Sibérie.*
— Nivœa. *L.* == *Ortie cotonneuse.* *

Nota : *Le Tilleul ; l'Orme ; l'Eupatoire ; plusieurs malvacées ; le Genêt d'Espagne ; l'Arundo de Barbarie et plusieurs autres graminés ; le Bannanier ; divers palmiers etc. produisant de la filasse peuvent être compris dans la série des plantes textilles.*

PLANTES TEINTORIALES.

ANCHUSA tinctoria. *L.* = A. monspeliaca. G. *Bauh.* = *Orchanette.* (teinture rouge.)
Berberis vulgaris. *L.* = *Epine vinette.* (t. jaune.)
Carthamus tinctorius. *L.* = *Carthame officinal.* = *Graine de perroquet.* = *Saffran bâtard.* (t. jaune.)
Crocus officinalis. *L.* = C. sativus. = *Saffran cultivé.* (t. jaune.)
Croton tinctorium. *L.* = *Tournesol.* (t. bleue.)
Evonymus europœus. *L.* = *Fusain commun.* (t. jaune.)
Genista tinctoria. *L.* = *Genêt des teinturiers.* (t. jaune.)
Indigofera anil. *Lam.* = *Indigotier franc.* (t. bleue.)
— Indica. *Lam.* = I. tinctoria. *L.* = *Indigotier des Indes.* (t. bleue.)
Iris germanica. *L.* = *Iris d'Allemagne.* (t. verte.)
Isatis tinctoria. *L.* = *Pastel des teinturiers.* = *Guède.* = *Vouède.* (t. bleue.)
— Lusitanica. *L.* = *Pastel du Portugal.* (t. bleue.)
Medicago sativa. *L.* = *Luzerne cultivée.* (t. bleue *et* jaune.)
Milleria contrayerva. *Cav.* = Flaveria peruviana. *Juss.* = F. contrayerva. *Pers.* (t. jaune.)
Phytolacca decandra. *L.* = *Raisin d'Amérique.* (t. rouge.)
Reseda luteola. *L.* = *Gaude.*
Rhamnus alaternus. *L.* = *Nerprun alaterne.* (t. verte.)
— Catharticus. *L.* = *Nerprun commun.* (t. verte.)
— Infectorius. *L.* = *Graine d'Avignon.* (t. jaune.)
Rhus cotinus. *L.* = *Fustet.* (t. jaune.)
— Coriaria. *L.* = *Sumac des corroyeurs.*
— Glabrum. *L.* = *Sumac glabre.*
— Typhinum. *L.* = *Sumac de Virginie.*
— Radicans. *L.* = *Sumac à la gale.*
— Toxicodendrum. *L.* = *Sumac poison.*
} *Pour la teinture employé comme mordant.*

Rubia tinctorum. *L.* = *Garance cultivée.* (t. rouge.)
Nota : Le troëne teint en pourpre ; les racines de plusieurs rubiacées en rouge ; l'Ephemère commune en jaune ; la Baselle rouge en rouge ; les fleurs de pieds d'alouette en bleu ; le Pigamon jaune en jaune ; les fleurs de millepertuis en jaune ; l'Anthemis des teinturiers en jaune ; le Bleuet, la Violette, le Mûrier noir, les Galles de chêne, le Datisca etc. pourroient aussi être employés pour teinture.

PLANTES A FOURRAGE.

AGROSTIS stolonifera. *L.* = *Fiorin.*
Aira cespitosa. *L.* = *Canche en gazon.*
— Flexuosa. *L.* = *Canche flexueuse.*
Alopecurus pratensis. *L.* = *Vulpin des prés.*
Anthoxanthum odoratum. *L.* = *Flouve odorante.*
Avena elatior. *L.* = *Avoine elevée.* = *Fromental.*
Astragalus galegiformis. *L.* = *Astragale à feuilles de galega.*
— Glyciphyllos. *L.* = *Astragale reglissier*
Beta vulgaris campestris. = *Betterave champêtre.* = *Racine de Disette.*
Brassica ol. arvensis. = B. campestris. = *Chou colza.*
Var. *Chou à faucher.*
b. Procera. = B. vaccina. = *Chou cavalier.* = *Chou à vaches.*
Var. { *Chou moëllier.* / *Chou caulet de Flandre.*
c. Viridis. = *Chou vert commun.*
— Fimbriata. = *Grand chou vert frisé du nord.*
Id. Rubra = *Chou frisé rouge du nord.*
Nota : *Plusieurs variétés de choux indiquées dans la section des herbages légumiers peuvent aussi servir pour la nourriture des bestiaux.*
Bromus arvensis. *L.* = *Brome des champs.*
— Mollis. *L.* = *Brome doux.*
— Secalinus. *L.* = *Brome seglin.*
Cichorium intybus. *L.* = *Chicorée sauvage.*
Dactylis glomerata. *L.* = Bromus glomeratus. *Kœl.* = Festuca glomerata. *Vill.* = *Dactyle pelotoné.*
Daucus carota. *L.* = *Carotte à fourrage.*
Faba vulgaris equina. = *Féverole.*
Festuca fluitans. *L.* = Poa fluitans. *Kœl.* = *Fétuque flottante.* = *Manne de Prusse.* = *Manne de Pologne.*
— Ovina. *L.* = *Fétuque des moutons.* = *Coquiole.*
— Pratensis. *L.* = *Fétuque des prés.*
Galega officinalis. *L.* = *Galéga officinal.* = *Rue de chèvre.*
Hedysarum coronarium. *L.* = *Sainfoin d'Espagne.* = *Sulla.*
— Onobrychis. *L.* = O. sativa. *Lam.* = O. viciæfolia. *Scop.* O. vulgaris. *Jaume Saint-Hill.* = O. spicata. *Mœnch.* = *Sainfoin cultivé.* = *Bourgogne.* = *Esparcette.*
Helianthus tuberosus. *L.* = *Topinambour.*
Holcus halepensis *L.* = Sorghum halepense. *Schreb.* = *Houque d'alep.*
— Lanatus. *L.* = Avena lanata. *Willd.* = *Houque laineuse.*
— Mollis. *L.* = Avena mollis. *Willd.* = *Houque molle.*
Hordeum pratense. *Roth.* = H. secalinum ? *Lam.* = H. nodosum. *L.* = *Orge des prés.*
Lathyrus palustris. *Willd.* = *Gesse des marais.*
Lolium perenne. *L.* = *Ivraie vivace.* = *Ray-grass.* = *Gazon Anglais.*
— Multiflorum. *Lam.* = *Ivraie annuelle.* = *Margail.* Prov.
Lotus corniculatus. *L.* = *Lotier corniculé.*
— Rectus. *L.* = *Lotier gloméruIé.*
Lupinus albus. *L.* = *Lupin blanc.*
Medicago sativa. *L.* = *Luzerne cultivée.*
— Lupulina. *L.* = *Luzerne lupuline.* = *Trefle jaune.* = *T. noir.* = *Minette.*
Melilotus officinalis. *Lam.* = *Melilot commun.*
a. Alba. = *Melilot de Sibérie.*
— Sulcata. *Desf.* = Trifolium Mauritanicum? *Willd.*
Phalaris arundinacea. *L.* = *Alpiste roseau.*
Phleum pratense. *L.* = *Fléau.* = *Thymothy.*
Poterium sanguisorba. *L.* = *Pimprenelle à fourrage.*
Pisum arvense. *L.* = *Pois gris.* = *Pisaille.* = *Pois de pigeon.*
Plantago lanceolata. *L.* = *Plantain des prés.*
Poa pratensis. *L.* = *Paturin des prés.*
Psoralea bituminosa. *L.* = *Psoralée bitumineuse.* = *Trefle bitumineux.*

Raphanus sativus oblongus. = *Grosse rave à fourrage.* = *Raifort des champs.* = *R. des bœufs.* = *Rave commune.*
Spergula arvensis. *L.* = *Spargoute des champs.*
Sanguisorba officinalis. *L.* = *Sanguisorbe officinale.*
Trifolium incarnatum. *L.* = *Trefle rouge de Roussillon.* = *Farouche.*
— Pratense. *L.* = *Trefle des près* = *Grand trefle rouge de Hollande.* = *Clave.*
— repens. *L.* = T. album. = *Trefle blanc.* = *Fin houssy.*
Trigonella fœnum grœcum. *L.* = *Fenugrec.*
Vicia cracca. *L.* = *Vesse multiflore.*
— Sativa. *L.* = *Vesse cultivée.*
Var. { *noire.* / *grise.*
b. Alba. { *blanche.* = *Lentille du Canada.*
Nota: *L'achillée, l'Avoine, l'Orge, le Seigle, l'Elymus, diverses centaurées, la Coronille variée, le Robinier, plusieurs Saules, l'Ajonc d'Europe, la Moutarde, la Pomme de terre, le Millet commun, le Panais, le Pastel etc. sont aussi d'usage pour fourrage.*

PLANTES PROPRES À DIVERS ARTS ET USAGES.

Cochlearia glastifolia. *L.* = *Choclearia à feuilles de pastel.*
— Officinalis. *L.* = *Cochlearia officinal.* = *Cranson.* = *Herbe aux cuillers.*
Dipsacus fullonum. *L.* = *Cardère à foulon.* = *Chardon à bonnetier.*
Humulus lupulus. *L.* = *Houblon cultivé.*
Nicotiana glutinosa. *L.* = *Tabac glutineux.*
— Paniculata. *L.* = *Tabac paniculé.*
Nicotiana tabacum. *L.* = *Tabac de Virginie.*
Rheum palmatum. *L.* = *Rhubarbe palmée.*
— Undulatum. *L.* = *Rhubarbe ondulée.*
Sinapis alba. *L.* = *Moutarde blanche.*
— Nigra. *L.* = *Moutarde noire.* = *Sénevé.*
Salsola sativa. *L.* = *Soude cultivée.*
— Soda. *L.* = *Soude commune.*

NOMS D'AUTEURS.

(*Ait.*) Aiton; (*Adans.*) Adanson; (*And.*) Andrews; (*Bast.*) Bastard; (*Bauh.*) Bauhin; (*Le Berr.*) Le Berryais; (*Brouss.*) Broussonet; (*Brow.*) R. Brown; (*Calv.*) Calvel; (*C. de char.*) Catalogue des Chartreux. (*Chap.*) Chaptal; (*Clus.*) Clusius; (*Comm.*) Commerson; (*Curt.*) Curtis; (*Cyrill.*) Cyrillo; (*Dalech.*) Dalechamp; (*D C.*) de Candolle; (*Desf.*) Desfontaines; (*Desv.*) Desvaux; (*Duch.*) Duchesne; (*Duf.*) Dufrêne; (*Duh.*) Duhamel; (*Duh. ed. nov.*) Duhamel editio nova. = *Nouveau Duhamel.* (*Dum Cours.*) Dumont Courset; (*Dun.*) Dunal; (*Erh.*) Erhart; (*F. B.*) Frères Baumann; (*Forsk.*) Forskall; (*Forst.*) Forster; (*Gært.*) Gærtner; (*Garid.*) Garidel; (*Glox.*) Gloxin; (*Gm.*) Gmelin; (*Gou.*) Gouan; (*Hall.*) Haller; (*Haw.*) Haworth; (*Hoff.*) Hoffmann; (*Hort. Angl.*) Hortus anglicus; (*Hort. Haff.*) Hortus Haffniensis; (*H. K.*) Hortus Kewensis; (*Hort. Lugd.*) Hortus lugdunensis; (*Hort. Lond.*) Hortus Londinensis; (*Hort. Mat.*) Hortus matritensis; (*Hort. Mass.*) Hortus massiliensis; (*Hort. Nois.*) Hortus Noisette; (*H. P.*) Hortus Parisiensis. = *Jardin des plantes de Paris.* (*Hor Tel.*) Hortus Telonensis; (*Hortul.*) Hortulani; (*Humb.* et *Bonpl.*) Humboldt *et* Bonpland; (*Jacq. B.*) Jacquemet Bonnefont; (*Jacq.*) Jacquin; (*Journ. de Bot.*) Journal de Botanique; (*Juss.*) de Jussieu; (*La Bill.*) La Billardière; (*Labr.*) Labrousse; (*Lam.*) de Lamarck; (*Lapey.*) Lapeyrouse; (*l'Hérit.*) l'Héritier; (*Lin.*) Linneus; (*L. F.*) Linneus filius; (*Lois.*) Loiseleur des longchamps. (*Lour.*) Loureiro; (*Mal.*) Malmaison; (*Marsch.*) Marschall-Bieberstein; (*Mass.*) Masson; (*Mich.*) Michaux; (*Mill.*) Miller; (*Murr.*) Murray; (*Orteg.*) Ortega; (*Pall.*) Pallas; (*Parck.*) Parckinson; (*Pers.*) Persoon; (*Pharm.*) Pharmacie; (*Pluk.*) Plukenet; (*Poir.*) Poiret; (*Pom. Austr.*) Pomona austriaca; (*Red.*) Redouté; (*Retz.*) Retzius; (*Roz.*) Rozier; (*Ruiz* et *Pav.*) Ruiz *et* Pavon; (*Salisb.*) Salisbury; (*Schl.*) Schleicher; (*Schreb.*) Schreber; (*Scop.*) Scopoli; (*S. Rox. Cle.*) Don Simon Roxas Clemente; (*Spreng.*) Sprengel; (*de Suff.*) de Suffren; (*Sw.*) Swartz; (*T. obstg.*) Sicklers teusche Obstgarner. (*Thuill.*) Thuillier; (*Th.*) Thunberg; (*Tournef.*) Tournefort; (*Vent.*) Ventenat; (*Vill.*) Villars; (*Wang.*) Wangenhein; (*Wendl.*) Wendland; (*Willd.*) Willdenow.

Il est quelques graines de plantes que j'ai peu multipliées, mais il n'en est aucune dont je ne puisse étendre la culture en proportion des demandes qu'on pourrait m'en faire.

J'ai soin d'élever en pot, pour mieux en assurer la réusite, toutes les plantes d'une reprise incertaine, tels que Pins, Sapinettes, Cèdres, et autres arbres toujours verts.

On ne sera pas étonné s'il existe une différence de prix entre les plantes du nord acclimatées et celles qui ne le sont pas.

FIN.


3 2044 102 815 149